

科学多选题解



内科学多选题解

答题说明

本试题类型分为A、B、C、K四种

一、A型题：

每一道试题下面带有A、B、C、D、E五个备选答案，只许选择一个完全正确的答案，并在答卷上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确回答。

二、B型题：

A、B、C、D、E五个备选答案在前，试题在后，若干道试题共用这五个备选答案。每道题只许选择一个正确答案，若选择两个或两个以上，视为无效。每个备选答案可以选择一次或一次以上，也可以一次不被选用。

三、C型题：

A、B、C、D四个备选答案在前，试题在后，若干道试题共用这四个备选答案。可选答A或B、如果认为这道题的正确答案是C（即A、B两个备选答案均有关），如认为这道题的正确答案是D（即A、B两个备选答案均无关）。每道题只许选一个正确答案，若选择两个或两个以上，视为无效。

四、K型题：

每道试题下面都提供了①、②、③、④四个选用答案，答题时要将这个选用答案按下述规定的顺序组合A、B、C、D、E五组答案：

A：①+②+③

B：①+③

C：②+④

D：④

E：①+③+③+④

每道题只许在答卷的相应位置上涂黑A、B、C、D、E五组答案中的一组，若涂两个或两个以上，视为无效。

内科学多选题解

一、诊断学基础

A型题

- 1、体温调节中枢位于：
A、大脑皮层
B、丘脑
C、☒ 视丘下部
D、中脑
E、延髓
- 2、下列哪项不是白细胞致热源性发热？
A、类固醇
B、内毒素
C、外毒素
D、☒ 广泛性皮炎
E、抗原抗体复合物
- 3、下列哪项属白细胞致热源性发热？
A、广泛性皮炎
B、中暑
C、脑溢血
D、癫痫持续状态
E、肝硬化
- 4、感染性发热是：
A、大面积烧伤 *非感染性*
B、风湿热
C、广泛性皮炎
D、☒ 寄生虫病
E、急性白血病
中枢性发热的是：
癫痫持续状态
- B、☒ 脑溢血
C、甲亢危象
D、系统性红斑狼疮
E、酸中毒
- 6、关于致热源性发热，下列哪项是错误的？
A、恶性肿瘤
B、肺脓肿
C、粒细胞缺乏症
D、肝昏迷
E、☒ 中暑
- 7、属于散热不良的发热是：
A、溶血性贫血
B、☒ 中暑
C、脑出血
D、脱水性酸中毒
E、植物神经机能紊乱
- 8、下列哪项属致热源性发热？
A、广泛性皮炎
B、甲亢
C、☒ 急性心肌梗塞
D、癫痫持续状态
E、高渗性昏迷
- 9、稽留热是指：
A、☒ 高热，每日温差不超 1°C
B、高热，每日温差超过 2°C
C、发热，每日温差不超 1°C

- D、寒战高热，出汗降温
E、以上都不是
- 10、头痛在上午10时以前最明显：
A、额窦炎
B、血管痉挛
C、颅内肿瘤
D、脑膜炎
E、神经衰弱
- 11、头痛伴呕吐可见于：
A、急性胃炎
B、结核性腹膜炎
C、脑血管意外
D、幽门梗阻
E、急性胰腺炎
- 12、反复大量咯血最常见的病因是：
A、慢性支气管炎
B、肺癌
C、支气管扩张
D、特发性血小板减少性紫癜
E、急性粟粒性肺结核
- 13、大咯血量最少应是：
A、10ml—60ml
B、60ml—100ml
C、100ml—500ml
D、500ml—1000ml
E、1000ml以上
- 14、主支气管阻塞时表现呼吸困难是：
A、劳力性呼吸困难
B、呼气性呼吸困难
C、吸气性呼吸困难
D、混合性呼吸困难
E、以上都不是
- 15、引起呼气性呼吸困难：
A、大叶性肺炎
B、喉头水肿
C、心源性哮喘
D、胸腔积液
E、支气管哮喘
- 16、区别中心性与周围性紫绀主要依据：
A、紫绀的部位
B、紫绀的程度
C、紫绀的皮肤温度
D、还原血红蛋白 $>5g\%$
E、紫绀发生的时间
- 17、表现为中心性发绀的是：
A、休克
B、急性左心衰竭
C、急性右心衰竭
D、血容量不足
E、缩窄性心包炎
- 18、高铁血红蛋白症所致紫绀可见于：
A、呼吸性酸中毒
B、缩窄性心包炎
C、肠源性紫绀
D、肺气肿
E、严重心衰
- 19、属于中枢性呕吐的：
A、剧咳刺激悬雍垂
B、美尼尔氏综合征
C、迷路炎
D、妊娠呕吐
E、晕动病
- 20、属反射性呕吐的：
A、尿毒症
B、注射杜冷丁
C、脑膜炎
D、肝昏迷
E、急性肝炎
- 21、胃源性呕吐的特点是：
A、无恶心，呈喷射状
B、先恶心，吐后感轻松
C、先恶心，吐后不见舒适

- D、不恶心，食即吐、吐后再食
E、无恶心、一口一口反出胃内容物

22、 “喷射性”呕吐常见于：

- A、急性胃炎
B、晕动病
C、脑膜炎
D、美尼尔氏综合征
E、尿毒症

23、 上消化道出血最常见原因是：

- A、门脉高压征候群
B、消化性溃疡
C、浅表性胃炎
D、单纯性胃炎
E、胃粘膜脱垂症

24、 常见炎症性腹痛的病因：

- A、溃疡病
B、过敏性紫癜
C、肠梗阻
D、十二指肠溃疡穿孔
E、大叶性肺炎

25、 下列哪项不是引起腹痛的常见原因？

- A、空腔脏器平滑肌收缩
B、腹腔实质脏器迅速胀大，包膜牵拉
C、脏器炎症刺激腹膜
D、腹腔脏器血管的痉挛或阻塞
E、纵膈病变

26、 有关腹泻下列哪项错误？

- A、大便稀薄不成形
B、腹泻持续或反复两个月以上
C、大便一日超过两次
D、肛周脓肿所致便次频数，大便含炎性渗出物
E、肠蠕动过速，分泌过多及消化吸收不良

27、 非可凹性水肿常见于：

- A、缩窄性心包炎
B、慢性肾炎肾病型
C、贫血
D、粘液水肿（甲状腺低功）
E、肝硬化

28、 下列哪项不是引起全身浮肿的病因？

- A、心脏病
B、肾脏病
C、肝脏性
D、营养性
E、变态反应（过敏性）

29、 溶血性黄疸时：

- A、胆红素定性试验直接反应强阳性
B、胆红素定性试验间接反应强阳性
C、胆红素定性双相反应强阳性
D、尿胆红素阳性
E、尿胆元减少或缺失

30、 下列哪项检查“不符合”阻塞性黄疸？

- A、凡登白直接反应（+）
B、总胆固醇明显增加
C、尿色深
D、硷性磷酸酶明显增加
E、尿胆红素（-）

31、 判断浅昏迷的是：

- A、可以唤醒
B、唤之不醒，强痛刺激有痛苦表情
C、强痛刺激无反应
D、短暂意识丧失
E、以上都不是

32、 下列哪种属被动体位？

- A、活动自如、不受限制
B、胸膜炎病人被迫采取患侧卧位
C、衰弱病人不能自己调正变换体位
D、胆石症绞痛发作辗转不安
E、破伤风病人角弓反张

33、 急性腹膜炎病人常采取：

- A、仰卧位
 B、侧卧位
 C、端坐位
 D、俯卧位
 E、辗转位
- 34、紫癜的特点:
- A、常发生于巩膜
 B、是由一枝小动脉及许多向外放射的细小血管形成
 C、加压不退色,直径超过2毫米
 D、加压退色、直径超过2毫米
 E、是缺氧的一种表现
- 35、柯氏斑指:
- A、口腔粘膜溃疡
 B、流脑的皮疹
 C、肝硬化病人的黄褐斑
 D、直径 $>5\text{mm}$ 的出血斑
 E、以上都不是
- 36、颈静脉搏动见于:
- A、二尖瓣狭窄
 B、二尖瓣关闭不全
 C、三尖瓣狭窄
 D、三尖瓣关闭不全
 E、主动脉瓣关闭不全
- 37、关于颈静脉怒张下列哪项正确?
- A、卧位时见颈静脉充盈
 B、见于左心功能不全
 C、见于下腔静脉回流受阻
 D、见于主动脉瓣狭窄
 E、以上都不正确
- 38、语颤增强的病变是:
- A、与支气管沟通的肺空洞
 B、肺气肿
 C、气胸
 D、支气管阻塞致肺不张
 E、胸腔积液
- 39、除下列哪项外,都有气管移位?
- A、肺不张
 B、脓胸
 C、阻塞性肺气肿
 D、渗出性胸膜炎
 E、气胸
- 40、病侧饱满、气管推向健侧、语颤减弱、叩实、呼吸音低。见于:
- A、胸腔积液
 B、气胸
 C、肺不张
 D、肺气肿
 E、胸膜肥厚
- 41、下列哪项不出现病理性支气管呼吸音
- A、肺组织实变
 B、大空洞与支气管相通
 C、气胸
 D、中等量胸腔积液上方
 E、压迫性肺不张
- 42、下列哪项不是肺实变的体征?
- A、呼吸音减弱或消失
 B、语颤增强
 C、叩诊浊音
 D、出现管状呼吸音
 E、干性罗音
- 43、对于肺实变的诊断,出现最早、最为敏感的是:
- A、语颤增强
 B、细小湿罗音
 C、飞箭音
 D、管状呼吸音
 E、语音传导增强
- 44、下列哪项不产生左室肥大?
- A、主动脉瓣关闭不全
 B、高血压
 C、二尖瓣关闭不全

- D、主动脉瓣狭窄
E、二尖瓣狭窄
- 45、下列哪种疾病是引起右心肥大的常见原因？
A、冠心病
B、阻塞性肺气肿
C、缩窄性心包炎
D、二尖瓣关闭不全
E、浸润性肺结核
- 46、第一心音不减弱的是：
A、二尖瓣关闭不全
B、主动脉瓣关闭不全
C、心肌炎
D、I度房室传导阻塞
E、二尖瓣狭窄
- 47、下列哪项病变可使第一心音增强？
A、二尖瓣狭窄
B、主动脉瓣关闭不全
C、心肌炎
D、二尖瓣关闭不全
E、二尖瓣狭窄及关闭不全
- 48、肺动脉瓣第二音增强可见于：
A、心肌炎
B、慢性肺心病
C、冠心病
D、肺动脉瓣狭窄
E、主动脉瓣狭窄
- 49、主动脉瓣第二音增强常见于：
A、主动脉瓣狭窄
B、甲亢心脏病
C、主动脉瓣关闭不全
D、高血压
E、运动后
- 50、心尖部闻及Ⅲ级粗糙向左腋下传导的收缩期杂音示：
A、二尖瓣狭窄
B、二尖瓣关闭不全
C、三尖瓣关闭不全
D、主动脉瓣狭窄
E、以上都不是
- 51、心尖部触及舒张期震颤常见于：
A、主动脉瓣狭窄
B、动脉导管未闭
C、二尖瓣狭窄
D、肺动脉瓣狭窄
E、室间隔缺损
- 52、下列哪项不是二尖瓣狭窄杂音特点？
A、在舒张早期出现但不掩盖第二心音
B、低音调
C、向左侧卧位及运动后变响
D、局限在心尖部不向远处传导
E、如伴房颤则后期加强音消失
- 53、二尖瓣狭窄最重要的体征是：
A、肺动脉瓣第二音亢进，心音分裂
B、右心室肥大
C、肺动脉瓣区舒张期杂音
D、心尖部第一心音亢进
E、心尖部有隆隆样舒张期杂音
- 54、肺动脉瓣区闻及舒张期杂音常见于：
A、二尖瓣狭窄
B、二尖瓣关闭不全
C、慢性肺心病
D、生理性杂音
E、心肌病
- 55、胸骨左缘3—4肋间触及收缩期震颤，常见于：
A、二尖瓣狭窄
B、主动脉瓣关闭不全
C、动脉导管未闭
D、房间隔缺损
E、室间隔缺损

56、主动脉瓣关闭不全最重要的体征是：

- A、周围血管征
- B、主动脉瓣第二音减弱
- C、胸骨左缘第三、四肋间舒张期杂音
- D、心尖区舒张期杂音
- E、左心室肥厚与扩张

57、属周围血管征的异常脉搏是：

- A、奇脉
- B、水冲脉
- C、短绌脉
- D、重脉
- E、交替脉

58、奇脉是指：

- A、节律正常交替出现一强一弱的脉搏
- B、节律不整而呈有规律的间歇
- C、节律不整、呈无规律的间歇
- D、吸气时显著减弱或消失的脉搏
- E、心率和脉率不相一致的脉搏

59、吸气脉搏减弱或消失见于：

- A、心肌病变
- B、冠心病
- C、心房纤颤
- D、缩窄性心包炎
- E、急性纤维素性心包炎

60、哪个不是右上腹部分区内脏器？

- A、肝右叶
- B、胆囊
- C、十二指肠
- D、结肠肝曲
- E、右肾

61、曲张静脉在腹部两侧，血流方向由下向上见于：

- A、上腔静脉阻塞
- B、下腔静脉阻塞

C、门静脉阻塞

D、脐静脉开放

E、以上均不是

62、肺肝浊音界消失表示

- A、肠梗阻
- B、右侧肺不张
- C、腹水形成
- D、胃穿孔
- E、以上都不是

63、判定腹水的可靠征象是：

- A、腹部膨隆
- B、腹部浊音区扩大
- C、腹部有水波感
- D、肝浊音界上移
- E、腹部有移动性浊音

64、下列组合哪项是错误的？

- A、腹膜刺激征——压痛、反跳痛、肌紧张
- B、腹水征——腹部膨隆、有水波感、移动性浊音
- C、腹膜结核——揉面感
- D、胃下垂——蠕动浪
- E、胃穿孔——肝浊音界消失

65、关于神经系统检查错误的是：

- A、动眼神经麻痹时病侧上睑下垂
- B、三叉神经运动支受损时张口下颌偏向病侧
- C、中枢性面瘫眶以下表情肌瘫痪
- D、迷走神经受损时发音嘶哑
- E、舌下神经核下瘫时伸舌偏向健侧

66、以竹笠自外踝下方沿足背外侧缘由后向前划的试验：

- A、戈尔登氏征
- B、巴彬斯基氏征
- C、坎本海母氏征
- D、布鲁辛斯基氏征

- E、夏道科氏征
- 67、下列哪项是错误的？
- A、震颤麻痹步态为“前冲步态”
 - B、小脑受损步态为醉汉步态
 - C、Ⅲ度肌力是能克服地球引力作主动运动
 - D、V度肌力完全瘫痪
 - E、感觉性共济失调罗母伯格氏试验 (+)
- 68、下列成人血液的检查哪项是异常的？
- A、男性红细胞 $400-500$ 万/ mm^3
 - B、女性血红蛋白 $11.5-15\text{g}\%$
 - C、网织红细胞 $0.5-1.5\%$
 - D、白细胞 $4000-1$ 万/ mm^3
 - E、淋巴细胞 $10-20\%$
- 69、大便潜血试验持续阳性多提示有：
- A、慢性胃炎
 - B、十二指肠溃疡
 - C、胃粘膜息肉
 - D、胃癌
 - E、外痔和肛裂
- 70、关于粪便检查下列哪项是错误的？
- A、总胆管完全阻塞时大便呈陶土色
 - B、上消化道出血大便是黑色
 - C、下消化道出血粪便带血色
 - D、霍乱病人大便呈粘液血便
 - E、服用硫酸亚铁粪便潜血试验阳性
- 71、关于血浆蛋白测定下列哪项是错误的？
- A、正常人血浆中含有总蛋白 $6-8\text{g}\%$
 - B、正常人白蛋白 $4-5\text{g}\%$
 - C、正常人球蛋白 $2-3\text{g}\%$
 - D、正常人 $A/G=1.5-2.5:1$
 - E、肝硬化病人 α -球蛋白明显降低
- 72、尿糖定性试验结果“卅”为：
- A、兰色不变
 - B、绿色颗粒
 - C、黄绿色沉淀
 - D、土黄色沉淀
 - E、砖红色
- 73、关于胃液常规检查下列哪项是错误的？
- A、正常空腹胃液不超过 100ml
 - B、正常胃液为淡黄色
 - C、正常空腹胃液总酸度为 $10-50$ 单位
 - D、胃溃疡时胃液分析大多正常
- 74、某病人胸水化验结果：比重 1.018 、蛋白 $2.7\text{g}\%$ 、雷丸他实验 (+ +)， RB $C200/\text{mm}^3$ 、 $WBC300/\text{mm}^3$ 、单核 8% 、多核 20% ，细菌 (-)。应诊断：
- A、漏出性胸腔积液
 - B、血性胸腔积液
 - C、化脓性胸腔积液
 - D、渗出性胸腔积液
 - E、乳糜性胸腔积液
- 75、脑脊液呈毛玻璃样混浊，放置后有蜘蛛网膜形成，氯化物明显减少，最常見于：
- A、化脓性脑膜炎
 - B、结核性脑膜炎
 - C、病毒性脑炎
 - D、脑出血
 - E、以上都不是
- 76、关于肺部基本病变的X线征下列哪项是错的？
- A、渗出表示病变为急性炎症
 - B、增殖表示病变转入慢性过程
 - C、纤维化为病灶愈合后之征象
 - D、钙化表示病变已愈合
 - E、空腔表示肺组织坏死液化后排出所形成

- 77、关于心脏后前位片，下列哪项是错误的？
- 右缘上段为升主动脉和上腔静脉合影
 - 右上段为右心房所构成
 - 左下段为左心室
 - 左上段为主动脉弓
 - 左中段为降主动脉
- 78、X线见二尖瓣狭窄的心影为：
- 球形
 - 梨形
 - 烧瓶形
 - 普大形
 - 靴形
- 79、X线示左室扩大，肺动脉段突出，右前斜位可见食管向后向右移位见于：
- 主动脉瓣狭窄
 - 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
 - 三尖瓣关闭不全
 - 以上都不是
- 80、关于心电图下列哪项是错误的？
- P波反映左右心房的除极过程
 - P—R间期反映房室交界组织内的传导，为一等电位线
 - QRS波反映左右心室的除极过程
 - S—T段反映心室除极之后到复极前的时间，为一等电位线
 - T波反映心室的复极过程
- 81、下列心电图值哪项不正常？
- $P = 0.10$ 秒
 - $P - R$ 间期 $= 0.17$ 秒
 - $QRS = 0.12$ 秒
 - $V_5 R = 0.20$ mV
 - $SV_1 = 0.7$ mV
- 82、心电图出现P波 > 0.12 秒，有切迹，电压 < 0.25 mV，可见于：
- 肺心病
 - 高血压病
 - 风心病二尖瓣狭窄
 - 冠心病
 - 风心病主动脉瓣关闭不全
- 83、下列心电图，哪项不符合左室肥大表现？
- $RV_5 > 2.5$ mV
 - $SV_1 + RV_5 < 4.0$ mV
 - QRS达 $0.10 \sim 0.11$ 秒
 - 心电图轴右偏
 - $V_5 - T$ 段压低，T波双向或倒置
- 84、作臀部肌肉注射时正确的部位应是：
- 内上方 $1/4$ 处
 - 内下方 $1/4$ 处
 - 外上方 $1/4$ 处
 - 外下方 $1/4$ 处
 - 以上均不对
- 85、皮下注射针头与皮肤的夹角应为：
- $5^\circ - 15^\circ$
 - $15^\circ - 30^\circ$
 - $30^\circ - 45^\circ$
 - $45^\circ - 60^\circ$
 - 以上都不对
- 86、输液时如将肾上腺素液漏出血管外，局部肿痛明显，最佳处理是：
- 热水袋热敷
 - 湿热敷
 - 冷敷
 - 50%硫酸镁湿热敷
 - 以上均不能用
- 87、青霉素皮试阳性的判断根据是：
- 注射部位出现丘疹

B、注射部位出现 0.5Cm 大小的红晕

C、注射部位针眼出现渗血

D、注射部位的红肿硬结无变化

E、注射部位的丘疹变大，出现红肿硬结，红晕超过 1Cm

B型题

A、铁锈色痰

B、粉红色泡沫样痰

C、大量脓痰

D、果酱样痰

E、粘液和泡沫样痰

88、急性肺水肿

89、支气管扩张

90、大叶性肺炎

心脏X线检查：

A、左前斜位心后缘下段与脊柱重叠

B、右前斜位心前间隙缩小

C、左前斜位吞服钡剂可见食道明显向后移

D、右前斜位心后区下部与脊柱之间间隙消失

E、后前位右心缘下段明显向右突出

91、左心房增大

92、右心室增大

A、血流自心房急速冲入心室，使心室肌和房室瓣膜发生振动产生

B、心室舒张早期强有力的右房血流猛烈冲入左室，冲击狭窄的瓣膜产生

C、心房收缩时心室壁的振动产生

D、肺动脉瓣与主动脉瓣关闭不同时产生

E、左心室扩张及高度衰弱产生

93、舒张早期奔马律

94、生理性第3心音

95、开瓣音

A、胸骨右缘第二肋间收缩期震颤

B、胸骨左缘第二肋间收缩期震颤

C、胸骨左缘第3、4肋间收缩期震颤

D、心尖部舒张期震颤

E、胸骨左缘第二肋间连续性震颤

96、主动脉瓣狭窄

97、动脉导管未闭

A、交替脉

B、水冲脉

C、奇脉

D、重脉

E、不整脉

98、左心功能不全

99、心包填塞

100、伤寒

A、200—500单位/毫升

B、2500单位/毫升

C、150单位/毫升

D、0.25%浓度

E、1:2000浓度

101、青霉素皮试液的浓度是

102、普鲁卡因皮试的浓度是

103、破伤风抗毒素皮试浓度是

104、结核菌素试验的一般浓度是

C型题

A、中心性发绀

B、周围性发绀

C、两者均有

D、两者均无

105、大叶性肺炎

106、慢性肺心病合并心力衰竭

A、患部叩诊呈实音或浊音

B、患部听有管状呼吸音

C、两者均有

D、两者均无

c 107、大叶性肺炎

A 108、胸腔积液

P 109、气胸

A、股动脉枪击音

B、胸骨左缘3、4肋间舒张期粗糙

哈气样杂音

C、两者均有

D、两者均无

A 110、甲状腺机能亢进

c 111、主动脉瓣关闭不全

A、酚红排泄试验

B、尿液浓缩稀释试验

C、两者均可

D、两者均不可

P 112、反映肾小球滤过功能

A 113、反映肾小管近曲小管功能

B 114、反映肾小管远曲小管功能

K型题

A 115、蜘蛛痣常见于:

①妇女妊娠期

②门脉性肝硬化

③慢性肝炎

④急性肝炎

P 116、双瞳孔缩小可见于:

①吗啡中毒

②何纳氏综合征

③有机磷中毒

④阿托品中毒

P 117、正常胸部叩诊

①前胸上部较下部稍浊

②一般左肺尖较右肺尖稍浊

③右腋下部稍浊

④讨见氏鼓音区的上界为心下缘

A 118、正常呼吸音有:

①肺泡呼吸音

②支气管呼吸音

③支气管肺泡呼吸音

④支气管语音

c 119、干性罗音的特点:

①吸气时较明显

②不固定、易变

③与咳嗽无关

④可发生在胸部任何部位

A 120、锥体束损害时神经系统检查可见:

①膝反射亢进

②巴氏征阳性

③踝震挛

④克尼格氏征阳性

P 121、患侧叩诊呈鼓音可见于:

①大叶肺炎

②肺气肿

③肺癌

④气胸

c 122、病侧语颤增强可能是:

①渗出性胸膜炎

②大叶肺炎

③肺气肿

④N型肺结核

c 123、第一心音的特点是:

①音调高、时间短

②心尖部最强

③在心尖搏动之后出现

④距第三心音之时间间隔短

P 124、关于二尖瓣开放拍击音正确的有:

①心尖部与胸骨左缘第3—4肋间之间为著

②提示瓣膜弹性尚好

③常伴有心尖区第一心音增强

④是单纯二尖瓣狭窄的表现

A 125、奇脉可见于:

①大量心包积液

- ②限制性心肌病
③缩窄性心包炎
④右心衰竭
- c 126、正常人可触及腹腔内: ✓
①腰椎椎体
②腹主动脉
③充盈的膀胱
④直肠粪块
- c 127、用标准血清鉴定A型血(玻片法)结果应是:
①A侧凝集
②A侧不凝集
③B侧不凝集
④B侧凝集
- c 128、正常脑脊液 ✓
①放置可有薄膜形成
②糖定性试验1—5管阳性 ✓
③潘迪氏试验阳性
④透明无色 ✓
- A 129、酚红排泄试验下列哪些是正确的? ✓
①正常人15分钟排泄量为25%以上
②120分钟排泄量为60%以上
③急性肾炎酚红排泄率近于正常
④酚红进入人体后大部分由肾小球排泄
- A 130、下列哪项可引起血浆白蛋白减低? ✓
①肝硬化
- ②慢性肾炎肾病型
③甲状腺功能亢进症
④慢性支气管炎
- A 131、右室肥厚心电图改变有: ✓
①I导rS; II导Rs
② $R/S \ V_1 > 1$
③ $RV_1 + SV_5 > 1.2mV$
④TaVr倒置、 $R/S > 1$
- A 132、下列哪些情况不宜采取胃液或洗胃? ✓
①食道癌、食道狭窄
②肝硬化食道下段静脉曲张
③消化性溃疡出血期
④昏迷病人
- c 133、下列正确的叙述是:
①胸腔穿刺部位——肩胛下角线第7~9肋间,上位肋骨下缘
②腹腔穿刺部位——脐与左侧髂前上棘连线中1/3与外1/3交点处
③心脏穿刺部位——左锁骨中线外第五肋间、心界内2cm
④骨髓穿刺部位——髂前上棘后1cm处
- A 134、腰穿禁忌症为: ✓
①、脑膜炎
②、颅内占位性病变
③、神志不清
④、腰骶部溃疡

诊断学基础参考答案

1 C 2 D 3 E 4 D
5 B 6 E 7 B 8 C

9 A 10 A 11 C 12 C
13 C 14 C 15 E 16 C

17 B 18 C 19 D 20 E
 21 B 22 C 23 B 24 A
 25 E 26 D 27 D 28 E
 29 B 30 E 31 B 32 C
 33 A 34 C 35 E 36 D
 37 E 38 A 39 C 40 A
 41 C 42 E 43 E 44 E
 45 B 46 E 47 A 48 B
 49 D 50 B 51 C 52 A
 53 E 54 A 55 E 56 C
 57 B 58 D 59 D 60 C
 61 B 62 D 63 E 64 D
 65 E 66 E 67 D 68 E
 69 D 70 D 71 E 72 D
 73 B 74 D 75 B 76 E

77 E 78 B 79 C 80 B
 81 C 82 C 83 D 84 C
 85 C 86 D 87 E 88 B
 89 C 90 A 91 C 92 B
 93 E 94 A 95 B 96 A
 97 E 98 A 99 C 100 D
 101 A 102 D 103 C 104 E
 105 A 106 C 107 C 108 A
 109 D 110 A 111 C 112 D
 113 A 114 B 115 A 116 B
 117 B 118 A 119 C 120 A
 121 D 122 C 123 C 124 E
 125 A 126 E 127 C 128 C
 129 A 130 A 131 A 132 A
 133 C 134 D

二、呼吸系统疾病

A型题

- 患者男性，60岁，咳嗽、咳痰十余年，近三年出现气喘。查：两肺散在哮鸣音及肺底湿罗音，心脏（-）。其最可能诊断是：
 - 支气管哮喘
 - 肺结核
 - 支气管扩张
 - 心源性喘息
 - 慢性支气管炎（喘息型）
- 慢性支气管炎的病人，咳嗽，咳痰，下列用药中哪项是错的？
 - 必嗽平

B、碘化钾

C、可待因

D、氨茶碱

E、抗菌药

- 慢性支气管炎不包括下列哪项？

- 老年人因免疫球蛋白IgA分泌减少易招致感染而患慢支
- 细菌和病毒感染是本病重要而常见的因素
- 长期咳嗽，咳痰或伴有喘息和反复感染为慢支主要表现
- 有时肺底可听到散在干湿罗音，往往在咳嗽或咳痰后消失

- E、最大通气量和时间肺活量均减弱
- 4、慢性支气管炎最常见的并发症是：
- A、阻塞性肺气肿
B、肺部感染
C、咯血
D、支气管扩张
E、肺源性心脏病
- 5、引起支气管哮喘发作释放生物活性物的细胞是：
- A、浆细胞
B、吞噬细胞
C、肥大细胞
D、杯状细胞
E、以上均不是
- 6、哮喘持续状态出现呼吸困难加重而哮鸣音反而减轻或消失时，一个错误的判断是：
- A、哮喘持续状态趋向缓解
B、患者过度疲劳
C、痰液栓塞细支气管
D、严重呼吸衰竭
E、并发自发性气胸
- 7、支气管哮喘与心源性哮喘的鉴别，下列哪项有意义？
- A、两肺满布湿性罗音
B、两肺满布哮鸣音
C、夜间阵发性呼吸困难
D、有无心脏病史及体征
E、静脉注射氨茶碱有效
- 8、外源性支气管哮喘发作，过敏原进入人体后，刺激相应的 B 淋巴细胞产生特异性的：
- A、IgG
B、IgM
C、IgE
D、IgA
E、IgD
- 9、一中年患者突然发作喘息，紧急处理时除吸氧外，应首选哪种药物？
- A、毒K 0.25mg 静注（加入葡萄糖液中）
B、吗啡 10mg 皮下注射
C、氨茶碱 0.25mg 皮下注射
D、地塞米松 20mg 加葡萄糖中静注
- 10、发生肺气肿的主要因素为：
- A、肺泡壁弹性减退
B、肺泡内压增高
C、肺通气血流比例失调
D、肺部呼吸运动受限
E、细支气管不完全阻塞
- 11、慢性支气管炎并发肺气肿后其主要临床表现是：
- A、咳嗽，咳痰加剧
B、呼吸困难和发绀逐渐加剧
C、肺部湿性罗音逐渐增多
D、咯血逐渐加剧
E、以上都不是
- 12、下列哪项不符合肺气肿的临床表现？
- A、桶状胸廓
B、叩诊过清音
C、语颤增强
D、呼气延长
E、肝浊音界下移
- 13、肺气肿病人，二小时前突然呼吸困难，胸痛，大汗淋漓，紫绀，可能性最大的是：
- A、干性胸膜炎
B、急性心肌梗塞
C、大量胸腔积液
D、支气管肺炎
E、以上都不是
- 14、初诊支气管扩张症肺部平片，下列哪

- 项最可靠?
- 肺纹理增浓
 - 下肺野囊状或蜂窝状阴影
 - 下肺片状或云雾状阴影
 - 无原因的下叶不张
 - 以上均不是
- 15、支气管扩张最有意义的体征是:
- 贫血
 - 杵状指
 - 下胸部及背部局限性湿性罗音
 - 消瘦
 - 局限性哮鸣音
- 16、支气管扩张症的诊断依据中最有确诊价值的是:
- 胸部X线平片检查
 - 长期咳嗽,大量脓痰或反复咯血的症状
 - 肺部局限性湿罗音及杵状指等体征
 - 支气管碘油造影
 - 化验检查
- 17、诊断肺炎,下列哪项有价值?
- 白细胞总数,中性粒细胞均增高
 - 痰培养肺炎球菌(+)
 - 肺实变体征
 - X线大片阴影,呈叶或段分布
 - 肺部湿性罗音
- 18、治疗支原体肺炎,首选抗菌素为:
- 青霉素
 - 四环素
 - 庆大霉素
 - 氯霉素
 - 以上都不是
- 19、肺炎球菌肺炎基本病理改变是:
- 肺泡间质充血、水肿、炎细胞浸润
 - 肺泡壁破裂、变性、坏死
 - 肺毛细血管充血,肺泡内浆液纤维蛋白渗出及血、白细胞浸润
 - 肺毛细血管充血、水肿、纤维母细胞形成
 - 以上都不是
- 20、中毒型肺炎与典型大叶肺炎的区别在于:
- 有无胸痛
 - 发热的程度
 - 白细胞总数的多少
 - 肺实变体征的有无
 - 有无末梢循环衰竭
- 21、关于肺炎球菌肺炎下列哪项不正确?
- 发病初期为刺激性干咳
 - 可无铁锈色痰
 - 可有口唇单纯疱疹
 - 可发生黄疸
 - 所有病人都有高热
- 22、肺炎球菌肺炎咯铁锈色痰的原因是:
- 痰内有大量红细胞
 - 痰内混有大量肺泡巨噬细胞
 - 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
 - 红细胞破坏后释放的含铁血黄素
 - 以上都不是
- 23、关于肺炎球菌肺炎的治疗下列哪项是错误的?
- 一切病例可单用青霉素肌注
 - 中毒型肺炎宜加大青霉素剂量,并联合给药
 - 对青霉素过敏者可改用红霉素族
 - 临床症状消失,X线病灶完全吸收后方可停药
 - 磺胺类药物对肺炎球菌作用强,可口服
- 24、30岁男性以往健康,突然寒战高热、

- 咳嗽，胸痛，四肢厥冷，出汗，指端发绀，心率120次/分，血压80/50 mmHg最可能的诊断为：
- 结核性胸膜炎
 - 中毒性肺炎
 - 肺脓肿
 - 支原体肺炎
 - 肺炎合并心力衰竭
- 25、急性肺脓肿最常见的感染途径是：
- 血源性
 - 吸入性
 - 直接蔓延
 - 继发于呼吸道其它疾病
 - 淋巴引起
- 26、关于急性肺脓肿，下列哪项是错误的？
- 发病后两周左右咳大量脓痰常有恶臭
 - 以厌氧菌为主的混合感染，一般细菌培养不易生长
 - 好发于右上叶后段或两下叶背段
 - X线胸片可见浓密阴影并有空洞液平
 - 有效抗菌治疗一般不超过四周
- 27、男性50岁，突然出现寒战高热，弛张热型，咳嗽，痰少，10天后突然痰量增加，每天约200ml，有恶臭，查：右上肺叩诊浊音，听诊可闻支气管呼吸音及湿罗音，诊断最可能是：
- 支气管扩张合并感染
 - 肺炎球菌肺炎
 - 急性肺脓肿
 - 干酪性肺炎
 - 肺癌合并感染
- 28、肺结核复治病例化疗时最好选用：
- 异烟肼+链霉素
 - 异烟肼+链霉素+对氨基水杨酸钠
 - 链霉素+吡嗪酰胺
 - 异烟肼+利福平+乙胺丁醇
 - 异烟肼+对氨基水杨酸钠
- 29、某女性肺结核合并妊娠者，突然咯血，量已达200ml尚未控制者，首选药物是：
- 肌注安络血
 - 肌注6-氨基乙酸
 - 静注普鲁卡因
 - 静滴脑垂体后叶素
 - 静滴抗血纤溶芳酸
- 30、结核性胸膜炎用激素治疗的一般疗程为：
- 1—2周
 - 2—3周
 - 4—6周
 - 8—10周
 - 以上都不是
- 31、浸润型肺结核痰菌阳性，初治时宜选用：
- 异烟肼
 - 异烟肼+链霉素
 - 乙胺丁醇+链霉素
 - 利福平+对氨基水杨酸钠
 - 利福平+卡那霉素
- 32、肺结核咯血后症状加重，发热持续，提示：
- 继发感染
 - 肺不张
 - 细菌耐药
 - 病变播散
 - 再度出血
- 33、肺结核空洞与慢性肺脓肿空洞及癌性空洞最可靠的鉴别方法是：
- 支气管碘油造影