

利濕之劑 十三首附方八

五苓散仲景治太陽府。太陽經熱傳入。膀胱府者用之。白朮

澤瀉猪苓茯苓膀胱化氣添宮桂利便消

暑煩渴清。猪苓茯苓白朮炒各十八銖

三錢。二苓甘淡利水。澤瀉甘鹹。瀉水。

能入肺腎而通膀胱導水以泄火邪。加

白朮者補土所以制水。加官桂者氣化

乃能出也。經曰膀胱者州都之官津液

藏焉氣化則能出矣。除桂名為四苓散。無寒但渴

服之靈。濕勝則氣不能施化。故猪苓湯

仲景除桂與朮加入阿膠滑石停。猪苓茯苓

醫方集解卷之六

收瀉之劑。滑則氣脫。脫則散而不收。必有

汗出亡陽。精滑不禁。泄痢不止。大便不固。諸

久嗽亡津。此氣脫也。若亡血不已。崩中暴下。諸

氣脫兼以氣藥。血脫兼以血藥。亦兼氣藥。氣者血之

帥也。陽脫者見鬼。陰脫者目盲。神脫

脫也。當補陽助陰。非瀉劑所能收也。

赤石脂禹餘糧湯。治傷寒服湯藥下利不止。心下痞

鞭服瀉心湯已復。以他藥下之利不止。醫以理中與之

利益甚。理中者理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯

主之。下焦主分。復利不止者。當利其小便。利小便所以



膠以存津液。此為利濕兼瀉熱疸黃。小便利閉。

渴嘔寧

五苓治濕勝。猪苓兼熱勝。

小半夏加茯苓湯

仲景行水散痞有半夏

夏半

一升茯苓三兩生薑半斤

除夏治悸

厥茯苓甘草湯名彰

加桂枝甘草除半夏名茯苓甘草湯

仲景治傷寒水氣乘心厥而心下悸者先治其水却治其厥。火因水而下。行。

則悸眩止而痞滿消矣。

腎着湯

金

內用乾薑茯苓甘草白朮襄傷

濕身痛與腰冷亦名甘薑苓朮湯

乾薑炮茯苓

苓各四兩甘草炙白朮炒各二兩。數藥行水補上。此濕邪在經而未入府藏。

此手陽明藥也。渣可去。脫重可達下。石脂餘糧之湯以

止脫重以固下。甘以益氣。

李先知曰下焦有難會須用餘糧赤

桃花湯

仲景

治少陰病二三日至四五日腹痛

下利不止便膿血者

成氏曰陽明下利便膿血者少陰下利腹痛便膿血者

不約而裏寒也。凡下利便膿血身涼脉小者易治身熱脉大者難治。

赤石脂

一兩

乾薑

一兩

粳米

一升

此足少陰藥也。李時珍曰。赤石脂之重。瀉入下焦血分。而固脫。乾薑之辛溫。煖下焦氣分。而補虛。粳米之甘溫。

佐石脂乾薑而潤腸胃也。

朱丹溪曰。桃花湯主下焦血虛且寒。非乾薑之溫。石脂之

重。瀉不能止血。用粳米之甘。以引入腸胃。準繩曰。便膿血熱勢下流也。成氏釋為裏寒非也。桃花湯雖用乾薑。



University of Toronto Medical Library

者黃耆防己湯金除薑朮甘草炙共

煎當此治風水與諸濕身重汗出服之

良黃耆防己各兩白朮七錢半甘草

炙五錢加薑朮煎防己大辛苦寒

通行十二經開竅行水黃耆生用達表

白朮燥濕強脾並能止汗加甘草者益

防己之峻急也舟車丸河牽牛及大黃遂乾花又木香

青皮橘皮加輕粉燥實陽水却相當口

面赤氣粗便閉而腫脹者為陽水黑牽

牛四兩炒大黃二兩酒浸甘遂麵裹炒

羌花醋炒大戟麝香皮炒橘紅各

一兩木香五錢輕粉一錢水丸牽牛

大黃遂乾花行水瀉藥木香青陳以

行氣少加輕粉以透經絡然非實症不

然分兩最微石脂梗米居多以調正氣瀉滑

薑用辛以散之之義謂便膿血皆傳經之熱

臯曰少陰腎水主禁固二便為火所灼故

故下利膿血石脂寒能勝熱瀉可收脫用乾

辛熱以從治用梗米者恐石脂性寒損胃也

而猶昧此況其下乎程郊倩曰此症終是火衰不能生

土未可指為傳經之熱邪也不知此而漫云滲泄腎防

一微前後泄利而陽神陷矣昂按成氏生于千載之後

而能昌明仲景之書使後學有所循入其功非小奈何

後起之士動輒非之成氏之死已久安能起而辨其是

非乎如此症成氏以為寒而王肯堂吳鶴臯皆以為熱

竊謂使膿血者固多屬熱然豈無下焦虛寒腸胃不固

而亦便膿血者乎若以此為傳經熱邪仲景當用寒劑

以徹其熱而反用石脂固瀉之藥使熱閉于內而不得

泄豈非關門養盜自貽伊戚也耶觀仲景之治協熱利

如甘草瀉心生薑瀉心白頭翁等湯皆用芩連黃栢而

治下焦虛寒下利者用赤石脂禹餘糧湯此類以觀斯

可見矣此症乃因虛以見寒非大寒者故不必用熱藥

惟用甘草溫之劑以鎮固之耳本草言石脂性溫能益

氣調中固下未聞寒能損胃也若準繩則執凡傳經者

可輕

疏鑿飲 檳榔及商陸苓皮大腹同煎 日赤

豆凡菴瀉木通煎薑薑皮陽水服

商陸

茯苓皮大腹皮椒目赤小豆秦艽菴活

澤瀉不通等分煎薑皮棗煎凡菴散

濕上升通瀉瀉濕下降苓腹薑皮行水

于皮膚椒豆商檳攻水于腹裏亦上下

表裏分

消之意

實脾飲嚴 苓朮與木瓜甘草木香大腹加

草蔻附薑兼厚朴虛寒陰水效堪誇

利便

不渴而腫脹者為陰水茯苓白朮土炒

木瓜甘草木香大腹皮草豆蔻煨附子

炮黑薑厚朴炒加薑棗煎脾虛補以

苓朮甘草脾寒溫以蔻附黑薑脾濕利

皆屬熱邪一語遂以為熱耳程郊倩每以直中為寒邪傳經為熱邪古今相傳二語覺未盡然不為無見若藥未深造而輕議古人多見其不知量也矣

訶子散

東垣

治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛

膿血日夜無度

御米穀

去蒂蜜炒五分

訶子

煨去核七分

乾薑

炮六分

橘紅

五分

右末

空心服

此手足陽明藥也御米穀酸澁微寒固腎瀉腸訶子酸

澁苦溫收脫住瀉炮薑辛熱能逐冷補陽陳皮辛溫能

升陽調氣以固氣脫亦可收形脫也

泄瀉為氣脫脫肛為形脫

河間訶子散

一兩半生半煨

木香

五錢

甘草

二錢

黃連

三錢為末



以茯苓大腹。脾滯導以厚朴木香。又土之不足由木之有餘。木瓜木香皆能平肝瀉木使木不尅土而脾和。則土能制水而脾實矣。經曰濕勝則地泥實土正所以制水也。

五皮飲澹用五般皮陳茯苓桑大腹奇陳皮

茯苓皮薑皮桑白皮大腹皮或用五加皮易桑白脾

虛膚脹此方司。脾不能為胃行其津液故水腫半身以上宜注

半身以下宜利小便此方于瀉水之中仍寓調補之意皆用皮者水溢皮膚以

皮行皮也。

羌活勝濕湯局羌獨活甘蔓藥本與防風

濕氣在表頭腰重痛發汗升陽有異功

每服二錢用白朮為藥湯調下治瀉久腹痛

漸少以此止之如不止加厚朴一兩竭其餘邪

行氣清火止痢厚腸甘草芍藥甘草湯也甘緩酸收

散滿平胃調中故更藉之以去餘邪也

真人養藏湯治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫肛為大

腸之使大腸受熱受寒皆能脫肛。大腸者傳導之官

腎者強作之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺因以虛

未壯老人血氣已衰皆易脫肛亦治下痢赤白臍腹

疼痛日夜無度

醫藥穀去蒂蜜炙訶子麵裹煨一兩肉豆蔻麵裹煨五錢木香

二兩肉桂八錢人參白朮炒當歸六錢烏炒生甘

風能勝濕升能降氣升則水自降不與行水滲

濕同風藥上升使濕從汗散風能勝濕故用獨活

各一錢川芎甘草炙蔓本防風各五分蔓荆子三分如有寒濕加附子防己

若除獨活芎蔓草除濕湯升麻蒼朮充

除獨活川芎蔓荆甘草加升麻蒼朮名羌活除濕湯治風濕身痛

大橘皮湯治濕熱五苓六一二方綴陳皮

木香檳榔增能消水腫及瀉泄用五苓散赤茯苓

苓一錢猪苓澤瀉白朮桂各五分用六一散滑石六錢甘草一錢加陳皮錢半

木香檳榔各三分每服五錢加薑煎小水併入大腸致小便利而大便泄

瀉二散皆行水消熱之藥加檳榔峻下陳皮木香理氣以利小便而實大便也

草八錢

每服四錢藏寒甚加附子一方無當歸

此手足陽明藥也脫肛由于虛寒故用參朮甘草

其虛肉桂肉蔻以祛其寒木香溫以調氣當歸潤以

血芍藥酸以收斂訶子罌殼則潛以止脫也此虛寒脫肛之劑宜

大補元氣或加芎歸調血及升柴以升提之又有氣熱

血熱而肛反挺出者宜用芩連槐栢或四物加升麻柴胡秦朮防

風之類

附丹溪脫肛方人參黃耆當歸川芎升麻此治氣血兩虛而脫肛者

當歸六黃湯治陰虛有火盜汗發熱心之所藏在內者為血發于外者為汗汗乃心之液也五藏六府表裏之陽皆心主之以行其變化隨其陽氣所在之處而生津亦隨其火擾所



水腫亦濕熱為病故皆治之。

茵陳蒿湯

治疸黃陰陽寒熱細推詳陽

黃大黃梔子

入。瘀熱在裏口渴便閉身如橘色脉沉實者為陽

黃茵陳六兩大黃二兩酒浸梔子十四枚。

○茵陳發汗利水能泄太陰陽明之濕熱梔子導濕熱出小

便大黃導濕熱出大便陰黃附子與乾

薑以茵陳為主如寒濕陰黃色暗便澀者除梔子大黃加乾薑附子以燥濕

散亦有不用茵陳者仲景柏皮梔子湯

黃栢二兩梔子十五枚甘草一兩按陽

黃胃有瘀熱者宜下之如發熱者則勢

外出而不內入不必汗下惟用梔子黃

栢清熱利濕以解和之若小便利色白

無熱者仲景作虛

勞治用小建中湯

之虛泄而為汗。是汗盡由心出也。醒而出汗曰盜汗。陽虛睡而出汗曰盜汗。屬陰虛。汗者心之陽。陰虛睡而汗出。衛外之陽乘虛而入陰中。表液失其固。故澌澌然汗出。覺則陽氣復而汗止矣。因熱邪乘虛而出者汗必熱。因寒邪乘陽虛而出者汗必冷。凡傷風濕。謂有面赤口乾唇燥便赤音重脉數諸症。○凡傷風濕。中暑風溫。柔痙氣虛血虛脾虛胃熱亡陽。痰飲驚怖。勞役房室。癰瘍。產後等症。皆能令人出汗。經又云。飲食飽甚。汗出于胃。驚而奪精。汗出于心。持重遠行。汗出于腎。疾走恐懼。汗出于肝。搖體勞苦。汗出于脾。凡頭汗左。額屬肝。右額屬肺。鼻屬脾。頤屬腎。額屬心。津液自胃府旁達于外。為手足汗。有胃熱胃寒二症。自汗亦有屬實者。故外感初症多自汗。

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃栢 黃連等

者加倍

此手足少陰藥也。盜汗由于陰虛。當歸二地所以滋陰。

方頁次五濕

八正散局 木通與車前。扁蓄大黃滑石研。

甘 草稍瞿麥兼梔子煎加燈草痛淋瀝。

一方有木香治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿。木通燈草瞿麥降心火。八小腸車前清肝火。八膀胱梔子瀉三焦鬱火。大黃滑石瀉火利水之捷藥。扁蓄利便通淋。草稍入莖止痛雖治下焦而不專于治下。必三焦通利水乃下行也。

萆薢分清飲 石菖蒲 草稍烏藥益智俱

甘草稍減半。或益茯苓鹽煎服。少許通餘藥等分。

心固腎濁精區遺精白濁。草薢能泄厥陰陽明濕熱去濁分

清烏藥疏逆氣而止便數益智固脾腎而開鬱結。石菖蒲開九竅而通心。甘草

汗由火擾黃芩栢連所以瀉火。濕無熱不作汗。濕得熱蒸則令人出汗。

由腠理不固信用黃耆所以固表。李時珍曰。當歸湯加麻黃根。不獨在表。

甚捷。蓋其性能行周身肌表。引諸藥至衛分。而固腠理也。按此盜汗與傷寒盜汗不同。傷寒盜汗邪在裏。故以和表為主。古法小柴胡加桂主之。此屬陰虛。

以補陰為主。李士材曰。陰虛則元氣有降而無升。而復用此苦寒肅殺之劑。得毋犯虛虛之戒乎。惟火實氣強者宜之。不然苦寒損胃。禍瀾深耳。○準繩曰。陰虛陽必

凌。故發熱自汗。當歸六黃湯加地骨皮。陽虛陰必乘。故發厥自汗。黃耆建中湯。甚者加附子。或者附湯有熱熱

合邪。汗出不休。以風藥勝其濕。苦藥泄其熱。左活勝濕湯有痰症。冷汗自出。宜理氣降痰。痰去則汗自止。有用

固澀藥。汗愈不收止。可理心血。汗乃心之液。心失所養不能攝血。故溢而為汗。宜大補黃耆湯加酸棗仁。有微

熱者。更加石斛下靈砂。凡王海藏曰。晉郎中童子盜汗七年。諸藥不效。予與涼膈散三黃丸。三日病已。蓋腎主

五液。化為五濕。腎水上行。乘心之虛。心火上炎而八肺。取其不勝。皮毛以是而開。為汗出也。先以涼膈散瀉胸

中熱。後以黃耆湯固表。汗自止。此治盜汗之良法也。

稍達腎莖而止痛使濕熱去而心腎通則氣化行而淋濁止矣此以疎泄為禁通者也

九便數需

鹽湯下治便數遺尿

縮泉丸

益智問烏藥等分山藥為糊

當歸拈痛

湯東垣

羌防升猪澤茵陳本葛剛

二木苦參知母草

瘡瘍濕熱服皆應歸

酒洗羌活防風升麻猪苓澤瀉茵陳黃芩酒炒葛根蒼朮白朮土炒苦參知母並酒炒甘草炙○羌活通關節防風散留濕苦參黃芩茵陳知母以泄濕熱當歸以和氣血并葛助陽而升清苓瀉瀉濕而降濁參甘二朮補正固中使苦寒不傷胃疏泄不損氣也劉宗厚曰此方東垣本治濕熱脚氣後人用治諸瘡甚驗

潤燥之劑

十三首附方二

中相火次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本藏玄府閉而汗自止矣

附撲汗法

白朮藁本川芎

各二錢半米粉兩

為末

身撲之治汗出不止又方龍骨牡蠣糯米等分為末撲

之

牡蠣散

治陽虛自汗

牡蠣

煨研

黃耆

研

麻黃根

錢

浮小麥

百粒

煎服

此手太陰少陰藥也陳來章曰汗為心之液心有火則汗不止牡蠣浮小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽為陰之衛陽氣虛則衛不固黃耆麻根之甘溫走肌表而固衛

栢子仁丸

治陰虛盜汗



醫藥大學圖書館藏

炙甘草湯仲景參薑桂麥冬生地太麻仁大

棗阿膠加酒服虛勞肺痿效如神甘草炙人

參生薑桂枝各三兩阿膠蛤粉炒二兩

生地一斤麥冬麻仁研各半斤棗十二枚

水酒各半煎仲景治傷寒脉結代心

動悸及肺痿唾多千金翼用治虛勞實

鑑用治呃逆外臺用治肺痿○參草麥

冬益氣復脉阿膠生地補血養陰棗麻

潤滑以緩脾胃薑

桂辛溫以散餘邪

滋燥養榮湯兩地黃芩甘歸芍及芫防先防

風藥潤劑爪枯膚燥兼風秘火燥金傷血液

亡當歸酒洗二錢生地熟地白芍炒黃

芩酒炒秦芫各一錢防風甘草各五分

活血潤燥生津飲丹二冬熟地黃桃

活

栝子仁炒研去油二兩人參白朮半夏五味子

麻黃根一兩麥麩五錢棗肉丸米飲下五十丸

此手足太陰少陰藥也陳來章白心血虛則睡

栝子仁之甘辛平養心寧神為君牡蠣麥麩之鹹涼靜

躁收脫為臣五味酸斂瀝收半夏和胃燥濕為佐濕能作汗

麻黃根端走肌表引人參白朮以固衛氣為使

茯苓丹局方

治遺精白濁及強中消渴

心腎為水火之藏法天施地生之道

心神傷則

火動火動不已則腎水受傷腎主藏精所受

五藏六府

輸至之精皆不得藏而時下矣故為遺精夢

泄戴氏曰

遺精有因用心過度心不攝腎以致失精者

有思色慾

不遂致精失位偷泄而出者有色慾太過滑

泄不禁者

亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者赤濁

白濁血由心

小腸屬火也白濁屬氣由肺大腸屬金也又



仁紅花及歸芍利秘通幽善澤枯熟地

白芍各一錢。天冬麥冬枯蓼各八分。桃仁研紅花各五分。

葦汁牛乳飲丹反胃滋養榮散痰潤腸奇

五汁安中飲張葦梨藕三般加入用隨

宜牛乳半升葦菜汁少許滾湯頓服名葦汁牛乳飲牛乳六分葦汁薑汁藕

汁梨汁各一分和服名五汁安中飲並治噎膈。反胃噎膈由火盛血枯或有

痰血寒痰阻滯胃口故食入反出也。牛乳潤燥養血為君。葦汁藕汁消痰益胃

薑汁溫胃散痰梨汁消痰降火聽審症用之或加陳酒亦佳以酒乃米汁也。

潤腸丸東垣用歸尾羌桃仁麻仁及大黃歸尾

羌活大黃各五錢桃仁大麻仁各一兩蜜丸。歸尾桃仁潤燥活血羌活散火

易頭狀舌燥

曰赤濁為心虛有熱因思慮而得白濁由腎虛而得。由嗜慾而得。渴症下消者名強中。腎水虧心火亢。

菟絲子十兩五味子八兩石蓮肉三兩白茯苓三兩

菟絲用酒浸浸過餘酒煮山藥糊為丸漏精鹽湯下赤

濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴米飲下

此手足少陰藥也。菟絲辛甘和平強陰益陽能治精寒

淋渴五味滋腎生津石蓮清心止濁山藥健脾利濕皆

瀉精固氣之品也。茯苓能通心氣于腎利小便而不走

氣取其淡滲于補正中能泄腎邪也。

治濁固本丸 治胃中濕熱滲入膀胱下濁不止淋病在溺竅屬

肝胆部濁病在精竅屬膀胱部或由濕熱或由虛寒大抵熱者多而寒者少赤屬血白屬氣或由敗精瘀血

治濁固本丸



搜風。大黃破結通。或加芫防皂角子。風

納麻仁滑腸利竅。加秦芫防風皂角子。燒存性研。皂

子得濕則滑。善通便秘。芫防治風。風秘

血秘善通腸。風燥血燥。致大便秘。

通幽湯。東垣中二地俱桃仁紅花歸草濡升

麻升清以降濁。清陽不升。則濁陰不降。故大便不通。生地熟地

各五分。桃仁研。紅花當歸。身甘草炙。升麻各一錢。噎塞便閉此

方需有加麻仁大黃石當歸潤腸湯名

殊。上藥皆潤。燥通腸。

搜風順氣丸。大黃熟郁李麻仁山藥增防

獨車前及枳殼菟絲牛膝山茱仍中風

壅塞。寒道痛溢。異常。非是熱淋。不宜用淋藥治。

蓮鬚。黃連。炒二兩。黃柏。益智仁。砂仁。半夏。

本。猪苓。二兩。甘草。炙三兩。

此足少陰太陽太陰藥也。精濁多由濕熱與痰黃連瀉

心火黃柏瀉腎火。所以清熱。二苓所以利濕。半夏所以

除痰濕熱。多由于鬱滯。砂仁益智。辛溫利氣。又能固腎

強脾。既以散留滯之氣。且稍濟連柏之寒。甘草和中而

補土。惟蓮鬚之瀼。則所以固其脫也。朱丹溪曰。巢氏原

由勞傷腎氣虛冷故也。歷代宗其說。不惟白濁之理。不明。所治之法。亦誤。不思內經本無白濁之名。惟言少

陰在泉。客勝洩便變少陽在泉。客勝則洩白。又言思想無窮。入房大甚。發為白淫。與脾移熱于腎。出白。二者皆



風秘及氣秘腸風下血總堪憑

大黃九蒸九晒

五兩。大蘇仁郁李仁去皮。山藥酒蒸。車前子牛膝酒蒸。山藥肉各三兩。莧絲子酒浸。防風獨活。枳椇枳殼。麩炒各一兩。蜜丸。○防獨潤腎搜風。枳椇順氣破滯。大黃經蒸晒。則性稍和緩。同二仁滑利。潤燥通幽。牛膝車前下行利水。加山藥山藥菟絲固本益陽。不使過于攻散也。

消渴方丹中花粉連藕汁生地汁牛乳研

粉連研末或加薑汁蜜為膏服。瀉火生

津益血痊。黃連瀉心火。生地滋腎水。藕汁益胃。花粉生津。牛乳潤燥。

益血。

白茯苓丸治腎消。花粉黃連草解調。二參

易貢次去燥

隨洩而下。夫非白濁之源乎。原病式因舉內

水液渾濁。皆屬於熱。言天氣熱而水渾濁。寒則清。謂發聖人之旨。以正千載之誤矣。予嘗聞先

濁多因濕熱。下流膀胱而成。即靈樞所謂中氣不足。便為之變是也。必先補中氣使升舉之。而後分其

氣血赤白虛實以治。與夫其他邪熱所傷者。固在熱

補虛設腎氣虛甚或火熱亢極者。則不宜過用寒涼之

劑。必以反佐治之。要在權衡輕重而已。葉氏曰。遺精多

作腎虛補滋之而罔效。不知此因脾胃濕熱所乘。飲酒

厚味。痰火之人。多有此疾。腎雖藏精。其精本于脾胃。飲

食生化而輸于腎。若脾胃受傷。濕熱內鬱。使中氣滑而

不清。則所輸皆濁氣。邪火擾動。心不得而安靜。故全遺

也。滑。水陸二仙丹。治遺精白濁。精與濁所出之竅不同。便濁

水陸二仙丹

治遺精白濁

精與濁所出之竅不同。便濁

乃精氣滑出。不便亦然。此腎水

金櫻膏

取半斤。黃耆熟膏一斤。蒸

和丸。臨湯

水陸二仙丹

治遺精白濁

和丸。臨湯

熟地覆盆子。石斛蛇床。脬脰音皮曉。要雞脬皮

也。茯苓花粉黃連。蓮藕人參。玄參熟地。黃覆盆子各一兩。石斛蛇床子各七錢。半。雞脬皮三十具。微炒蜜丸。磁石湯下。○黃連降心火。石斛平胃熱。熟地。玄參生腎水。覆盆子。蛇床。固腎精。人參補氣。花粉生津。茯苓交心腎。蓮藕利濕熱。脬脰治陽消。磁石色黑。屬水。假之入腎也。

猪腎薺菴湯干。參。換神。知。苓。葛。草。石。膏。因。

磁石。天花。同。黑。豆。強。中。消。渴。此。方。珍。

之症。莖長興盛。不交精出。名強中。緣服邪術。熱藥而毒盛也。猪腎一具。大豆一升。薺菴人參。石膏各三兩。磁石。綿裹。茯苓。知母。黃芩。葛根。甘草。花粉各二兩。先煮豆。腎。去。滓。下。藥。分。三。服。○知。苓。石。膏。以。瀉。邪。火。人。參。甘。草。以。固。正。氣。葛。根。花。

酒下。

此足少陰藥也。金櫻子。芡實。甘能益精。潤能滋陰。脫。一。生。子。水。一。生。子。山。故。名。水。陸。二。仙。丹。

金鎖固精丸。治精滑不禁。精滑者。火炎上。而水趨下。心腎不交也。

沙苑蒺藜炒。芡實蒸。蓮鬚二龍骨。酥。牡蠣鹽水煮一日。夜煨粉一兩。

蓮子粉糊為丸。鹽湯下。

此足少陰藥也。蒺藜補腎益精。蓮子交通心腎。牡蠣清

熱。補水。芡實。固腎。補脾。合之。蓮鬚。龍骨。皆瀉精。秘氣之

品。以止滑脫也。治遺精。六法有五。心。神。浮。越。者。辰。砂。礞

之類。寧之。思。悲。傷。陰。者。潔。古。珍。珠。粉。丸。黃。柏。蛤。粉。等。食。滋。陰。降。火。思。悲。傷。陽。者。謙。甫。鹿。茸。菟。絲。等。補。陽。藥。



粉以生津濟危黑二最能解
毒磁石猪腎引之入腎也

地黄飲子簡易參耆甘二地二冬枇杷斛參澤

瀉枳實疏二府燥煩消渴血枯含人參黃耆

甘草炙天冬麥冬生地枇杷葉蜜炙石
斛澤瀉枳實麩炒每服三錢○參耆甘
草以補其氣氣能生水二地二冬以潤
其燥潤能益血石斛平胃枇杷下氣澤
瀉瀉膀胱之火枳實宣大腸之滯使二
府清則心肺二藏之氣得以下降而渴
止自

酥蜜膏酒千金用飴糖二汁百部及生薑杏

棗補脾兼潤肺聲嘶氣憊酒溫膏酥蜜

棗肉杏仁細研百部汁生薑汁共
煎一炊久如膏溫酒細細嚥服之

陽俱虛者丹溪作心虛治用珍珠粉丸定志
本事猪苓丸猪苓末二兩先將一半炒半夏
夏為末糊丸更用猪苓末一半同炒微裂砂
未間空心酒鹽湯任下釋曰半夏有利性猪苓導水
腎閉導氣使通之意也定志丸見目門

人參樗皮散 治藏毒挾熱下血久痢膿血不止挾熱者謂挾各

熱及飲酒煎炙之熱也久痢不止氣虛也

人參 樗根白皮東引者去粗皮醋炙等分為末米飲或酒調

下

此手足陽明藥也人參之甘以補正氣樗皮之苦以燥

其濕寒以解其熱瀉以收其脫使虛者補而陷者升亦

劫劑也初起勿用

清燥湯東垣

二術與黃耆。參。苓。連。柏。草。陳。皮。

猪澤升柴五味麴麥冬歸地痿方推治肺

金受濕熱之邪。痿躄喘促。口渴。便赤。黃耆錢半。蒼朮炒一錢。白朮炒。陳皮澤瀉

各五分。人參茯苓升麻各三分。當歸酒洗生地麥冬甘草炙神麴炒。黃柏酒炒

猪苓各二分。柴胡黃連炒各一分。五味九粒煎。肺為辛金。主氣。大腸為庚金

主津。燥金受濕熱之邪。則寒水生化。之源。絕而痿躄喘渴諸症作矣。參耆苓朮

陳草補土以生金。麥味保金而生水。連栢歸地瀉火滋陰。猪澤升柴升清降濁

則燥金肅清。水出高原而諸症平矣。此方不盡潤藥。因有清燥二字。故附次于此。然東垣所云清燥者。蓋

指肺與大腸為燥金也。

桑螵蛸散冠氏

治小便數而欠。數便頻也。欠便短也。出於膀胱。然必別清小

也。小腸虛則便短。小腸熱則便短。

能安神魂補心氣。療健忘。

人參 茯苓 一用神

遠志

石菖蒲

桑螵蛸

煨龜板 炙龍甲 酥炙

煨龜板

炙龍甲

當歸

等分為末。臨臥服二錢。人

參湯下。

此足少陰手足太陽藥也。虛則便數。故以螵蛸龍骨固

之。螵蛸固腎熱則便欠。故以當歸龜板滋之。人參補心

氣。菖蒲開心竅。茯苓能通心氣于腎。遠志能通腎氣于

心。並能清心解熱。心者小腸之合也。心補則小腸不虛

心清則小腸不熱矣。



瀉火之劑 二十七首附方九

黃連解毒湯 毒即火 熱也 四味黃柏黃芩梔子

備等 躁狂大熱嘔不眠吐血 衄鼻血青 女六切

斑黃均可使若云三黃石膏湯再加麻

黃及淡鼓 見表裏門此為傷寒溫毒盛三焦

表裏相兼治梔子金花 九 加大黃 黃芩黃柏

黃連梔子 潤腸瀉熱真堪倚

附子瀉心 湯仲景 用三黃寒加熱藥以維陽

芩連各一兩 人黃二兩附子一枚 痞乃

熱邪寒藥治 傷寒痞滿在外之內滿在胸而不在胃多屬熱邪故

醫方集解

殺蟲之劑 問尹子曰人之一身內包蛇蝎

地也 蛇蝎為人所常有之蟲倘寒侵火迫則不其

位亦能為病若飲食不慎血氣虛衰又能變生諸蟲

不可名狀如髮癢龜瘻勞瘵傳尸之類至于殺身滅

烏梅 九 治傷寒厥陰症寒厥吐蛇 傷寒藏厥者死藏

七八日膚冷發躁無暫時安也蛇厥者脉微而厥至

須臾復止得食則嘔而又煩蛇聞食良復出也此為藏

寒當自吐蛇與烏 亦治胃府發咳咳而嘔嘔甚則長蟲

烏梅 三百 細辛 桂枝 人參 附子 炮 黃柏 六 黃連

