

丹溪心法

卷三上

丹溪心法

卷三上

赤白濁

四十五上

便不通

四十五上

傷食

四十五上

翻胃

七上

脫肛

二上

夢遺

四十五上

便不禁

四十五上

疝

四十五上

吞酸

九上

嘔吐

二上

消渴

四十五上

淋格

四十五上

水腫

四十五上

痞

四十五上

惡心

三下

淋

四十五上

鼓脹

四十五上

嘈雜

四十五上

欬逆

四下

重訂丹溪先生心法卷三

明 新安吳勉學 校

脫肛二十八

○脫肛屬氣熱。氣虛。血虛。血熱。氣虛者補

氣。參芪芎歸升麻。血虛四物湯。血熱者涼血四

物湯加炒栝。氣熱者條芩六兩升麻一兩麴糊丸

外用五倍子爲末托而上之。一次未收至五七次待
收乃止。又東北方壁土泡湯先熏後洗。

附錄肺與大腸爲表裏。故肺藏蘊熱則肛門閉結。
肺藏虛寒則肛門脫出。又有婦人產育用力小兒

久痢皆致此治之必須溫肺藏補腸胃久則自然收矣。

附方

香荆散 治肛門脫出大人小兒皆主之。

香附子 荆芥 等分 砂仁

右爲末每服三錢水一碗煎熟淋洗 每服三錢

煎服亦可。

又方

五倍子爲末每用三錢煎洗。

又方木賊不以多少燒灰爲末摻肛門上按入卽愈。

嘔吐二十九

○凡有聲有物謂之嘔吐。有聲無物謂之噦。胃中

有熱。膈上有痰者。一陳湯加炒山梔黃連生薑。有

久病嘔者。胃虛不納穀也。用人參生薑黃芪白朮香

附之類。嘔吐朱奉議以半夏橘皮生薑為主。劉

河間謂嘔者。火氣炎上。此特一端耳。有痰膈中焦

食不得下者。有氣逆者。有寒氣鬱於胃口者。

有食滯心肺之分。而新食不得下而反出者。有胃

中有火與痰而嘔者。嘔吐藥忌瓜蒌杏仁桃仁。藜

蘆子山梔皆要作吐。丸藥帶香藥行散不妨。注船

大吐渴飲水者。即外童便飲之最妙。

附方

理中加丁香湯

治中脘停寒喜辛物入口即吐。

人參

白朮

甘草炙

乾薑

炮各一錢

丁香十粒

右咬咀生薑十片。水煎服。或加枳實半錢亦可。不効或以二陳湯加丁香十粒。并須冷服。蓋冷遇冷則相入。庶不吐出。又或活人生薑橘皮湯。

活人生薑橘皮湯

橘皮

四兩

生薑

半斤

右咬咀水七盞煮至三盞去滓逐旋溫服

熱嘔 濟生竹茹湯 小柴胡加竹茹湯 見瘧類

右並用生薑多煎服

濟生竹茹湯

葛根 三兩

半夏 炮七次 二兩 甘草 炙一兩

右咬咀每四錢水一盞入竹茹一小塊薑五片

加味二陳湯 治停痰結氣而嘔

半夏

橘皮

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩

砂仁

一兩

丁香

五錢

生薑

二兩

右水煎服

吐虫而嘔方

黑鉛炒成灰。檀榔末。米飲調下。

惡心三十

○惡心有痰。

有熱。

有虛。

皆用生薑隨症佐藥。

戴云惡心者無聲無物。心中欲吐不吐。欲嘔不嘔。雖曰惡心實非心經之病。皆在胃口上。宜用生薑。蓋能開胃豁痰也。

附錄惡心欲吐不吐。心中兀兀如人畏舟船。宜大半夏湯。或小半夏茯苓湯。或理中湯。加半夏亦可。又胃中有熱惡心者。以二陳。加生薑汁炒黃連。黃芩。

芩各一錢最妙

附方

大半夏湯

半夏

陳皮

茯苓各二錢半

右咬咀水二盞薑二錢半煎八分食後服

小半夏茯苓湯

半夏五兩茯苓三兩

右咬咀每服八錢用水一盞半煎至一盞入生薑

自然汁投藥中更煎一兩沸熱服無時或月生

薑半斤同煎

理中湯

見中寒

欬逆三十一

○欬逆有痰。氣虛。陰火。視其有餘不足。治之。

其詳在格致餘論。不足者。人參白朮湯下。大補丸。

有餘并有痰者。吐之。人參蘆之類。痰礙氣而吃逆。

用密水吐。此乃燥痰不出。痰者。陳皮半夏。氣虛。

人參白朮。陰火黃連黃柏滑石。欬逆自刺者。滑

石甘草炒黃柏白芍人參白朮陳皮加竹刺瀝服。

戴云。吃逆者。因痰與熱。胃火者極多。

附錄。欬逆爲病。古謂之嘔。近謂之呃。乃胃寒所生。

寒氣自逆而呃。上此証最危。亦有熱呃。已見傷寒証。其有他病發呃者。宜用半夏一兩。生薑半兩。水煎。熱服。或理中湯加枳。茯苓。各半錢。半夏一錢。不效。更加丁香十粒。吐利後。胃虛寒。咳逆者。以羌活附子湯。或丁香十粒。柿蒂十箇。切碎。水煎服。吐利後。胃熱。咳逆者。以竹皮竹茹湯。亦無別病。偶然致呃。此緣氣逆而生。宜小半夏茯苓湯。加枳實。半夏。又或煎湯。泡蘿蔔子。研取汁。調木香。調氣散。熱服之。逆氣用之最佳。

附方

橘皮乾薑湯

治咳逆不止

橘皮

通草

乾薑

桂心

甘草

多各二兩

人參

一兩

右用五錢水煎服

生薑半夏湯

通治咳逆欲飲

半夏

一兩

生薑

二兩

右以水煎溫作三服

陰証咳逆

川烏

乾薑

炮

附子

炮

肉桂

芍藥

甘草

炙

半夏

吳茱萸

陳皮

大黃等分

右為末每服一錢生薑五片煎服

人參白朮湯

人參

黃芩

柴胡

乾葛

梔子仁

甘草

白朮

防風

半夏

泡七次

五味

右咬咀每服四錢薑三片煎

羌活附子湯

治吃逆

木香

附子炮

羌活

茴香

炒各半兩

乾薑

一兩

右為末每服二錢水一盞半鹽一捻煎二十沸和

粗熟服一服止

三因加丁香

橘皮竹茹湯

橘皮

一升

竹茹

一升

甘草

炙二兩

人參

半兩

棗子

三十箇

生薑

半兩

右咬咀水十盞煎至三盞作三服

小半夏茯苓湯

一陳湯加黃芩煎

木香調氣丸

白蔻仁

丁香

檀香

木香

各二兩

藿香

甘草

炙各八兩砂仁四兩

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

六神丸

見補損

理中湯

見中寒

翻胃三十二

○翻胃大約有四

血虛

氣虛

有熱

有痰兼

病

必用童便韭汁竹瀝牛羊乳生薑汁

氣虛入

四君子湯右手脉無力

血虛入四物湯加童便左

手脉無力

切不可用香燥之藥若服之必死宜薄

滋味

治反胃用黃連三錢生薑汁浸炒山查肉二

錢保和丸二錢同為末糊丸如麻子大曠指為衣人

參湯入竹瀝再煎一沸下六十丸。有痰二陳湯爲主。寸關脉沉或伏而大。有氣結宜開滯導氣之藥。寸關脉沉而濇。有內虛陰火上炎而反胃者作陰火治之。年少者四物湯清胃脘血燥不潤便故濇。格致餘論甚詳。年老雖不治亦用參朮。關防氣虛胃虛。氣虛者四君子湯加蘆根童便或參苓白朮散。或韭汁牛羊乳或入駁駟尿。又有積血停於內而致當消息逐之。大便濇者難治。常令食兔肉則便利。翻胃卽膈噎。膈噎乃翻胃之漸。發揮備言。年高者不治。糞如羊屎者斷不可治。大腸無血故

也。

戴云。翻胃血虛者。脉必數而無力。氣虛者。脉必緩而無力。氣血俱虛者。則口中多出沫。但見沫大出者。必死。有熱者。脉數而有力。有痰者。脉滑數。二者可治。血虛者。四物為主。氣虛者。四君子為主。熱以解毒為主。痰以二陳為主。

又方

用馬剝兒燒灰存性一錢。好棗肉。平胃散二錢。右和勻。溫酒調服。食即可下。然後隨病源調理。

又方