

精審
實驗

起死回生第一奇書

上海
林書局
發行



精審
實驗

起死回生第一奇書

醫學士博仁撰

◎

男女欲保身體
者不可不看

上海五林書局發行



中華民國十一年夏月出版

版權
所有
不許
翻印

●精審實驗起死回生第一奇書

●全書一冊定價大洋二角

醫學士 宣化博仁撰

印刷者 上海五林書局

總發行 上海五林書局

分售處 各省各大書局



精審實驗起死回生第一奇書緒言

天地有好生之德人亦莫不好生而惡死乃竟有死
於非命者語云救人一命勝造七級浮屠人之好善
誰不如我見死不救斷無此情但恐有救人之心而
無救人之法且有命在俄頃延醫亦不及待者言念
及此惻然憫之爰撰是書以備急救救治得法必有
奇效依法而行人人可操救人之術庶可躋斯世於
仁壽也夫

民國十一年歲在壬戌季夏月上澣

宣化醫學士博仁自叙於滬海寄廬

精審實驗起死回生第一奇總目

跌傷垂死

自縊垂死

夜卧魘死

痰厥卒死

中暑毒死

水溺卒死

鬼擊卒死

脫陽欲死

驚怖卒死

解救砒毒垂死

毒疔垂死

無故卒死

中惡卒死

刀傷流血垂死

外科刀傷

金瘡流血垂死

跌打損傷垂死

打傷垂死



精審起死回生第一奇書

跌傷垂死

凡跌撲死者未絕氣用山羊血一分調酒飲之遂甦神效立見
平樂山崖間躑躅若飛生得最難惟布網草間能生得之刺其心血待
乾結成塊可以携遠凡血皆患凝滯山羊踰高陟險旦夕不休則其血
活 苗人取血法以麋竹通節削鋒利活刺心血收乾者良宰取者不
堪用 山羊喜食三七苗其血主治損傷極妙輕者服數釐重者服二
三分以心血為上身血次之色黑有光而質輕者為真又以久凝臭雞
血一塊投入山羊血過宿反變成鮮血者真又收得乾血成塊者必用
糯米養之云可久留不枯為和傷散血之神藥酒服又能續骨每用不
過分許雖不耗傷元氣但力能走散陰血

凡顛撲欲死及一切傷損從高墜下及木石所正落馬撲車氣絕欲死者
此皆瘀血凝滯也 用淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互慰之
勿大熱恐破肉取痛止則已神效并金

折傷筋骨者 烏古瓦治之 秘傳神效散治跌撲傷損骨折骨碎筋斷

痛不可忍者此物極能理傷續斷屢用屢效法用路上牆脚下往來

便溺處久碎瓦片一塊洗淨火煨醋淬五次黃色為度刀刮細末每服

三錢好酒調下在上食前在下食後不可以輕易而賤之真神方也

經方

從高墜下有瘀血在內者 琥珀治之刮琥珀末酒服或入蒲黃日服

五次外臺秘要

打跌骨折 酒調白芨末二錢服 其功不減自然銅古銖錢也 永類

折傷筋骨 急取雄雞一隻刺血量患人酒量或一碗或半碗和飲痛立

止神效 清囊方

打撲傷損 龜血和酒飲之仍搗生龜肉塗之 時珍

跌壓傷死 凡跌壓傷重之人口耳出血昏暈不醒只要身體尚軟皆可

救治切忌人多嘈雜只令親人呼而扶之且就坐於地緊為抱住曲

手足如和尚打坐樣隨以熱童便灌之馬尿更妙或用白糖沖熱酒灌



之灌水調亦可尤為神妙但當強灌一二杯下喉便好然後輕移於懷中抱入室內如前坐法更以足緊抵糞門若係婦人連陰戶一并抵住恐其氣下洩以致不救并將窗櫺遮住令房中黑暗為佳傷重者瘀血必多用前當歸湯白糖飲最好其餘簡便之方不妨兼用切記不可令出大便恐其氣脫而死必俟其腹中動而有聲上下往來數遍急不能待方可使解所下盡是紫血毒已解下方可令睡倘瘀血未盡當歸白糖飲尤宜多服

自縊垂死

卒縊垂死心口猶溫者 勿斷繩刺雞冠血滴口中安心神

縊死未絕者 用雞血塗喉下 一方用葱心刺耳鼻中有血出即甦

卒自縊死者 勿斷繩急取梁上塵如豆大各納一筒中四人同時極力

吹兩耳及兩鼻中即活

外臺秘要

自縊將死者 皂莢末吹鼻中即活

外臺

卒自縊死者 用藍汁灌之

千金方

自縊垂死

縊死未絕氣者 用雞屎白如棗大酒半盞和灌口鼻中拊後

自縊垂死 用葱心刺耳鼻中有血出即甦

縊死 用回生丹灌之立活 回生第一仙丹

活土蠶蟲又名地蠶

扁不能飛大小不等色黑而亮背有橫楞輪前窄後寬以枕蓋住過夜其虫

自發而活方是雄的隨處皆有或榨油房并空屋乾燥之處總在下倉底

尋覓取活的去足或瓦上小大焙黃研細用淨末五錢自然銅炭火內燒

紅入好醋內淬半刻取出再燒再淬連煉九次所末 真陳血竭飛二錢

巴豆去殼研用細包壓數次 真珠砂飛二錢 真麝香當門子要 以上各藥揀

選明淨研極細末收入小口磁瓶用蠟封口不可洩氣大人每用七分

五釐小兒用七釐酒冲服牙關不開打開一齒灌之必活活後宜避風調養

夜卧魔死

夜卧魔死 勿用火照急取梁上塵納鼻中即活瑣碎錄

尸厥魔死 尸厥之病卒死脈猶動聽其目目中如微語聲股間暖者是

也魔死之病卧忽不寤勿以火照但痛齧其踵及足拇指甲際唾其面

即甦仍以菖蒲末吹鼻中桂末納舌下并以菖蒲根汁灌之肘後

魔寐猝死 鍋底墨水灌二錢并吹鼻醫說

尸厥不醒脈動如故 竈突墨彈丸漿水和飲仍針百會足大指中指

側并金

夢魔猝死 大塊明雄珠砂戴頭上并繫左腋下自能免鬼魅并解惡夢

自無魔死之患

發花風死 此症多死於床上見腎俞穴睛睛處有一紅扁者可治若黑

者不治急用麝香填於臍眼加薑一片蓋麝上艾火灸之可生

痰厥卒死

痰厥氣絕心頭尚溫者 用千年石灰一合水一盞煎滾去清水再用一

盞煎極滾澄清灌之少頃痰下自甦旗玄

痰厥死 用巴豆搗爛綿紙包裹取板油作燃燒烟薰鼻中片刻吐出痰

血即愈或用生半夏末如豆大吹兩鼻中即醒

中暑猝死



中暑毒死 救生散用新胡麻一升炒令黑攤冷為末或丸服後驗

夏月喝死 用道中熱土圍臍旁令人尿淋臍仍用熱土大蒜等分楊

去滓灌之即活

又方 用屋上兩畔古瓦熱慰心頭冷即易之千金

夏月渴死 濃煎蓼汁一杯服外臺

夏天道路中暑忽然昏死 切不可誤用冷水噴灌一受寒冷則不可救

急用稻草節結為長帶曲盤肚臍外用熱土搓卒圍之使人撒尿其中

令溫氣入腹久之自愈

又方 草紙捲成筒點火向口鼻間熏之即活神效

水溺卒死

水溺卒死 一宿者尚可活用紙裹皂莢末納下部須臾出水即活秘要

人落水死 裹石灰納下部中水出盡即活千金

凡溺水死者 用鴨血灌之即活

人溺水死 白沙河炒覆死人面上下惟露七孔冷溼即易千金

墮水凍死只有微氣者。勿以火炙。用布袋盛熱灰。放在心頭。冷即換。待眼開。以溫酒與之。普濟

人溺水死

用竈中灰一石埋之。從頭至足。惟露七孔。良久即甦。凡

溺水死。試以灰埋之。少頃即活。甚驗。蓋灰性暖而能拔水也。

法方書中

灰宜用冬灰。乃冬月所燒柴薪之灰也。

冬灰祥綱目卷七土部

溺水猝死

撈起時急將口撬開。橫啣篋子一根。使可出水。以竹管吹其

兩耳。碾生半夏末如豆大。吹其鼻孔。又用皂角末置管中。吹其穀道。如

條夏月。將溺人肚腹橫覆牛背之上。兩邊使人扶之。牽牛緩緩而行。腹

中之水自然從口中並大小便流出。再用生薑湯調蘇合。凡灌之。或生

薑汁灌之。並用生薑擦牙。若無牛。用一人覆卧躬腰。令溺人如前。將肚

腹橫覆於活人身上。令活人微微搖動。水亦可出。或用大鍋一口。覆寬

橈上。將溺人覆於鍋上。亦可。要將溺人臍對鍋臍俯卧。手托其頭。如條

冬月。即將溼衣更換。一面炒鹽。用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內草

灰多多鋪於被褥之上。臍下墊以棉枕一個。乃以草灰將渾身厚蓋之。

灰上再加被褥不可使灰迷於眼內其撬口啣筷灌蘇合凡生薑湯吹
目鼻穀道等事俱照夏天法冬天甦醒後宜少飲湯夏天宜少飲粥湯
按灰性煖而能拔水凡蒼蠅溺水死者以灰埋之少頃即活此明驗也
溺人倘或微笑急掩其口鼻如不掩住則笑不可止不能救矣
溺人不可急於見火一見必大笑而死

初救起時尚有微氣或胸前尚緩速令生人脫貼身熱衣為之更換初
擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流出若水往外流即有生機一
面用粗紙燒燃取烟薰其鼻竅稍薰片時即用皂角研細末吹入鼻孔
但得微有噴嚏即可得生又灌酒湯不可太熱恐傷齒盡落

鬼擊卒死

鬼擊卒死者 用烏雞冠血灌口中令嚥仍破雞撮心下冷乃棄之道邊

妙術後

鬼排卒死者 用烏雞雞血塗心下更甦此白毛烏骨雞雞也

鬼擊者 卒然着人如刀刺狀胸脇腹內切痛不可扣按或吐血鼻血下



血一名鬼排以醇酒吹兩鼻內後

鬼擊卒死者 吹米醋少許入鼻中并金

鬼魔不寤者 皂莢末刀圭吹之能起死人并金

鬼擊中惡 用鹽一盞水二盞和服以冷水嚥之即甦救急

鬼打死 凡睡魔死中邪死俱可用此方 用白毛烏骨雞血搽心前并

將雞煮湯灌之極效 或用雞冠血滴口中仍破此雞搗心下冷即甦

雞埋之甚效

中邪死 用韭菜心於男左女右鼻內刺入六寸許令目開血出即活或

搗韭汁灌鼻更視上唇內有粟米粒者以針挑破取出 又方用皂角

末或生半夏末如豆大各吹兩鼻中燒炭一爐以陳醋潑炭上使患者

間得醋氣即活須捉其兩手勿令驚或灌醋於鼻內或用樟水燒烟薰

之亦可

鬼打及絕鬼排突人中惡猝死者 用鐵椎柄和桃奴鬼箭等作丸服之

自活藏器方

脫陽欲死

脫陽危症 凡人大吐大瀉之後四肢厥冷不省人事或與女子交後

腹腎痛外腎搐縮冷汗出厥逆須臾不救 先以葱白炒熟臍腹後

葱白三七莖搗爛用酒煮灌之陽氣即回

此華佗救卒病方也

驚怖卒死

驚怖卒死者 溫酒灌之即醒

解救砒毒垂死

解砒石毒 用糯稻草燒灰淋汁調青黛三錢服之

嚙方

解砒石毒 用麻油一碗灌之

備生方

中砒霜毒者 用白扁豆主研以水絞汁飲之

解砒毒 用綠豆粉寒小石等分以鹽根汁調服三五錢

中砒石毒 用才醋最釀者飲之得吐即愈不可飲水

廣記

解礬砒毒 大豆煮汁飲之

後

解砒霜毒 用防風一兩研末冷水調服或用四兩冷水搗汁灌服亦可



屢試神驗萬無一失

解砒霜毒 殺白鴨取血對口急速灌下即活遲則血冷如已服防風之能回生可以不必服此以免雜亂反致不救

毒疔垂死

疔瘡初起即腫者 用麪圍住以針亂刺瘡上銅器煎醋沸傾入圈中令容一盞冷即易三度根即出

疔腫惡瘡 用胡麻燒灰針砂等分為末醋和傅之曰三釐濟

赤根疔腫 用白米粉和蜜傅之金

數種疔瘡 用馬蹄草一名薄菜一名水葵一名露葵大青草臭紫草各

等分搗爛以酒一碗浸之去滓溫服三服立愈良驗

拔疔根方 用臭蟲同米飯搗勻搽疔上能拔疔根外出楊氏經

疔腫傷風立腫 以馬屎炒熨瘡上五十遍極效聖惠又普濟方用驢屎

拔諸疔之根 用荔枝肉白梅肉各三個搗餅貼之其根自出

又方 用鬼螺螄一個荔枝核三個煨存性白梅肉六個共搗爛成膏



貼之取出疔根後用八寶丹收功 鬼螺螄即石上螺師而小秋冬在
牆脚石隙中夏月在溼地青苔上取用洗去土

疔毒腫痛 用馬齒莧二分石灰三分為末雞子白和塗之

疔腫惡毒 用門舊灰一撮羅細以獨頭蒜或新蒜臺染灰擦瘡口候瘡
自然出微汗再搗少頃即消散也 發背瘡毒亦可擦之

紅絲疔 治法以白菊花葉加雄黃錢許蜈蚣二條共搗極爛從頭敷至
絲盡處為止用絹裹緊隔夜即消真神方也

凡疔腫毒瘡 取細長小鬼螺螄連殼敷患處露頂出膿次日即可消

疔腫諸毒 用荊芥一握切以水五升煮取一升分二服冷飲

疔腫垂死 用菊花一握搗汁一升入口即活此神驗方也冬月採根後

疔瘡惡腫 用臘月豬膽風乾和生葱搗敷

疔瘡腫毒 用白芨末半錢以水澄清去水攤於厚紙上貼之

馬疔腫毒 用穿山甲燒存性貝母等分為末酒調服三四次乃用下藥

利去惡物即愈