



全書

四庫



第七七八册

四庫全書

●上海古籍出版社

● 土 藏 古 籍 出 版 社

本册目次

四 載 全 書

景 岳 全 書 (二)

明 張 介 賓 撰 …………… 一

卷 之 十 六

欽定四庫全書

子部
景岳全書卷三十八

詳按管文醫院恩種臣孔毓秀
編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕綸

校對官原任編修臣勵守謙

騰錄監生臣蔣繼勳

欽定四庫全書

景岳全書卷三十八

明 張介賓 撰

總論

婦人九證

婦人諸病本與男子無異而具有異者則惟經水胎產之屬故本門亦止列此九證曰○經脈類○胎孕類○產育類○產後類○帶濁類○乳病類○子嗣類○癥瘕類○前陰類○凡此九者乃其最切之病不得不另詳方論此外雜證但與男子相同者自有各門論治之法故不以男女分而資嗜於此

論難易

誘云寧治十男子莫治一婦人此謂婦人之病不易治也何也不知婦人之病本與男子同而婦人之情則與男子異蓋以婦人幽居多鬱常無所伸陰性偏拗每不可解加之慈惡愛憎嫉妬憂恚罔知義命每多

欽定四庫全書

景岳全書
卷三十八

怨尤或有懷不能暢遂或有病不可告人或信師巫
或畏藥餌故染著堅牢根深蒂固而治之有不易耳
此其情之使然也然尚有人事之難如寇宗奭引黃
帝之論曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可
治色澤以浮謂之易已形氣相失色夫不澤謂之難
治又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其虛實
以為診法故曰治之要極無失色脈此治之大則也
今富貴之家居奧室之中處帷幔之內復有以綿帕

欽定四庫全書

景岳全書
卷三十八

三

經脈類

經脈之本

三

上古天真論曰女子二七天癸至任脈通太衝脈盛月
事以時下故有子蓋天癸者言後天之陰氣陰氣足
而月事通是即所為月經也正以女體屬陰其氣應
月月以三旬而一盈經以三旬而一至月月如期經
常不癸故謂之月經又謂之月信夫經者常也一有
不調則失其常度而諸病見矣然經本陰血何臟無
之惟臟腑之血皆歸衝脈而衝為五臟六腑之血海
故經言太衝脈盛則月事以時下此可見衝脈為月
經之本也然血氣之化由於水穀水穀盛則血氣亦
盛水穀衰則血氣亦衰而水穀之海又在陽明考之
痿論曰陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束
骨而利機關也衝脈者經脈之海也主滲灌谿谷與
陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明
為之長是以男精女血皆由前陰而降此可見衝脈
之血又總由陽明水穀之所化而陽明胃氣又為衝
脈之本也故月經之本所重在衝脈所重在胃氣所

欽定四庫全書

景岳全書
卷三十八

三

重在心脾生化之源耳其他如七情六淫飲食起居之失宜者無非皆心脾胃氣之賊何者當顧何者當去學者於此當知所從矣

經脈諸臟病因四

女人以血為主血旺則經調而子嗣身體之盛衰無不肇端於此故治婦人之病當以經血為先而血之所主在古方書皆言心主血肝藏血脾統血故凡傷心傷脾傷肝者均能為經脈之病又曰腎為陰中之陰

欽定四庫全書

醫部全錄卷三十八

四

腎主閉藏肝為陰中之陽肝主疎泄二藏俱有相火其系上屬於心故心火一動則相火翕然從之多致血不靜而妄行此固一說然相火動而妄行者有之由火之盛也若中氣脫陷及門戶不固而妄行者亦有之此由脾腎之虛不得盡言為火也再如氣道逆而不行者有之由肝之滯也若精血敗而不行者亦有之此由真陰之枯竭其證極多不得誤以為滯也是固心脾肝腎四臟之病而獨於肺臟多不言及不

知血之行與不行無不由氣如經脈別論曰飲入於

胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水

道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五行陰

陽揆度以為常也此言由胃達脾由脾達肺而後傳

布諸經故血脫者當益氣血滯者當調氣氣主於肺

其義可知是皆諸經之當辨者如此然其微甚本末

則猶有當辨者蓋其病之肇端則或由思慮或由鬱

怒或以積勞或以六淫飲食多起於心肺肝脾四臟

欽定四庫全書

醫部全錄卷三十八

五

及其甚也則四臟相移必歸脾腎蓋陽分日虧則飲

食日減而脾氣胃氣竭矣陰分日虧則精血日涸而

衝任腎氣竭矣故予曰陽邪之至害必歸陰五臟之

傷窮必及腎此源流之必然即治療之要著故凡治

經脈之病或其未甚則宜解初病而先其所因若其

已劇則必計所歸而專當顧本甚至脾腎大傷泉源

日涸由色淡而短少由短少而斷絕此其枯竭已甚

也昧者無知田云積血而通之破之禍不旋踵矣

經不調 五條

經血為水穀之精氣和調於五臟灑陳於六腑乃能入於脈也凡其源源而來生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎以灌溉一身在男子則化而為精婦人則上為乳汁下歸血海而為經脈但使精氣無損情志調和飲食得宜則陽生陰長而百脈克實又何不調之有苟不知慎則七情之傷為甚而勞倦次之又或為慾不謹強弱相陵以致衝任不守者

欽定四庫全書

卷三十八

六

亦復不少此外則外感內傷或醫藥誤謬但傷營氣無不有以致之凡人有衰弱多病不耐寒暑不勝勞役雖先天稟弱者常有之然有以氣血方長而縱情虧損或精血未滿而早為斷喪致傷生化之源則終身受害此未病之先所當深察而調之者也○若欲調其既病則惟虛實陰陽四者為要丹溪曰先期而至者血熱也後期而至者血虛也王子亨曰陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷

絕不行崩漏不止皆由陰陽盛衰所致是固不調之大略也然先期而至雖曰有火若虛而挾火則所重在虛當以養營安血為主矧亦有無火而先期者則或補中氣或固命門皆不宜過用寒涼也後期而至者本屬血虛然亦有血熱而燥瘀者不得不為清補有血逆而留滯者不得不為疎利總之調經之法但欲得具和平在詳察其脈證耳若形氣脈氣俱有餘方可用清用利然虛者極多實者極少故調經之要

欽定四庫全書

卷三十八

七

貴在補脾胃以資血之源養腎氣以安血之室知斯二者則盡善矣若營氣本虛而不知培養則未有不日枯而竭者不可不察也○凡經行之際大忌寒涼等藥飲食亦然

初虞世曰經以月至有常也其來過與不及皆謂之病若榮血虧損不能滋養百骸則髮落面黃羸瘦燥熱燥氣盛則金受邪金受邪則為嗽為肺癰為肺痿必矣但助胃壯氣則榮血生而經自行若果怒氣

逆經閉不行當用行氣破血之劑

褚氏遺書精血篇曰男子精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便澀而為淋精已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而為腫後雖合而難子合多則瀝枯虛人產衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

欽定四庫全書

景岳全書

九

產寶方序論曰婦人以血為基本苟能謹於調護則血氣宣行其神自清月水如期血凝成孕若脾胃虛弱不能飲食營衛不足月經不行肌膚黃燥面無光澤寒熱腹痛難於子息或帶下崩漏血不流行則成癥

證

薛立齋曰經云二陽之病發心脾有不得隱曲為女子不月故心脾平和則百骸五臟皆潤澤而經候如常

苟或心脾受傷則血無所養亦無所統而月經不調

矣是故調經者當理心脾為主丹溪先生亦曰先期而至者血熱也後期而至者血虛也竊謂先期而至者有因脾經血燥有因脾經鬱火有因肝經怒火有因血分有熱有因勞役動火過期而至者有因脾經血虛有因肝經血虛有因氣虛血弱主治之法脾經血燥者加味逍遙散脾經鬱滯者歸脾湯肝經怒火者加味小柴胡湯血分有熱者加味四物湯勞役動

欽定四庫全書

景岳全書

九

火者補中益氣湯○其過期而至者若脾經血虛宜人參養營湯肝經血少宜六味地黃丸氣虛血弱宜八珍湯蓋血生於脾故云脾統血凡血病當用苦甘之劑以助其陽氣而生陰血俱屬不足也大凡肝脾血燥四物湯為主肝脾血弱補中益氣湯為主肝脾鬱結歸脾湯為主肝經怒火加味逍遙散為主

又曰胃者衛之源脾者榮之本榮出中焦衛出上焦衛不足益之必以辛榮不足補之必以甘甘辛相合

脾胃健而榮衛生是以氣血俱旺也或因勞心虛火妄動月經錯行宜安心補血瀉火此東垣先生治法也

又曰人之少有老態不耐寒暑不勝勞役四時迭病皆因氣血方長而勞心虧損或精血未滿而早年虧喪故其見證難以名狀若左尺脈虛弱或細數是左腎之真陰不足也用六味丸右尺脈遲軟或沉細而數欲絕是命門之相火不足也用八味丸至於兩尺

欽定四庫全書

醫全書卷三十八

十一

微弱是陰陽俱虛用十補丸此皆滋其化源也不可輕用黃柏知母之類設或六淫外侵而見證亦因其氣內虛而外邪湊集耳尤宜用前藥

調經論外備用方

加味八珍湯

婦九四
補虛調經

調胃養營湯

婦九五
退熱調經

金匱膠艾湯

婦九三
勞傷經血不止

良方當歸散

婦九六
妄行不止

四物二連湯

婦百十三
血虛內熱

補肝散

婦九二
虛弱不調

益陰腎氣丸

補一二五
血虛不調

丹參散

婦九七
調經止血

琥珀散

婦百二
逐瘀通經

白芷散

婦一二六
固經

良方黃龍湯

婦八五
經後外感

良方人參湯

婦七七
補虛調經

十全大補湯

補二十
溫補氣血

六物煎

新因二十
虛補最妙

血熱經早

凡血熱者多有先期而至然必察其陰氣之虛實若形色多赤或紫而濃或去多其脈洪滑其藏氣飲食喜冷畏熱皆火之類也

欽定四庫全書

醫全書卷三十八

十一

治血熱有火者宜清化飲主之若火之甚者如抽薪飲之類亦可暫用但不可以假火作真火以虛火作實火也○大都熱則善流而愆期不至者如續斷地榆丹參茜根梔子之屬皆可用○若微火陰虛而經多早者治宜滋陰清火用保陰煎之類主之○所謂經早者當以每月大概論所謂血熱者當以通身藏象論勿以素多不調而偶見先期者為早勿以脈證無火而單以經早者為熱○若脈證無火而經早不及期者乃其心脾氣虛不能固攝而然宜大營煎大

補元煎或五福飲加杜仲五味子之類主之此輩極多若作火治必誤之矣○若一月二三至或半月或旬日而至此血氣敗亂之證當因其寒熱而調治之不得以經早者並論

血熱論外方

良方續斷湯 婦二二

四物二連湯 婦百十三

二黃散 婦二十

一母丸 婦三七

良方當歸散 婦九六

延年益嗣丹 婦一三五

欽定四庫全書

醫部全錄 卷三十八

奇效四物湯 婦百十一

子苓散 婦一二二

血熱經遲 七

血熱者經期常早此營血流利及未甚虧者多有之其

有陰火內燦血本熱而亦每過期者此水虧血少燥

澁而然治宜清火滋陰以加味四物湯加減一陰煎

滋陰八味丸之類主之

血寒經遲 八

凡血寒者經必後期而至然血何以寒亦惟陽氣不足

則寒從中生而生化失期是即所謂寒也至若陰寒由外而入生冷由內而傷或至血逆或為疼痛是又寒滯之證非血寒經遲之謂也當詳辨之

凡陽氣不足血寒經遲者色多不鮮或色見沉黑或

澁滯而少其脈或微或細或沉遲弦澁其藏氣形氣

必惡寒喜煖凡此者皆無火之證治宜溫養血氣以

大營煎理陰煎之類加減主之○大約寒則多滯宜

加薑桂吳茱萸蕪撥之類甚者須加附子

欽定四庫全書

醫部全錄 卷三十八

血寒論外方

五物煎 新因三

烏雞煎丸 婦一四二

增損四物湯 婦百十

四神散 婦七五

血虛經亂 九

凡女人血虛者或遲或早經多不調此當察藏氣審陰

陽詳參形證脈色辨而治之庶無誤也蓋血虛之候

或色淡或澁少或過期不至或行後反痛痛則喜煖

喜按或經後則困憊難支腰膝如折或脈息則微弱

弦澁或飲食素少或形色薄弱凡經有不調而值此

不足之證皆不可妄行剋削及寒涼等劑再傷脾腎

以伐生氣則惟有日甚矣○凡肝脾血虛微滯微痛

者宜四物湯主之或加桂肉或加黃芩隨寒熱而用

之自無不可○三陰虧弱無熱無寒平藏者宜小營

煎五福飲六物煎之類主之此常人最宜之劑或八

珍湯十全大補湯之類皆宜擇用○三陰虧弱兼陽

虛者宜大營煎理陰煎之類主之○憂思過度心脾

受傷者七福飲歸脾湯之類主之○脾土不健飲食

減少宜燥宜溫者溫胃飲理中湯之類主之○脾土

虛陷不能統攝營氣而為漏為頻者宜五福飲歸脾

湯壽脾煎秘元煎或四君子加芎歸主之○肝虛不

能藏血或多驚惕或多小腹急痛宜三陰煎補肝散

之類主之○若陰血虛水不制火而邪火盛者或為

夜熱盜汗或為煩渴生瘦是即勞損之漸速宜調治

用一二三四五陰等煎擇宜治之否則恐成血枯也

欽定四庫全書

卷三十八

十四

腎虛經亂 十

婦人因情慾房室以致經脈不調者其病皆在腎經此

證最多所當辨而治之

凡慾念不遂沉思積鬱心脾氣結致傷衝任之源而

腎氣日消輕則或早或遲重則漸成枯閉此宜兼治

心脾腎以逍遙飲秘元煎之類主之○若或慾火熾

盛以致真陰日瀆者宜保陰煎滋陰八味丸之類主

之○若房室縱肆不慎者必傷衝任之流而腎氣不

欽定四庫全書

卷三十八

十五

守治須固命門宜固陰煎秘元煎之類主之○若

左腎真陰不足而經脈不調者宜左歸飲左歸丸六

味地黃丸之類主之○若右腎真陰不足而經有不

調者宜右歸飲右歸丸八味地黃丸之類主之○若

思鬱不解致病者非得情舒願遂多難取效房室不

慎致病者使非勇於節慾亦難全恃藥餌也

經期腹痛 十一

經行腹痛證有虛實實者或因寒滯或因血滯或因氣

滯或因熱滯虛者有因血虛有因氣虛然實痛者多痛於未行之前經通而痛自減虛痛者於既行之後血去而痛未止或血去而痛益甚大都可按可揉者為虛拒按拒揉者為實有滯無滯於此可察但實中亦有虛虛中亦有實此當於形氣稟質兼而辨之當以察意言不能悉也

凡婦人經期有氣逆作痛全滯而不虛者須順其氣宜調經飲主之甚者如排氣飲之類亦可用○若血

欽定四庫全書

醫部全錄
卷三十八

六

淤不行全滯無虛者但破其血宜通瘀煎主之○若氣血俱滯者宜失笑散主之○若寒滯於經或因外寒所逆或素日不慎寒涼以致凝結不行則留聚為痛而無虛者須去其寒宜調經飲加薑桂吳茱萸之類主之或和胃飲亦可酌用○若血熱血燥以致滯澁不行而作痛者宜加味四物湯或用保陰煎去續斷加減主之○以上五證但察其有滯無虛方是真實若或兼虛弗得任行尅伐

欽定四庫全書

醫部全錄
卷三十八

七

凡婦人經行作痛挾虛者多全實者少即如以可按拒按及經前經後辨虛實固其大法也然有氣血本虛而血未得行者亦每拒按故於經前亦常有此證此以氣虛血滯無力流通而然但察其形證脈息凡涉虛弱不足而經滯作痛者惟用決津煎五物煎加減主之其效如神或用四神散之類亦可○若痛在經後者多由血虛當用大小營煎隨宜加減治之或四物八珍俱可用然必察其寒熱虛實以為佐使自無不效其有餘滯未行者惟決津煎為妙○凡婦人但遇經期則必作痛或食則嘔吐肢體困倦或兼寒熱者是必素稟氣血不足止宜八珍湯大營煎之類若虛而寒甚者宜理陰煎漸加培補久必自愈有因帶濁多而虛痛者亦宜大小營煎隨其寒熱加佐使主之

立齋曰前證若風寒傷脾者六君加炮薑思慮傷血者四物加參朮思慮傷氣者歸脾加柴梔鬱怒傷血者

歸脾道遠兼服

經痛論外方

溫經湯 婦百三
寒痛

交加散 婦百
結聚作痛

醋附丸 婦百七
行滯止痛

牛膝散 婦九
通經止痛

薑黃散 婦百一
逐瘀止痛

當歸沒藥丸 婦百六
血瘀作痛

玄胡當歸散 婦九八
血逆作痛

琥珀丸 婦一三四

崩淋經漏不止 十二

崩漏不止經亂之甚者也蓋亂則或前或後漏則不時

欽定四庫全書

景岳全書
卷三十八

六

妄行由漏而淋由淋而崩總因血病而但以其微甚

耳陰陽別論曰陰虛陽搏謂之崩百病始生篇曰陽

絡傷則血外溢陰絡傷則血內溢故凡陽搏必屬陰

虛絡傷必致血溢知斯二者而崩淋之義及治療之

法思過半矣惟是陰虛之說則但傷營氣無匪陰虛

而五臟之陰皆能受病故神傷則血無所主病在心

也氣傷則血無所從病在肺也意傷則不能統攝

血病在脾也魂傷則不能畜血藏血病在肝也志傷

則不能固閉真陰病在腎也所以五臟皆有陰虛五

臟皆有陽搏故病陰虛者單以臟氣受傷血因之而

失守也病陽搏者兼以火居陰分血得熱而妄行也

凡治此之法宜審臟氣宜察陰陽無火者求其臟而

培之補之有火者察其經而清之養之此不易之良

法也然有火者不得不清但元氣既虛極多假熱設

或不明真假而誤用寒涼必復傷脾胃生氣日見殆

矣先賢有云凡下血證須用四君子輩以收功又云

若大吐血後母以脈診當急用獨參湯救之厥旨深

矣故凡見血脫等證必當用甘藥先補脾胃以益發

生之氣蓋甘能生血甘能養營但使脾胃氣強則陽

生陰長而血自歸經矣故曰脾統血

一治崩淋經漏之法○若陰虛血熱妄行者宜保陰煎

加減一陰煎○若火盛迫血妄行而無虛證者宜徒

薪飲黃芩散加續斷丹參○若血熱兼滑者宜保陰

煎槐榆散生地黃湯○若肝經怒火動血者加味四

煎槐榆散生地黃湯○若肝經怒火動血者加味四

欽定四庫全書

景岳全書
卷三十八

五

物湯○若肝經怒火動血逆氣未散者化肝煎或保
陰煎加減主之○若血有滯逆而妄行者四物湯丹
參散○若營氣不足血不能調而妄行者五福飲四
物湯四君子湯八珍湯擇宜用之○若脾氣虛陷不
能收攝而脫血者壽脾煎歸脾湯四君子加芎歸再
甚者舉元煎○若脾腎虛寒兼嘔兼泄而畏寒者
理陰煎五君子煎理中湯○若陽氣大虛脫陷者四
維散○若脾腎陰氣不固者固陰煎五陰煎秘元煎

欽定四庫全書

醫金全書

五

醫金全書

五

○若肝膽氣虛不能藏血者必多驚恐畏怯宜五福
飲七福飲八珍湯兼陽虛者仍加薑桂○若去血過
多血脫氣竭者當速用獨參湯提握其氣以防脫絕
或用當歸補血湯○若崩淋既久血滑不禁宜滋宜
固者龍骨散如聖散七灰散之類同人參兼用之○
凡血淋治法大約如前但其穢臭脈滑者多火宜從
清涼若腥臭清寒脈細者多寒必須溫補其或久病
則精去無窮尾間易竭非大加培補不可惟固陰煎

及十全大補湯之類為宜

一崩淋之病有暴崩者有久崩者暴崩者其來驟其治
亦易久崩者其患深其治亦難且凡血因崩去勢必
漸少少而不止病則為淋此等證候未有不由憂思
鬱怒先損脾胃次及衝任而然者崩淋既久真陰日
虧多致寒熱欬嗽脈見弦數或豁大等證此乃元氣
虧損陰虛假熱之脈尤當用參地歸木甘溫之屬以
峻培本源庶可望生但得胃氣未敗受補可救若不

欽定四庫全書

醫金全書

五

能受補而日事清涼以苟延目前則終非吉兆也
一崩淋病治有五臟之分然有可分者有不可分者可
分者如心肺居於膈上二陽臟也肝脾腎居於膈下
三陰臟也治陽者宜治其氣治陰者宜治其精此可
分之謂也然五臟相移精氣相錯此又其不可分者
也即如病本於心君火受傷必移困於脾土故治脾
即所以治心也病本於肺治節失職必殘及於腎水
故治腎即所以治肺也脾為中州之官水穀所司餉

道不資必五路俱病不究其母則必非治脾良策肝為將軍之官鬱怒是病勝則伐脾敗則自困不知強弱則攻補不無倒施不獨此也且五臟五氣無不相涉故五臟中皆有神氣皆有肺氣皆有胃氣皆有肝氣皆有腎氣而其中之或此或彼或利或害各有互相倚伏之妙故必悟藏氣之大本其強弱何在死生之大權其緩急何在精氣之大要其消長何在攻補之大法其先後何在斯足稱慧然之明哲若謂心以

欽定四庫全書

卷三十八

五

藜仁遠志肺以桔梗麥冬脾以白木甘草肝以青皮芍藥腎以獨活玄參之類是不過膚毛之見又安知性命之道也諸證皆然不止崩淋者若此

一婦人於四旬外經期將斷之年多有漸見阻隔經期不至者當此之際最宜防察若果氣血和平素無他疾此固漸止而然無足慮也若素多憂鬱不調之患而見此過期阻隔便有崩決之兆若隔之淺者其崩尚輕隔之久者其崩必甚此因隔而崩者也當預服

四物八珍之類以調之否則恐其鬱久而決則為患滋大也○若其既崩之後則當辨其有火無火有火者因火逼血宜保陰煎主之無火者因隔而決或其有滯當去其故而養其新宜調經飲先以理之然後各因其宜可養則養用小營煎可固則固用固陰煎之類主之

欽定四庫全書

卷三十八

五

衄血也

立齋曰前證治法固脾胃虧損不能攝血歸源者用六君加芍歸柴胡○若因肝經之火而血下行用奇效四物湯或四物加柴梔苓朮○若肝經風熱而血妄行用加味逍遙散或小柴胡加梔芍丹皮○若怒動肝火而血沸騰亦用前藥○若脾經鬱結而血不歸經用歸脾加柴梔丹皮○若悲傷胞絡而血下崩用四君加柴梔升麻

附按 大尹王天成之內久患崩自服四物涼血之劑或作或徹因怒發熱其血不止服前藥不應乃主降火更加脇腹大痛手足俱冷余曰此脾胃虛寒所致先用附子理中湯熱退痛止又用濟生歸脾湯補中益氣湯崩血頓愈若泥痛無補法則誤矣

血崩簡易方

一方 治風熱血崩用荊芥穗燈火燒焦為末每服一錢童便調服

欽定四庫全書

果岳全書 卷三十八

五

一方 治血崩用陳槐花一兩百草霜半兩為末每

服一二錢燒紅秤錘焯酒服

崩漏論外方

增損四物湯 婦百十 虛不固攝

一味防風散 婦百十五 肝經風熱血崩

防風黃芩湯 婦一二三 風熱血崩

柏葉散 婦一二一 虛弱久崩

棕灰散 和一二五 固虛崩漏

龍腦雞蘇丸 和三七二 虛火崩淋下血

殺血心痛 十三

陳臨川良方云婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由

心脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦然用烏賊魚骨炒為末醋湯調下失笑散亦效

立齋曰前證若陰血耗散用烏賊丸收斂之若瘀血不散用失笑散行散之若心血虛弱用芎歸湯補養之若鬱結傷血用歸脾湯調補之

附按 一婦人血崩兼心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛證悉具面色痿黃余曰心主血蓋由去血過多

心無所養以致作痛宜用十全大補湯參朮培之三十餘劑稍愈旨餘劑全愈

欽定四庫全書

果岳全書 卷三十八

五

愚謂殺血心痛既由血去過多而心痛甚明屬心無所

養但當專用甘溫以養營氣如十全大補湯大營煎

小營煎五福飲之類為宜若失笑散者惟氣滯血逆

而用以行之散之則可必不可以治血虛也再如烏賊丸乃內經腹中論用治血枯者亦恐於血虛心痛未必即效用者審之

熱入血室 十四