

嘈雜

大夫婦人心胸嘈雜此脾胃鬱火滯痰血液淚汗而
成用豬血炒食之乃以血導而使之歸源爾旋覆花
湯尤善

薛前證若因食鬱用六君子山查山梔若因

胃熱用二陳薑炒芩連若因六鬱用越鞠丸

雜病

若

因氣滯用四七湯

雜病

桔梗枳殼大抵此證屬病氣

元氣俱不足須用六君子為主少佐以治痰之藥若以

水治之必變吞酸中滿一婦人飲食少思胸中嘈

雜頭暈吐痰此中氣虛而有熱用六君子湯加炒黑

山梔桔梗枳殼

痰用補中益

氣湯加半

在

人中脘嘈雜口

中辛薊或咳嗽吐痰發喘面色或白或赤此脾氣虛而肺中伏火也用六君子加山梔桂梗柴胡及炒黑片苓治之尋愈一婦人嘈雜吞酸飲食少思大便秘不實此脾氣虛寒而下陷用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑漸愈又常服人參理中丸卽安一婦人飲食後嘈雜吞酸此食鬱爲痰用六君子湯送越鞠丸漸愈又用加味歸脾湯而痊後因怒兩脇脹痛中脘作酸用四君子湯送左金丸漸安仍用六君子湯送越鞠丸而痊

旋覆花湯

治婦人心胸嘈雜中脘痰飲冷氣心下

汪洋口中清水自出腹脇急脹滿痛不欲飲食

旋覆花

人參

桔梗

白芍藥

各壹錢

橘皮

去白壹錢半

赤茯苓

半夏

各貳錢

官桂

去粗皮

細辛

甘草

各半錢

右作一服水貳鍾生薑五片煎至壹鍾食前服

補遺予嘗以參蘇飲二分四物湯一分交和每四錢

生薑七片煎服治一婦人心胸嘈雜而愈亦名茯

苓補心湯

小便淋瀝

天婦人淋瀝由腎虛而膀胱熱也蓋膀胱與腎為表

裏主於水行於脬者為小便也若腎虛則小便頻數

膀胱熱則小便淋瀝甚則不通腹脹喘急當速治之

薛前證若膀胱熱結用五淋散若脾肺虛熱用補

中益氣雜病勞倦加山藥五味麥門若脾經鬱熱用加味

歸脾湯即歸脾加丹皮山梔若肺經鬱火用黃芩清肺飲若肝

經濕熱用龍膽瀉肝湯雜病淋血虛用加味道遙散結核

陰虛用六味丸雜病虛勞加柴胡山梔入抵不渴而不利

者熱在下焦血入用滋腎丸而不利者熱在氣

分也用清肝散而無方者陰火盛而陽不能
化也用六味丸滋腎丸為主尺脉浮而無力者陽氣
虛而陰不能生也用加減八味丸滋病滋腎丸為主
一婦人素有前患內熱體倦余以為肝火血少脾
氣虛弱用八珍逍遙二散兼服月餘而小便利又用
八珍湯而血氣復一婦人患前證面青脇脹諸藥
不應余以為肝經氣滯而血傷用山梔川芎煎服而
愈一婦人小便不利小腹并水道秘悶或時腹脇
脹痛余以為肝火用加味道逍遙散加龍膽草四劑稍
愈乃去膽草佐以八珍散加炒黑山梔兼服而瘥

石韋散 治婦人小便卒然淋瀝

石韋

黃芩

瞿麥穗

榆白皮

木通

葵子

各壹錢半

甘草

半錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食前服

木通散

治婦人五淋

木通

榆白皮

瞿麥穗

大麻仁

滑石

各壹兩

葵子

貝齒

白茅根

各貳兩

甘草

半兩

右為粗末每服壹錢水煎分三次溫服

桃膠散

治婦人血淋勞淋

各一兩

桃膠

榆白皮

各一兩

車前子

冬瓜子

鯉魚齒

葵子

瞿麥

木通

各半兩

枳殼

貳錢半

右咬咀每服四錢重水壹盞煎至七分去滓溫服

金沙散

治婦人諸淋

右海金沙草陰乾為末煎生甘草湯調服貳錢

又方

真琥珀

研末不

研木香白湯調下

此二方出陳總領方

雞蘇散

治婦人血淋

雞蘇葉

木通

各貳兩

生乾地黃

滑石 各叁兩

刺薊根 壹兩

右為粗末每服半兩水盞半筆竹葉叁七片煎至七分去滓食前溫服

治婦人血淋及尿血澀痛方

生乾地黃 叁兩

鬱金

蒲黃 各貳兩

右為細末每服貳錢車前子葉煎湯調下以利為度

亦有血瘕似淋小便不通臍腹脹滿宜桃仁煎 方見前

聚癥瘕門
二條

後有用亂髮方 不得小便亦可治血淋尿血

火府丹

治心火

便澁及治五淋

加甘草為笑咀煎名導赤

昔立本
事方

生地黃

貳兩

木通

黃芩

各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸木通

煎湯下兼治淋瀝臍下滿痛

許學士云壬戌年

一卒渴病一日飲水一斗不食者三月心中煩悶

時已十月予謂曾經三伏熱與此藥數服越二日

來謝云當日三服渴止又三服飲食如故此本治

淋用以治渴可謂通變也

治婦人諸般淋

苦杖根俗呼爲杜牛膝多取洗淨剉碎取壹合用水伍盞煎至壹盞去滓用麝香乳香少許調下

鄞縣武尉耿夢得其內人患沙石淋者十三年每漩痛楚不可忍溺器中小便沙石剝剝有聲百方不効偶得此方服之一夕而愈目所視也

局方五苓散 八正散 清心蓮子飲皆可用

滋腎丸 治熱在血分不渴而小便不利或腎虛足熱腿膝無力不能履地又下焦陰虛小便不利肚腹腫脹或皮膚張裂眼睛突出此神劑也

知母

黃蘗 各酒炒

肉桂 去麋皮

右各易為丸如桐子大每服貳百丸空心吞

滾湯下

黃芩清肺飲 治肺熱小便不利宜用此藥清之

黃芩炒

山梔炒各壹錢

右水煎服不利加鹽豉貳拾粒

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如

豆汁或成砂石或如膏汁或熱拂便血

赤茯苓壹錢半

赤芍藥

山梔各壹錢

當歸

甘草各壹錢貳分

右入燈心水煎服

脬轉不得小便

天婦人脬轉之病者由脬爲熱所迫或忍小便俱令
水氣迫於脬屈辟不得充張外水應入不得入內洩
應出不得出內外壅滯脹滿不通故爲脬轉其狀少
陰急痛不得小便甚者至死不可治也

薛前證不

問男女孕婦轉筋小便不利命在反掌非八味丸不
能救餘叅前後論主治

一婦人小便淋瀝小腹脹

悶胸滿喘急諸藥不應余視爲轉筋之證用八味丸

料煎服小便卽利而痊

一婦人因鬱怒小便滴瀝

漸至小腹墮脹痰喘促余用八味丸料煎服小便

即利而痊

天滑石散

千金

治婦人丈夫脬轉小便數日不通

滑石

壹兩

凝水石

貳兩

葵子

壹合

右為末以水壹斗煮取伍升時時服壹升即利

又方

亂髮

燒灰存性

葵子

車前子

各等分

右為細末每服貳錢茶湯調下

蒟葉散

治婦人脬轉小便不通亦可治男子

裹茶蒟葉

燒灰存性壹兩

滑石

研細半兩

右研停沸湯調貳錢服

石韋湯 治證同前

石韋 去毛

車前子 各等分

右為龜夫每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓服
治婦人忍小便不得依時而起致令脬轉經四五日
困篤欲死

滑石 貳兩

亂髮灰 壹兩

右研停取桃白皮壹斤熟搗以水參盞絞取汁無
時溫半盞調壹錢服

又方 以滑石末葱湯調下貳錢服

千金翼方 治婦人不得小便

杏仁皮尖

一味炒黃細末水調服立通

又方 以紫草為末并華水調取木指撮立通又云

紫苑皆可用

若卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由異
氣傳併膀胱或從憂驚氣無所伸鬱閉而不流氣
衝脬系不正診其脉右手澁小左手急大宜蔥白
湯

蔥白湯方

橘皮叁兩

葵子壹兩

蔥白壹莖

右咬咀以水伍升煮取貳升分三服此指迷方

補遺紫金皮為末葱湯調下貳錢葵子湯亦可

又方 胞轉小便不通炒鹽半斤囊之乘熱灸之

薛滋腎生肝飲

山藥

山茱萸 肉各壹錢

熟地黃 白製貳錢

澤瀉

茯苓

牡丹皮 各柒分

五味子

杵炒伍分

柴胡 叁分

白朮

當歸

甘艸 各叁分

右水煎服

八味丸 治脬轉小便不通殊有神効但世所不用

以致誤人多矣 方見雜病虛勞