

御纂醫宗金鑑

訂正傷寒論註

辨太陽病脈證併治中篇
辨太陽病脈證併治下篇

全部
卷二
卷三



御纂醫宗金鑑卷二

訂正仲景全書傷寒論註太陽中篇目錄

麻黃湯

芍藥甘草附子湯

桂枝新加湯

茯苓甘草湯

小建中湯

炙甘草湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯



桂枝去桂加茯苓白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸



大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯



御纂醫宗金鑑卷二

訂正仲景全書傷寒論註

辨太陽病脈證并治中篇

太陽統攝之營衛乃風寒始入之兩途風則傷衛寒則傷營衛氣慄疾統氣而行脈外其用疏泄而屬陽邪之犯也易故其犯之也則有汗爲虛邪營氣專精統血而行脈中其體固密而屬陰邪之犯也難故其犯之也則無汗爲實邪夫冬固寒令也然春月餘寒秋末早寒皆能致病但有無汗實邪證候顯然即可謂之傷寒不必盡屬隆冬也然太陽經也膀胱府也由經視府則經爲表而府爲裏矣上

篇用桂枝湯解肌所以治風傷衛之表也而未及衛分之裏故又立五苓散一方佐桂枝以和衛分之裏焉此篇用麻黃湯發汗所以治寒傷營之表也而未及營分之裏故又立桃核抵當方佐麻黃以攻營分之裏焉至於汗下宜過之則傷正而虛其陽不及則熱熾而傷其陰虛其陽則從少陰陰化之證多以太陽陽明遞相傳也此篇中所以從陽明陽化之證多以太陽陽明遞相傳也此篇中所以又有四逆承氣之治也凡風傷衛之虛邪已列上篇茲以寒傷營之實邪疏爲中篇使讀者先會大意於胸中斯臨證處方自不致誤矣

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者
名曰傷寒

註

太陽病即上篇首條脈浮頭項強痛惡寒之謂也營表陰
也寒陰邪也寒邪傷人則營受之從其類也已發熱者寒
邪束於皮毛元府閉密陽氣鬱而為熱也未發熱者寒邪
初入尚未鬱而為熱頃之即發熱也惡寒者為寒所傷故
惡之也必惡寒者謂不論已熱未熱而必惡寒也寒入其
經故體痛也胃中之氣被寒外束不能發越故嘔逆也寒
性勁急故脈陰陽俱緊也此承上篇首條言太陽病又兼
此脈此證者名曰傷寒以為傷寒病之提綱後凡稱傷寒



者皆指此脈證而言也

集註

方有執曰或者未定之辭必者定然之謂曰或曰必者言發熱早晚不一而惡寒則定然即見也

喻昌曰仲景慮惡寒體痛嘔逆又未發熱恐誤認為陰經之證故早於篇首揭明此語以辨之

程應旄曰傷寒陰陽俱緊之脈大不同於中風陽浮而陰弱之緩脈矣證與脈兼得其實然後乃得正其名曰此太陽傷寒之病而非中風所能混也

魏荔彤曰傷寒中風同一浮脈而彼為浮緩此為浮緊陽邪舒散故緩陰邪動急故緊同為在表之浮而一緩一緊

風寒迥異矣

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

註

此承上條而詳言其證以出其治也太陽經脈起於目眇眇上額交巔入絡腦還出別下項循肩膊內挾脊抵腰中至足小指出其端寒邪客於其經則營血凝澁所傷之處無不痛也營病者惡寒衛病者惡風今營病而言惡風者蓋以風動則寒生惡則皆惡未有惡寒而不惡風惡風而不惡寒者所以仲景於中風傷寒證中每互言之以是知中風傷寒不在惡寒惡風上辨而在微甚中別之也無汗



者傷寒實邪腠理閉密雖發熱而汗不出不似中風虛邪發熱而汗自出也陽氣被寒邪所遏故逆而為喘逆之以麻黃湯者解表發汗逐邪安正也

集註

成無已曰寒則傷營頭痛身疼腰痛以致牽連骨節疼痛者太陽經營血不利也

程應旄曰頭痛發熱太陽病皆然而身疼腰痛骨節疼痛是寒傷營室若風傷衛則無是也惡風太陽病皆然而無汗而喘是陽被壅遏若風傷衛則無是也得其所同因以別其所異也

沈明宗曰太陽之邪從皮毛而入鬱逆肺氣以故作喘且



寒主收斂傷營則腠理閉密故用麻黃湯發之

麻黃湯方

麻黃

三兩 去節

桂枝

二兩

甘草

一兩 炙

杏仁

七十個湯 浸去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取

二升半去渣溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝

法將息

方解

名曰麻黃湯者君以麻黃也麻黃性溫味辛而苦其用在

迅并桂枝性溫味辛而甘其能在固表證屬有餘故主以

麻黃必勝之算也監以桂枝制節之師也杏仁之苦溫佐



麻黃逐邪而降逆甘草之甘平佐桂枝和內而拒外飲
於胃行氣於元府輸精於皮毛斯毛脈合精濤溱汗出在
表之邪必盡去而不留痛止喘平寒熱頓解不須啜粥而
藉汗於穀也必須煮掠去上沫者恐令人煩以其輕淨之
氣過於引氣上逆也其不用薑棗者以生薑之性橫散於
肌礙麻黃之迅升大棗之性泥滯於膈礙杏仁之速降此
欲急於直達少緩則不迅橫散則不升矣然此爲純陽之
劑過於發汗如單刀直入之將用之若當一戰成功不當
則不戢而召禍故可一而不可再如汗後不解便當以桂
枝代之此方爲仲景開表逐邪發汗第一峻藥也庸工不

知其制在溫覆取汗若不溫覆取汗則不峻也遂謂麻黃
專能發表不治他病孰知此湯合桂枝湯名麻桂各半湯
用以和太陽留連未盡之寒熱去杏仁加石膏合桂枝湯
名桂枝二越婢一湯用以解太陽熱多寒少之寒熱若陽
盛於內無汗而喘者又有麻黃杏仁甘草石膏湯以解散
太陰肺家之邪若陰盛於內而無汗者又有麻黃附子細
辛甘草湯以溫散少陰腎家之寒金匱要畧以此方去桂
枝千金方以此方桂枝易桂皆名還魂湯用以治邪在太
陰卒中暴厥口噤氣絕下咽奏效而皆不溫覆取汗因是
而知麻黃湯之峻與不峻在溫覆與不溫覆也此仲景用

方之心法豈常人之所得而窺耶

集解

王肯堂曰此方為元氣不虛者設也如挾時氣者宜十

湯挾暑濕者宜正氣湯挾寒者宜五積散挾熱者宜通聖

散挾食者宜養胃湯挾痰者宜芎藭散按肯堂之議誠當

矣然必證兼表裏邪因錯雜似傷寒而非傷寒者乃可於

諸方中斟酌選用若脈證與麻黃桂枝脗合自當遵仲景

之法治之即元氣素虛或平素有熱不宜麻桂者亦必如

劉完素張潔古法緩緩消息治之庶不誤人臨病之工宜

詳審焉

吳綬曰凡傷寒寒邪在表閉其腠理身痛拘急惡寒無汗

須用麻黃辛苦之藥開發腠理逐寒邪使汗出而解惟夏
月炎暑之時雖有是證宜加涼藥方可用如防風通聖散
三黃石膏湯是也

傷寒一日太陽受之脈若靜者為不傳頗欲吐若躁煩脈數急
者為傳也

註傷寒一日太陽受之當脈浮緊或汗或未汗若脈靜如常

此人病脈不病為不傳也初病或嘔未止頗若吐若躁煩
脈數急者此外邪不解內熱已成病勢欲傳也宜以大青
龍湯發表解熱以殺其勢或表裏有熱證者則當以雙解
湯兩解之也



集註 沈明宗曰此憑脈辨證知邪傳與不傳也脈浮而緊為太

陽正脈迺靜是不傳他經矣若頗欲吐或躁煩而脈數急則邪機向裏已著勢必傳經為病也

傷寒二三日陽明少陽證不見者為不傳也

詩 傷寒二日陽明受之三日少陽受之此其常也若二三日

陽明證之不惡寒反惡熱身熱心煩口渴不眠等證與少陽證之寒熱往來胸脇滿喜嘔口苦耳聾等證不見者此為太陽邪輕熱微不傳陽明少陽也

集註 程知曰傷寒一二日太陽二三日陽明三四日少陽四五

日太陰五六日少陰六七日厥陰此第言其常耳其中變



證不一有專經不傳者有越經傳者有傳一二經而卽也
者有發於陽卽入少陰者有直中三陰者有足經寃熱而
傳手經者有誤藥而傳變者大抵熱邪乘經之虛卽傳若
經實卽不受邪而不傳陽邪勝則傳陰邪勝多不傳故經
謂脈靜爲不傳脈數急爲欲傳也又曰足經自足上行胸
腹頭背主一身之大綱故寒邪人之卽見於其經若手經
第行於胸手不能主一身之大綱也邪既入足經必傳入
手經故感風寒之重者頭項痛肩背肘節亦痛也聖人言
足不言手足可該手手不可該足也非不傳手也夫五臟
六腑十二經氣相輪絡相通豈有傳足而不傳手者哉亦