

校刻傷寒圖歌活人指掌卷之二

傷寒問答四十六證歌

咳嗽一

往來寒熱胃中滿此證誠知嗽在陽

三陽

陰證嗽時頻下利

四肢沉重更清涼

少陰

論曰肺爲五藏華蓋專主于氣清濁既分則無嗽清氣

不分濁氣上干加以協水停飲則爲嗽矣或用杏子阿

膠者蓋欲分清也若太陽少陽之邪入于肺氣則當發

散而愈若陰證停寒法當溫之

太陽發汗而咳

小青龍湯三十八

發熱嘔噦而咳

小柴胡四十三

表未

解心下有水乾嘔發熱而咳

小青龍湯同前

小便不利小腹重

者

小青龍去麻黃加茯苓四十

少陽往來寒熱胃脘滿痛或泄利

咳

小柴胡去棗人參加五味子乾姜湯四十八

嘔渴心煩不得眠

猪苓湯五

陽明脉浮弦腹滿咳嗽潮熱小便難脇痛鼻乾不得汗

嗜臥陽明中風也

小柴胡同前

汗後傷水喘嗽

小青龍去麻黃加杏仁為

三十有痰而嗽

大半夏湯百二十五

春冬傷寒秋夏傷冷濕咳而

喉中鳴上氣不得下

橘皮湯百七十

少陰四肢厥逆腹中痛或

泄利而咳

四逆散加五味子乾姜湯百九

少陰咳嗽

真武湯百三十九

嗽而四肢

沉重小便不利或自下利

真武湯加五味子乾姜百三十九

四肢厥逆或

咳或悸或小便不利或腹痛或泄利重者

四逆散百十三

咳逆二

咳逆皆因胃有寒此名惡候古今傳橘皮半夏并姜附不
瘥依方炙乳邊

論

本字
咳逆
不下也

論曰經云趺陽脉浮則為氣餽俗名吃忒若寒客于中
氣不伸則當逐寒以溫之熱客于中不得伸則當逐熱
以引之若胃有寒又飲以水水寒相搏而成咳逆則當
溫之倘加以頭汗譊語腹滿微喘又見咳逆則危甚矣

寒證脉微細咳逆者胃有寒
橘皮半夏生姜湯百七十一
羌活附子湯百三十八

水寒相搏咳逆
小青龍去麻黃
加附子湯四十熱證脉浮洪或有熱證

而咳逆者乃火熱奔急上行肺不得納故也
甘草瀉心湯百三十一

少陰失下咳逆大便實

小承氣湯六十七

藥無效者旋黃蘗法

二百三十二

不差即灸之婦人屈乳頭向下盡處骨間丈夫

及乳小者以一指為率男左女右艾炷如小豆許三壯
陷中有動脉是穴

噦附

小柴胡主陽家噦或用陳皮與竹茹

即陳皮竹茹湯百六十九

腹滿須

看前後部猪苓承氣莫相拘

活人書云有陽家咳逆者小柴胡湯四十三橘皮湯次之

百七十一

前後部乃大小便也前部不利

猪苓湯百二十四

後部不利

調胃承氣

湯六十八陽明中風脉弦浮小便難潮熱而噦者

小柴胡加茯苓湯

四十詳見小便條証治論云嘔噦手足逆冷者小橘皮湯百八十九

嘔噦胃滿虛煩不安大橘皮湯百六十七

惡風三

病人衛中八方風脉緩而浮是本宗自與傷寒分兩証不

堪例作一般攻桂枝湯一

惡寒四

惡寒發熱發於陽陰病憎寒身體涼解表桂枝并越婢溫
中須索理中湯

論曰經云發熱惡寒發于陽也無熱惡寒發于陰也傷
寒發熱惡寒太陽証也若無熱惡寒而蹇脉沉而細此

陰虛也方可溫之但微惡寒雖有裏証未可遽下必當

解表不惡寒乃可下也惡寒雖尋常所係甚重蓋以此

別表裏不可不慎也

發熱微惡寒者柴胡桂枝湯五十三桂枝二越婢一湯十一太陽或發熱或

未發熱必惡寒有汗桂枝湯一無汗麻黃湯二十陽明證俱宜下

惟惡寒中寒係與太陽病也可汗麻黃湯二十自汗出多風

惡寒者表未解也桂枝湯一少陽頭汗而微惡寒者用柴胡

胡湯四十三惡寒大綱多屬表雖惡寒而脉必沉細也宜用

四逆理中輩以溫之可也四逆湯百八理中湯百四五少陰病惡寒

而趺下利手足溫者須以小建中湯五十八或惡寒而趺時時

自煩不欲厚衣者

大柴胡湯四十二

汗後反惡寒虛也

芍藥甘草附子

湯百汗吐下後七八日不解發熱而渴時時惡寒表裏

俱熱

白虎湯七十

大下後復發汗心下痞惡寒無汗先以桂

枝湯然後攻痞尺寸脉微而惡寒此陰陽表裏俱虛不

可更吐下可用

小建中湯

身體痛五

中濕痛

陰毒痛附

脉緊而浮身體痛太陽經病不堪任更兼中濕并風濕若

是陰家脉帶沉

論曰太陽之痛但拘急耳中濕之痛不可轉側陰毒之痛體熱沉篤宛如被杖以此別之

太陽脉浮無汗當以汗解

麻黃湯二十一

尺脉遲者血不足也

黃芪建中湯五十七

次第浮者

麻黃湯二十

中濕

風溫

各有本條

陰家脉

沉身體痛

四逆湯百八真武湯百三十九附子湯百三十六

清便自可身疼痛救表元來有桂枝若還下利多清穀四

逆設之不必疑

太陽傷寒醫反下之下利清穀身疼痛者先當救裏若

身疼痛清便自調當救表救裏宜

四逆湯百八

救表宜

桂枝湯一

身如被杖名陰毒須向陰中調理之汗後有時加霍亂渾

身疼痛脉沉遲

汗後霍亂身痛不休少與

桂枝湯一

汗後身疼痛脉沉遲者

與黃芪建中湯

五十

仲景

桂枝芍藥人參湯三十二

咽痛六

腎傷寒附

發斑唾血成陽毒

白有本條

陰證咽中必有瘡汗出陰陽俱緊

溢還當咽痛號亡陽

論曰咽痛有寒有熱太陰之脉絡于咽嗑咽主納受太

陰脾土之氣邪熱乘之乃生咽痛若汗多下利虛而生

熱亦能咽痛也

陰證者少陰也陰陽脉俱緊主無汗有汗者曰亡陽屬

少陰法當咽痛

治在自汗亡陽條

大抵咽痛

其法湯百

七一猪膚湯二百五

不問陰陽證皆可用也

證治論口瘡赤爛

蜜漬黃蘗汁八十三
升麻六物湯六十四

又有非時暴寒伏於少陰之經

脉微弱而咽痛次必下利古方謂之腎傷寒先用

半夏桂枝

湯百二次四逆散

一二日當差應少陰經傷皆謂腎傷

寒也亦多表裏無熱但苦煩憤默默而極不欲見光明

有時腹痛或脉沉細舊用四順湯古人恨其熱不堪用

云腎病而體猶有熱者可服

黃連龍骨湯八十一

若已十餘日下

利不止手足微冷無熱證者

四順湯百五十一

諸方書中即不會

載黃連龍骨湯亦於黃連雞子湯內去雞子加龍骨半

兩也四順湯元即理中湯元中加甘草一倍是也

四順湯百

五咽中閉塞不可下

烏頭湯二

筋惕肉瞤七

膈上十左右有勁氣者皆不可汗仍不可下詳見不可表條中

大凡發汗過多時筋惕肉瞤也要知動氣左邊須忌汗若還發汗便難醫

論曰內經云陽氣精則養神柔則養筋發汗及下後津

液枯槁陽氣大虛筋肉失所養故惕然而跳瞤然而動

治以溫經益陽則可矣若犯其逆津液寒竭則危証也

應發汗而動氣在左不可發汗發汗則筋惕肉瞤此為

逆難治也且先服

防風白朮牡蠣湯百七十六

次服

小建中湯五十八

太陽

汗出不解仍發熱頭眩身瞤動振振欲擗地

真武湯百三十九

虛甚者去芍藥惡熱者去附子又可服

茯苓桂枝甘草白朮湯百二十一

傷寒吐下後脉微心忤脇痛氣上衝心脉動惕此乃

逆甚太陽汗下後復加燒針胃滿膚惕者為難治

傷寒無汗八

冬陽明詳見潮熱條陰易詳見傷寒別名剛瘧三陰太陽其五證

並各有本條

傷寒無汗分為八剛瘧三陰與太陽冬病陽明皆係數下

連陽易應魁罡

傷寒自汗九

陽明証無汗附

九般汗自傷風始風濕風溫胃不和中暑亡陽并霍亂陽

明柔瘕汗偏多

論曰經云風傷衛衛脉受傷緩弛自汗自汗者當實表

實表多用桂枝然桂枝須用詳細若浮而弱服桂枝後

煩而小便數者不可再服也仲景云太陽病自汗四肢

拘急難以屈伸小便難者可服桂枝附子湯若小便數

者慎不可與也如表虛自汗反發汗過多遂漏不止名

曰亡陽如器之漏非附子桂枝黃芪不足以實之也

太陽傷風自汗桂枝湯若渴者五苓散百若不渴者茯苓

湯九若自汗出而小便難者桂枝湯附子自汗出而小便

數者不可行桂枝也芍藥甘草湯風濕風溫各有一條胃不

和病人藏無他病時發熱自汗是也桂枝湯中暑目有本條

亡陽九發汗多而漏不止曰漏風亡陽桂枝湯尺寸脉

俱緊主無汗而反汗出曰亡陽

桂枝附湯六

法當陰痛

猪膚湯二

百六廿枯湯百七一

四肢疼而厥逆惡寒者

四逆湯百八

大抵陰病四

肢逆冷額上及手背冷者法當無汗而有汗者曰亡陽

四逆湯百八

煩燥惡風汗出不得臥

防風白朮牡蠣湯百七十六

次服

中湯五十八

汗多不止者

濕粉撲之

霍亂吐利自汗手足逆

冷者

四逆湯百八

有熱證而霍亂及中暑者

甘草白虎湯七

四信效多用

小柴胡湯四十三

依常法煎俟極冷服之效

陽

明汗多而渴不大便者

調胃承氣湯六十八

陽明法當多汗亦

有無汗者不可不知也

小便自利者津液內竭不可

用承氣湯攻之

宜蜜導法二百二十六

惡寒者表未解

桂枝湯一

反無

汗惡寒者

升麻葛根湯
六十二

反無汗而喘者

麻黃湯
二十一

柔痙

本條補遺陰證吐利止汗出而厥脉微欲絕

通脉四逆加猪膽汁湯二

百二少陰小便白咽乾嘔吐厥逆

甘草乾姜湯百十四

口燥咽乾十

病在陽經背惡寒人參白虎療咽乾柴胡專主少陽證若是法家下即安

論曰陽明燥渴此邪熱在內緣土能制水故用白虎加

人參滋津液水少陽邪在中焦口苦舌乾則以小柴胡

和之若少陰熱在下焦銷鑠腎水當急下之不可緩也

陽經者即陽明經也又一證無大熱背微惡寒並主緩

渴

白虎加人參湯七

少陽脉弦寒熱往來而嘔

小柴胡湯四十三

少陰

證

具本條

咽乾者津液枯燥不可發汗狐惑亦有咽乾證

本條

寒熱往來十一

往來寒熱陰陽搏大小柴胡及桂姜結熱心煩仍喜嘔渴兼頭汗恰相當

論曰經云邪氣分爭則爲往來寒熱邪與陽爭反發寒邪與陰爭反發熱此半表半裏證也病至六餘日結熱在裏表證已罷方可下之如不嘔清便日二三發小柴胡湯桂枝麻黃各半湯和解之然婦人熱入血室經水

適來而胸滿經水適斷而續得寒熱謂有留邪必須治

之如先患傷寒結熱經水適來晝明暮昏如見鬼狀經

日無犯胃氣及上下焦必自愈蓋經水斷然後熱除血

去必自愈矣無犯胃氣不可下也無犯上焦不必服小

柴胡湯動胃氣也無犯中焦不必刺期門動榮氣也

心煩喜嘔胸脇滿不欲食小柴胡湯四十三渴而不嘔頭汗出

而痛胃脇滿小便不利柴胡姜桂湯五十四少陽胃滿或泄而

嘔小柴胡去參棗加五味子湯四十八不嘔清便寒熱日二三發桂枝麻黃各半湯

湯十脉緩惡寒而熱不可更發汗桂枝二越婢湯十一人中

風續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血