

蘭室秘藏卷下

東垣老人 李杲 撰

明 新安 吳勉學 校

大便結燥門

大便結燥論

金匱真言論云北方黑色入通腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難者取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若饑飽失節勞役過度損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥然結燥之病不一有熱

燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結燥者治法云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結者溫之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響然不能大便者以苦藥泄之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黃通之風結燥而大便不行者以麻子仁加大黃利之如氣澀而大便不通者以郁李仁枳實皂角仁潤之大抵治病必究其源不可一槩用巴豆牽牛之類下之損其津液燥結愈甚復

下復結極則以至導引於下而不通遂成不救噫可不慎哉

通幽湯

治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草

紅花 已上各壹分

生地黄

熟地黄 已上各伍分

升麻

桃仁泥

當歸身 已上各壹錢

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗調櫝榔細

末五分稍熱食前服之

潤燥湯

升麻

生地黃

已上各貳錢

熟地黃

當歸稍

生甘草

大黃

煨

桃仁泥

麻仁

已上各壹錢

紅花

伍分

右除桃仁麻仁另研如泥外剉如麻豆大都作一服水二盞入桃仁麻仁泥煎至一盞去粗空心稍熱服

潤腸丸

治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥閉塞不通全不思食及風結血秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風

自然通利矣

桃仁

湯浸去皮尖

麻仁

已上各壹兩

當歸稍

大黃

煨

羌活

已上各壹錢

右除桃仁麻仁另研如泥外搗爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心白湯下

如病人不大便爲大便不通而澀其邪盛者急加酒洗大黃以利之

如血燥而大便燥乾者加桃仁酒洗大黃

如風結燥大便不行者加麻仁大黃

如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之

如脉澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除氣燥

如寒陰之病爲寒結閉而大便不通者以局方中半硫丸或加煎附子乾薑湯冰冷與之其病雖陰寒之證當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與一服藥微通其大便不令結閉乃治之大法

若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜於陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加

如陰燥欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細而

遲此易爲辯耳知有客邪之病亦當從權加藥以去之

麻黃白朮湯

治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時躁熱發欲去衣須臾熱過振寒項額有時如冰額寒尤甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛當臍中有動氣按之堅硬而痛

青皮去腐

酒黃連已上各壹分酒黃蘗

橘紅

甘草

炙半

升麻

已上各貳分

黃芪

人參

桂枝

白朮

厚朴

柴胡

蒼朮

猪苓

已上各叁分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉

已上各肆分

白豆蔻

炒麴

已上各伍分

麻黃

不去節伍錢

杏仁

肆箇

右咬咀分作二服水二大盞半先煎麻黃令沸去

沫再入諸藥同煎至一盞去粗稍熱食遠服

此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽

道爲上盛元氣短少上喘爲陰火傷其氣四肢痿

在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其
肝木又實其母肺金尅木凌火是大勝必有大復
其證善恐欠多嚏鼻中如有物不聞香臭目視眊
眊多悲健忘少腹急痛通身黃腹大脹面目腫尤
甚食不下痰唾涕有血目眦瘍大便不通並宜此
藥治之

升陽湯

一名升陽瀉濕湯

治膈咽不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子

已上各
貳分

生地黃

熟地黃

黃蘗

已上各
參分

當歸身

甘草梢

已上各肆分

蒼朮

伍分

升麻

柒分

黃芪

壹錢

桃仁

拾箇另研

右咬咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞

煎至一盞去粗稍熱食前服

活血潤燥丸

治大便秘血秘常常燥結

當歸稍

壹錢

防風

叁錢

大黃

濕紙裹煨

羌活

已上各壹兩

皂角仁

燒存性去皮壹兩伍錢其性得濕則滑濕滑則

燥結自除

桃仁

貳兩研如泥

麻仁

貳兩伍錢研如泥

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸

如梧桐子大每服五十丸白湯下三兩服後須以
蘇麻子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也
以磁器盛之紙封無令見風

潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黃

生甘草

已上各壹錢

大黃

煨

熟地黃

當歸梢

升麻

桃仁

麻仁

已上各壹錢

紅花

叁分

右㕮咀水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云病有關有格關則不得小便又云關無出之謂皆邪熱爲病也分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之如渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故渴而小便不利也夫小便者是足太陽膀胱經所主也長生於申申者西方金也肺合生水若肺中有熱不能生水是絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源也故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如露如霜皆從天而降下也乃陽中之陰明秋氣自天而降下也且藥有氣之薄者乃陽中之陰

是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲
泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通
瞿麥扁蓄之類以清肺之氣泄其火資水之上源也
如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而大
燥小便不通也熱閉於下焦者腎也膀胱也乃陰中
之陰陰受熱邪閉塞其流易上老云寒在胸中遏絕
不入熱在下焦填塞不便須用感北方寒水之化氣
味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云無陽則陰
無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽
中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足

也須用感地之水運而生大苦之味感天之寒藥而
生大寒之氣此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣
人稟之生膀胱寒水之運人感之生腎此藥能補腎
與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便
不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必
伏其所主而先其所因其始則氣同其終則氣異也
通關丸 一名滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃蘗

去皮剉酒洗焙

知母

剉酒洗焙乾已上各壹兩

肉桂

伍分

右爲細末熟水爲丸如梧桐子大每服一百丸空

心白湯下頓兩足令藥易下行故也如小便利前
陰中如刀刺痛當有惡物下爲驗

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心 壹分

通草 貳分

澤瀉

瞿麥

琥珀 已上各伍分

扁蓄

木通 已上各柒分

車前子 炒壹錢

茯苓 去皮貳錢

猪苓 去皮參錢

右爲麤末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熟食

遠服或局方八正散五苓散亦宜服之

導氣除燥湯

治小便閉塞不通乃血澀至氣不通而竅澀也

茯苓

去皮

滑石

炒黃已上各貳錢

知母

細剉酒洗

澤瀉

已上各叁錢

黃蘗

去皮酒洗肆錢

右以咀每服五錢水三盞煎至一盞去粗稍執空

心服

如急閉不拘時服

腎疸湯

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澀

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡

已上各伍分

升麻

伍錢

已上治腎疽目黃渾身黃

白茯苓

貳分

澤瀉

叁分

猪苓

肆分

白朮

伍分

蒼朮

壹錢

已上治小便赤澀

黃蘗

貳分

人參

叁分

葛根

伍分

神麴

陸分

甘草

叁錢

右剉如大豆大分作二服水三盞煎至一盞去粗

稍熱食前服

痔漏門