

卯2

81-2

医方药性



醫院附屬醫方提督卷之正

太醫院

羅之煒

參定

閩書林

楊能儒

梓行

診脈至捷

傷寒

凡診脈男先診乎左者為

六經傳變歌

其左屬阳、數順行自

傷寒一日二日開兌熱頭痛及惡寒腰

東而西所以先左而后

緊可見此脈從頭連腰还无汗脉黃湯發散

右也女属阴、數逆行

有汗傷風桂枝湯大青龍湯表裏寒此属太

自西而東故先右而后

胆膀胱間

左也男女左右先後之傷寒二日三日内目痛身熱加一倍鼻乾不膿

法益休其明阳順道耳

脉來長此脉在來緩者是死無惡寒用葛根

非男女为左右法則是

有汗桂枝湯一劫便寒惡寒大柴胡此属阳



也

明胃經內

左心小腸肝胆腎右肺大

三日四日病轉深耳聾肺脹痛如錐寒

腸脾胃命督家之腑是

口乾苦此脈循腸絡耳聾弦盛之脈

勝脫命脈外診三焦病

似瘧婦人血結類小柴胡湯宜對

太人之脈左右同但下

距脈經尋

尺部常洪盛小兒脈數

病傳四日及五日腹痛咽乾自溫的自利而

是其宜更高三關蔡形

脈微沉脈布脾胃絡咽噎四逆理中治臍寒

証手上寸關尺三部皆

腹滿脈浮桂枝人胸滿痰多瓜吐之此屬太

寸止中下三部上焦火

明脾經挑

面咽膈病中王肚腹兩

傷寒五日六日來多眠口燥舌乾訣此脈絡肺

脇去下部小腹腿足間

繫舌本指下浮沉貫腎來舌乾須用小承氣

診脈參詳是公據淨沉

不渴不乾四逆裁汗出亡阳諸膚屬此屬少

遲數四般脉五臟六腑

陰者經排

為準則浮主中風病在表沉主在裏及筋骨連脉為寒瘕是虛數者挾

為寒六日七日到煩滿鬱結脉微緩筋急者四体疼脉浮明氣絡肝道脉若不浮脉緩如瘕各半妙囊緒明膏承氣如



多依此例

明肝經類

妊娠脉歌

右傷寒首尾多只在二經此一節令

妊娠之脉如何認要辨陰

經之病如此之樣

陽衰與盛陰陽俱盛脉

傷寒六經正病

而和而手調勻數相應

太陽頭疼身熱脊強

其人能食身無苦各節

陽明目痛鼻乾不眠

如常是妊定脉來左盛

少阻耳聾脇痛寒熱嘔而口為之苦

是男形右手偏洪是女

大阴腹滿自利尺寸沉而搏不到脈

孕七載帶下頻昏悶此少陰則舌乾口燥

是停痰惡阻病急宜止厥陰則煩滿囊拳

胃與消痰固血安胎全一日二日可發表而散三日四日可

兩命若還腰腹俱疼痛五六日便寔方可議下七八日不

日夜咽乾潮熱剩多眠再傳日傳二經名為兩感經傳三

惡食倦昏沉此屬疑疑太陰無汗麻黃為最太陽有汗桂枝可先小柴

邪非姪大綱孕脈類如胡為少陽之要領大柴胡行陰陽之秘至

此在意消詳審安淨三陰則准拘定法或可溫而或可下宜數變

小兒脈欲以曲全難或可方面可同

小兒五歲一指診十些方傷寒表証是如何无汗惡寒身熱多頭項俱疼

將兩指看七四五歲三指傷寒表証是如何无汗惡寒身熱多頭項俱疼

定更量長短詳指端左手脈浮取擇方施劑汗之和。用十神陽主之



南京中医药大学图书馆版权所有

人迎以候外右手氣口以候內外候風寒暑濕并內則乳食痰積其餘一一依前法大略于此重引載

五經証解

經去

十二脈中合經水內外相輪為表裏人身血氣要竟盈六脈无邪无病体

解商合真邪論曰夫至

八之起度數必應于天

傷寒裏証腹心膨不惡裏而惡吐其脉数沉兼自汗大便秘少下之生。用大柴胡主之

明証明証

明証身熱頭疼痛体痛咽乾難臥動或有譫語及循衣脉息弦洪宜審用

明証身涼二便清初自汗少煩寒也死但尿也无渴脉息沉微自可明。用理中湯主之

明証似明

明証身涼四肢小便利少大便難心煩口渴脉沉微白虎湯兼竹葉奇

明証似明

明証如明面色紅小便清滑大便通利身微熱



醫方類聚卷之八

地故有天空度地有經

水人有經脉宿謂二十

八宿度謂天之三百六

十五度也經水者謂海

水清水渭水湖水淨水

汝水江水淮水漯水河

水漳水洛水也以其中

合經脉故名之曰經水

經脉者謂手足三陽三

陰之脉所以言者以內

外者合人氣應之故言

及也甲乙經云是謂明

沉遲脉其氣弱兼用理生

陽厥

陽厥時指爪溫心煩便秘口乾渴

中還疾承氣柴胡最可者

明厥

明厥身涼熱不同二便滑冷不煩時脉來沉

知端的三建湯兼四逆宜

血証黃

發黃恰似烟薰色小便自利大便黑唇焦水

血家黃桃仁承氣湯堪擇

溫症黃

發黃渾似橘皮明小便不利大便行溫排相



外合于海少內屬于胃

足太陽外合于清水內

屬膀胱足少陽外合于

渭水內屬于胆足太陰

外合于湖水內屬于脾

足厥陰外合于浮水內

屬于肝足少陰外合于

次水內屬于腎手陽明

外合于江水內屬大腸

手太陽外合于淮水內

屬小腸手少陽外合于

渭水內屬三焦手太陰

名曰疽苗陳湯其五苓乎

剛柔柔症

元來症病屬膀胱口禁如癰身反張此是

感寒濕故分而証有剛柔死汗為剛須急治

惟有葛根湯第一有汗為柔見端的桂枝湯

誤湯急救二症皆宜續命湯剛症去桂枝湯

黃柔症去麻當用桂枝只依此法最為良


傷寒有四証相類

食積寒痰并動氣重藥亦有患煩勞要識四般

相類証不與傷寒同例看

傷寒三法

榮逆惡寒身體痛脈浮死汗急生脈子帶湯



外合于河水內属于肺

手厥明外合于漳水內

属心包手少陰外合于

渚水內属于心表裡者

明阳也表属阳裡属明

六腑为阳五臟为阴表

裡内外互相輪盈也人

之賴以生者氣与血而

已氣衛于外以克皮膚

血榮于中以營經絡周

一体而无間盈百刻而

不違者乃平人之常也

香蘇散有汗為風用桂枝

四五日來口舌乾發熱身病臥不安先服人參

敗毒散小柴胡湯在后者

七八日來勢在內口乾心煩腹脹暈小便赤

大便秘大柴胡湯好通和

發熱口乾大便洩小便赤少大便結小柴胡湯

兼五苓加上黃連真一絕

汗下之後病不解依太熱渴如見怪解毒湯兼

小柴胡諸般熱病皆死得

十神湯治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲

出痘疹此藥不開明阳而感傷寒並宜服

紫蘇 甘草 陳皮 乾葛 香付子

平人之常氣高乎胃六

脉無胃氣不能生和緩

而平者胃氣也此理論

曰穀入于胃脉道乃行

夫聖人以察陰陽以決

死生重經絡流注如環

之无端者此理之三

者耶

火之精氣主生神水氣充

盈生志意

解精之化成曰神意之

所存曰志心風南方丙

升麻 川芎 麻黃 白芷 赤芍藥

右咬咀每服三小水一盞半姜五片煎至七分

去渣熱服不拘時候如發熱頭痛

白中瀉劉遵加枳實名和解毒

香蘇散治四時傷寒頭痛發熱惡寒

建康 陳皮 香附子 竹葉

右咬咀水一盞半姜葱同至七分空心飲之

兼頭疼加川芎白芷香蘇散

煩熱

公參敗毒散治諸寒濕熱壯熱惡寒及白濁

嗽鼻聲重心經煩熱

人多 玄明 甘草炙用芎 茯苓



丁火位處離宮為五臟

之尊神明出焉腎屬北

方壬癸水位居坎戶為

一身之根精志藏焉道

義經曰神處心神守則

血氣流通盡藏賢志榮

則腎髓滿是孟子曰人

非水火不生活南斗經

亦曰水火者人身之生

命也在人身之中故必

得心二臟取象于水火

枳壳祛風散前胡羌活

柴胡各等

右咬咀水一盞半生薑三片薄荷少許

分去渣不拘時候如咳嗽加牛下

黃柏枝子黃連赤利咳血口舌乾

防風各別防敗毒敗消風散相合

毒散

小柴胡湯治傷寒如瘧胸膈滿痛小便不利

便秘

柴胡去苗半夏炮七人參黃芩甘草

服如胸滿及咽痛加枳實枳實名曰枳實



精之脈似惟有三秋乃應
時餘月見之皆惡候

瀉脈之候解註前章內
經曰瀉者陽氣有餘于
金方云脈瀉者多氣少
血審看左何部中以決
其病大抵男子以主
精氣耗竭女子以主
敗血多病惟秋以
脈微瀉口應四餘月
見之皆為惡候

洪鈞夏脈居寸以笑愚

枯湯脇痛加芍藥石菖蒲名曰柴胡桂枝湯
脇腹痛加只壳大黃名曰柴胡飲子
麻葛根名柴胡升麻湯如咳嗽加杏
子名曰柴胡五味湯并下之後病
連黃柏黃芩枝子名柴胡解毒湯
姜子芩黃加茵陳黃柏芩黃有血訓
牡丹狂乱加大黃朴硝衄血加黃連
大柴胡湯治傷寒子餘日不解表裡熱勢更甚
府心下氣鬱微煩或發熱汗出不解心下痞
硬嘔吐不利或陽明病多汗或少陰病不利
清水心下痛如口乾或太陰病腹滿或無表
証証但發熱十八日脈浮而數脈狂脈微是

夫多不曉脉若俱平帶
鈞上不應時血常平秋脉
微毛若無瀉病者應生
可得設去肺部診之瀉
位秋中多結脉嚴良脉
要強沉腎部无邪氣清
忽然弦大多虛堡中涉
水鬼隨人

春弦夏洪秋毛冬石此
乃四時之正脉亦須
診得有胃氣乃出平和
无病之人若但具其臟

而滑數者及兩感諸証可微下蒼二除表
之熱并陽明少陽合病下利日脯發熱
柴胡桂枝湯大黃同上枳實生脉牛夏
引子赤芍藥黃芩各二系
石咬咀水一盞半姜五片枣二枚煎至升分
渣溫服此方治傷寒內熱裡實皆身休重
是表証未解不可服之熱裡腹脹又結胸加
枳實發黃小便自利大便秘結加桃仁當歸杜
枝發黃小便自利加茵陳枝子黃柏
五苓散治傷寒後發渴小便不利
朱苓澤瀉白朮茯苓肉桂
石咬咀白水煎服



脉而無胃氣者死。雖人以
以氣為本。故人絕水
繫則死。脉無胃氣亦死
矣。夫元氣天道也。為諸

脉之父。胃氣地道也。為

諸脉之母。以其營肉水

穀灌漑諸脉。以生榮休

焉。故曰胃為水穀之海。

也。以其播和氣與諸脉

受之。以資生焉。故四時

皆以胃氣為本。假令嚴

冬之時。寒氣凜冽。萬物

黃連解毒湯。治熱毒。煩燥。口
燥。呻吟。喘滿。陽厥。極深。蓄熱。內甚。世
為陰毒者。及汗下吐後。與涼藥。不
熱。熱者。內感。証同治。

川黃連 黃柏 黃芩

石炭。水二盞。煎至一盞。如腹滿。作嘔。或

痢者。每服加生薑三子。厚朴一。或

生薑三片。煎。熱服。名生薑黃連解毒湯。黃連

清心湯

麻黃湯。治傷寒。頭痛。發熱。惡寒。骨節疼痛。身

無汗

麻黃 杏仁 桂枝 甘草

伏藏各歸其根脉當沉

石而反弦大則為陽也

何以言之張長沙云脉

弦而大弦則為臍而寒

大則為花而虛感花相

搏曰草婦人則半產漏

下男子則亡陽失精皆

虛候也

春甲庚辛秋丙丁微毛洪

病相侵

春脉如肝脉也脉當弦

而急而反得沉短而滑

不用水一盞煎至八分温服

藝唯冬及春兼病人素虛寒者乃用

半之後必死黃須加知母牛兩石

黃芩一分

桂枝湯治傷風太陽經受病頭疼身痛

發熱或瀉或惡風

桂枝 炙甘草

赤芍藥

右用水一盞姜五片棗二枚煎至七分温服不

拘時候。惟春初可依此方春末夏至

加黃芩五兩夏至後加石羔二兩知母半兩

升麻五兩若病人素虛寒者不用加麻黃

者肺金邪乘肝也故為白虎湯治傷寒大汗後表証已解戰吐不復邪

肝病是謂賊邪秋脉即天除結結在裡心胸煩渴甚欲飲水

肺脉也脉當浮短而濇石羔甘草知母

而反得浮大而散者是右用水一盞半入粳米三斗餘粒煎至七分

心邪乘肺也故為心病服如煩渴不已者加人參一錢

是謂賊邪廣成先生舉芎藭石羔湯治傷寒已經汗下表裡俱虛

此二者為例則餘可知枯渴心煩燥熱氣逆欲吐及諸虛煩熱並宜

矣春怕庚辛者即春時服之

忌見秋脉也秋怕丙丁人參半夏甘草石羔麥門冬

者即秋時忌見夏脉也石人黃竹葉生薑各五六片煎至一半去滓入

粳米百餘粒再煎至米熟去米溫服不拘時

毛洪敷謂春夏洪脉真氣湯治傷寒數日已後發熱腹疼頭目昏沉

通微歌訣最玄微俗眼庸人難探顯若能精向義中

審察五通神可比

玉函經歌訣廣成先生

本素問難經而作也意

極幽玄非講讀聖經者

不能明也後卒能精心

研窮則玄理自通至妙

至神矣

生死歌訣下

此多是風頭痛積聚你

痛胸膈噴

大便自利小便或利或澀或嘔或咳或已

汗不解仍復發熱心下動悸頭眩身重

後飲水停留中脘所致此藥並皆治之

芍藥 茯苓 白朮 甘草 附子

不用水一盞生薑五片煎至八分不

溫服如咳嗽加五味子細辛于姜不利者

芍藥加于姜小便利者去茯苓嘔者去附子

加生薑

調中湯治秋夏之間暴寒折于脉熱也結于四

肢則壯熱頭疼寒傷于胃則不利或血或水

如脉數者宜此下之

大黃 葛根 黃芩 薑木 白朮 芍藥