

名醫類案 亥

胎毒

胎暈

臍風

腎縮

咯血

熱症

寒症

癖癰潮熱

汗附盜汗

吐瀉

驚搖

驚風

慢驚

腹脹

腹痛

嗽喘嗽痛

赤丹

斑疹

瘰癧

癖積

黃疸

口瘡

噤泥

痘瘡

疹瘡

嗜臥

異症

湯火金瘡

食忌

丹毒中

脾風

疳積

走馬牙疳



名醫類案卷第十二

新都篁南江瓘集一後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇玉橫
仁和沈煥敦曾重校
歙鮑廷博以文

胎毒

東陽陳叔山小男二歲得疾下利常先啼日以羸困問華佗
佗曰其母懷軀陽氣內養乳中虛冷兒得母寒故令不時
愈佗與四物女宛丸十日即除 三國志

東垣云一人中年以來得一子一歲之後身生紅絲癰不救

後四子至一二歲皆病癰而死問何緣致此翌日思之謂

曰汝乃腎中伏火精中多有紅絲以氣相傳故生子有此疾俗名胎瘤是也汝試觀之果如其言遂以滋腎丸數服以瀉腎中火邪補真陰之不足忌酒肉辛熱之物其妻以六味地黃丸養其陰血受胎五月之後以黃芩白朮作散與五六服後生子前症不作

丹溪治一兒二歲滿頭有瘡一日瘡忽自平遂患痰喘詢其母孕時喜食辛辣熱物視其子精神昏倦受病特深知其爲胎毒也解利藥大非所宜遂以人參連翹黃連生甘草陳皮川芎白芍木通濃煎入竹瀝與之數日而安

一婦形瘦性急身本有熱懷妊三月適夏暑口渴思水時發

小熱遂教以四物湯加黃芩、陳皮、生甘草、木通、因懶於煎煮數貼而止。其後生子二歲，瘡痍遍身。忽一日，其瘡頓愈，遂成痲痺。此亦胎毒也。瘡若再作，病必自安，已而果然。若於孕時確守前方，何病之有。

一女得癰，遇陰雨則作，遇驚亦作，口吐涎沫，聲如羊鳴。此胎受驚也。其病深痼，須調半年可安。仍須淡味以助藥力，與燒丹丸繼以四物湯，入黃連，隨時令加減，果半年而愈。

一人連年病瘡，後生一子。三月病左脇下，陽明少陽之間，生一癰，甫平，右腋下相對，又一癰，膿水淋漓，幾死。醫以四物湯敗毒散，數倍加人參，以香附爲佐，犀角爲使，大料乳母。

三月而愈。踰三月，忽腹脹，生赤疹如霞片。取剪刀草汁調原蠶砂敷隨消。又半月，移脹入囊爲腫，黃瑩裂開，二丸顯露水出。以紫蘇葉、盛桴炭末托旬餘而合。

一子年十六，生七箇月，得淋病。五七日必一作，其發則大痛，水道方行，下如漆和粟者，一盞方定。脉之輕則瀝重則弦，視其形瘦而長，青而蒼，意其父必服固下部藥，遺熱在胎。畱於子之命門而然。遂以紫雪和黃栢末丸梧子大，嚙極乾湯下百丸，半日又下二百丸，食壓之。又半日痛大作，連腰腹，水道乃行，下漆和粟者碗許，痛減十之八。後與陳皮一兩、桔梗木通各半兩，又下合許而安。父得燥熱，尚能病。

子況母得之者乎

一小兒胎受熱毒生下兩目不開燈心黃連秦皮木賊棗各五錢水一盞煎澄清頻洗而開

程仁甫治一兒一歲之內大便三四十日只通一次每次通時腹脹盛此乃胎毒熱結所致用元明粉米飲調下一錢三五次之後再不復秘矣

薛己治少叅史南湖孫乙未生丙申正月陰囊赤腫薛作胎毒治之而瘥後患發熱痰盛等症診其母有鬱火血熱用解鬱涼血之藥子母俱服而愈至六月初患吐瀉小便赤澁兩眼睜動投參朮之類不應或以爲慢驚欲用附子之

藥請薛議視其寅卯關脉赤。此風熱傷脾。用柴胡清肝散。加釣鉤藤。木賊草。一劑卽愈。至丁酉正月初旬。頸患熱毒潰而膿出。感風發熱。翌日頭面黯腫如斗大。兩耳厚寸許。此風熱上攻。血得熱而然。急砭兩額出黑血二盞許。次砭面額亦如之。隨用清熱化毒湯。腫黯十退七八。翌日又砭各處血不甚黑。乃止。仍用前藥。去牛蒡子。加熟地黃而愈。此症若砭緩則血凝滯。或爲破傷風。皆致死。

劉欽天之子。腿如霞遊走不定。先以麻油塗患處。砭出惡血。其毒卽散。用九味解毒散一劑而安。

一小兒患之外勢雖輕。內苦便閉。此患在臟也。服大連翹飲。

敷神功散而瘥

胎暈

江篁南治一兒，產數日，常昏暈，一日五六見，醫作驚風治，不效。江以大補氣血之劑，濃煎湯喂之，并飲乳母，多服漸減而愈。

臍風

樞密孫公抃，生子數日，患臍風，已不救。家人乃盛以盤合，將送諸江道。遇老嫗曰：兒可活，卽與俱歸，以艾灸臍下，卽活。

青箱
記

江應宿曰。凡兒臍風。須看牙齦有水泡。點如粟粒。以銀針挑破。出汚血。或黃膿少許而愈。

又一法。以熱水蘸綿子。包指擦之。輕挖破。以金頭蜈蚣炙末敷之。仍以厚衣包裹。納母懷中。取大汗出而愈。再服歸命散解之。

近來江南臍風之症最多。蓋由赤子落臍之時。不慎照顧。風邪流入心脾。五七日而發。面青口撮。吐白沫。倉卒急迫。失救。遂致夭折。急用蒜一兩。搗捏作餅子。納于臍上。以艾火灸五七壯。以拔出風邪。仍用艾茸。或綿子如

錢大一塊貼於臍上外以膏藥封之兼行前二法為妙

必有青筋發在腹有二道生又以艾灸絕截住又頭稍遲則上行攻心而死

撮口臍風方 生川烏尖三個為末全足蜈蚣半條酒浸炙為末加麝香少許吹鼻得嚏乃以薄荷

湯灌一匙

腎縮

思村王氏之子生七日兩腎縮一醫云硫黃茱萸研大蒜塗

其腹仍以茵草蛇牀子薰之愈蓋初受寒氣而然也錄瑣碎

咯血

錢氏治段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫以桔梗湯及防已丸治之不效其涎上攻吐喘不止錢用福銀丸一大服下之復以補肺散治之醫曰今咯血肺虛何以下之曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若使不吐涎爲甚便也蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦使發搐故依法只宜下痰後補脾肺必涎止而吐愈若先補其肺爲逆先下其痰爲順先下後補爲良也

熱症

錢仲陽治朱氏一兒五歲忽發熱醫曰此心熱也腮赤而唇

紅煩燥引飲遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯下之來日
不愈反加無力而不能食又下之便利黃沫錢曰心經虛
而留熱在內必被攻藥下之致此虛勞之病也先用白朮
散生胃中津液後以生犀散治之

宜參連並用

朱曰大便黃沫

如何曰胃氣正則瀉自止此虛熱也朱曰醫用瀉心湯如
何錢曰瀉心湯者黃連一物耳性寒多服則利能寒脾胃
也諸醫皆曰實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五
心煩躁不食而引飲醫曰既虛熱何以大便黃沫錢笑曰
便黃沫者服瀉心湯多也因與胡黃連丸而愈

鄭人齊郎中子忽臍熱自取青金膏三服併一服而餌之至

三更瀉五行其子困睡齊言子睡中多驚又與青金膏一服又利三行加口乾而身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏一服其妻曰用藥十餘行未安恐生他病錢曰已成虛羸先多煎白朮散時時服之後服香薷丸十三日愈

朱氏子五歲夜發熱曉卽如故醫有作傷寒治者有作熱治者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉丸下涎其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之乃取白朮散一兩煎藥汁三升使任意取足服朱曰飲多不作瀉否錢曰無生水不能作瀉縱多不足怪也但不可下耳朱曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神此藥是也至晚服盡錢

視之曰。更可服三升。又煎白朮散三升。服盡得稍愈。至第三日。又服白朮散三升。其子不渴。無涎。又投阿膠散二服。而安。

一兒感冷。身大熱惡寒。此有表症。用發汗藥。汗出遂涼。過一日復熱。醫謂表解裏未解。驗之。服四順飲子。利動藏府。一行遂涼。隔一日。又復熱。醫云。經熱未解。驗之。小便赤。故知心熱未解。服生氣湯遂涼。過二日。又熱。醫云。脉已和。非病也。既發汗。又利大小便。其兒已虛。陽氣無所歸。皆見於表。所以身熱。以和胃氣藥。如六神散之類。加烏梅。煎令微覺有酸味。收歸其陽氣。自此全愈。

此表裏俱虛。氣不歸元。而陽浮于外。所以再發熱。非熱症也。

東都張氏孫。九歲病肺熱。他醫以犀角龍麝生牛黃治之。

月不愈。其症喘嗽悶亂。飲水不止。全不能食。錢用史君子

九益黃散。張曰。本有熱。何以又行溫藥。他醫用涼藥攻之。

一月尚未效。錢曰。涼藥久則胃寒。不能食。小兒虛不能食。

當補脾。候飲食如故。卽瀉肺。經病必愈矣。服補脾藥二日。

其子欲飲食。錢以瀉白散瀉肺。遂愈七分。張曰。何以不虛。

錢曰。先實其脾。然後瀉肺。故不虛也。

程明祐治一兒。病日晡時熱。衆皆以爲陰虛火動。法不治。程

診之曰。兒氣方息。日以生陰。固無緣虛也。火之動。食飲積胃。蘊蒸宿結。則隆隆而熱。遂宣洩輸瀉之。其病忽已。

薛已治李閣老子潮熱。飲食如故。自申酉膀胱時甚。至子丑腎

時方止。遍身似疥。肺主皮毛大便秘結。小便赤澁。熱渴飲冷。薛

以爲脾胃實熱。傳於肺與大腸。先用清涼飲四劑。結熱始退。又用四物柴胡黃連數劑。其瘡漸愈。彼欲速效。另用槐角丸之類。諸症益甚。仍以前藥。更加桃仁赤芍。至百劑而愈。

江篁南治一兒。生方兩月。時值酷暑。又久雨。溼令流行。遍身大熱。然初生小兒。腸胃脆窄。藥難區處。乃取乾壁土。舂碎。

撒地上。上以芭蕉葉鋪之。將兒臥葉上。又以芭蕉覆之。更少如乾壁土干上睡少時。其熱如失。

寒症

東垣治一小兒二歲時初冬患大寒症。明堂青脉額上青黑。腦後青絡高起。舌上白滑。喉鳴而喘。大便微青。耳尖冷。目中常淚下。仍多眵。胸中不利。臥而多驚。無搖則寒。以黃栢。陳皮。葛根。連翹。蠟稍。炙草。已上各一分。升麻。黃芪。柴胡。各二分。歸身。麻黃。各三分。吳萸。生地黃。各五分。名曰補陽湯。咬咀都作一服。水一大盞半。煎至六分。乳食後熱服。服後

