

太陽病脈證

浮音搏

脈音麥

太陽之為病。脈浮。頭項強痛。而惡寒。太陽病發熱。汗出惡寒。風脈緩者。名為中風。太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。逆脈。陰陽俱緊者。名曰傷寒。傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。為

不傳也。頗欲吐。若躁煩。脈數急者。為傳也。傷寒二三日。陽明少陽

證不見者。為不傳也。太陽病發熱而渴。不惡寒者。為溫病。若發

汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫為病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重。多眠

睡。息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視。失溲。若被火者。發

鼾音翰



劇音極痛音閉
瘕音穢癰音縱
記

黃色劇則如驚癇時瘕癰若火熏之一逆尚引日再逆促命
期病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發
于陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七以陰數六故也
病頭痛至七日以上自愈者行其經盡故也若欲作再經者鍼豆
陽明使經不傳則愈太陽病欲解之時從巳至未上風家
表解而不了了者十二日愈病人身大熱反欲得近衣者熱在
皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨
髓也太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出

嗇、惡寒、淅、惡風、翕、發熱、鼻鳴、乾嘔者，桂枝湯主之。

桂枝

三兩

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩切

大棗

十二枚

太陽病，頭痛發熱，汗出惡風者，桂枝湯主之。太陽病，項背強，入反

汗出惡風者，桂枝加葛根湯主之。即前方加葛根

四兩

太陽病，誤下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。若不上衝者，

不可與之。太陽病，三日已發熱，若吐，若下，若溫鍼，仍不解者，此

為壞病。桂枝不中與也。觀其脈證，知犯何逆，隨證治之。桂枝本

為解肌者，其人脈浮緊，發熱汗不出者，不可與也。當須識此，勿令



誤也。若酒客病，不可與桂枝湯。得湯則嘔，以酒客不喜甘故也。

喘家作桂枝湯，加厚朴、杏子佳。凡服桂枝湯吐者，其後必吐膿。

血也。太陽發汗，遂漏不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸。

者，桂枝加附子湯主之。即桂枝原方加附子一枚。太陽病下之。

後脈促，胸滿者，桂枝去芍藥湯主之。若脈微惡寒者，桂枝去芍。

藥方中加附子湯主之。太陽病得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒。

熱多寒少，其人不嘔，圖便欲自可，一日二三度發。脈微緩者為。

欲愈也。脈微而惡寒者，此陰陽俱虛，不可更發汗，更下，更吐也。面色。



反有熱色者未欲解也不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃各半湯

桂枝

二兩十六銖去皮

芍藥

生薑

甘草

炙麻黃

各一兩去節

大棗

四枚

杏仁

二十四枚

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則

愈服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘡日

再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯服桂枝湯大汗出後大

煩渴不解脈洪大者白朮加人參湯主之

知母

六兩

石膏

一斤碎

甘草

二兩

粳米

六合

人參

二兩

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜桂

枝二越婢一湯方即桂枝湯加麻黃石膏

服桂枝湯或下之仍頭項強

痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝桂去加茯苓白朮湯

之即桂枝湯去桂加茯苓白朮

傷寒脈浮自出小便數心煩微惡寒脚攣急

反與桂枝湯以攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾

薑湯與之即甘草炙干姜炮

以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草與之

即芍藥炙甘草

其脚即伸若胃氣不和詁語者少與調胃承氣湯大黃芒硝炙甘草

若重發其汗復加燒鍼者四逆湯主之即甘草炙干姜附子

問曰證象陽旦

按桂枝湯加附子增桂名陽旦云

法治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而譫語師言夜半

手足當溫兩腳當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則為風

大則為虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象桂枝因加附子參其

間增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾陽明內結譫語煩亂

更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當溫脛尚微拘急重與芍藥

甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微瀉則止其詁語故病可愈太陽病項背

強^凡入无汗惡風者葛根湯主之即桂枝湯加葛根麻黃太陽與陽明合病者

必自下利葛根湯主之太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏

湯主之即葛根湯加半夏太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表



未解也。喘而汗出者，葛根黃芩黃連甘草湯主之。太陽病，頭痛發熱，身疼腰痛，骨節疼痛，惡風無汗而喘者，麻黃湯主之。

麻黃

三兩

桂枝

三兩

甘草

一兩

杏仁

七十斤

去皮尖

太陽與陽明合病，喘而胸滿者，不可下，宜麻黃湯主之。太陽病

十日已去，脈浮細而嗜卧者，外已解也。設胸滿脇痛者，與小柴胡湯。

脈但浮者，與麻黃湯。太陽中風，脈浮緊，發熱惡寒，身疼痛，

不汗出而煩躁者，大青龍湯主之。

即前方加姜枣石膏

若脈微弱，汗出

惡風者，不可服。服之則厥逆，筋惕肉瞤，此為逆也。傷寒脈浮

緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之 傷寒表

不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿
或喘者小青龍湯主之

麻黃^{三兩} 芍藥^{二兩} 五味子^{半升} 干姜^{三兩} 甘草^{三兩} 細辛^{三兩} 桂枝^{三兩}
^{去節}

傷寒心下有水氣咳而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解

也小青龍湯主之 太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂

枝湯 太陽下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

太陽病外證未解不可下也下之為逆欲解外者桂枝湯主之



太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗

服藥已微除其人發煩日瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也

麻黃湯主之 太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈 二陽併病

太陽初得病時當發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不

惡寒若太陽病證不罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面

色緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之重之若發汗不徹不足言

陽氣拂鬱不得越。當汗不汗。其人煩躁。不知痛處。乍在腹中。乍在
四肢。按之不可得。其人短氣。但坐以汗出不徹故也。更發汗則愈。
何以知汗出不徹。以脈濇故知也。脈浮數者。法當汗出而愈。若
之身重。心悸者。不可發汗。當自汗出乃解。所以然者。尺中脈微。此裏虛。
須表裏實。津液自和。便自汗出愈。脈浮緊者。法當身疼痛。宜以
汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。何以知之。然以營氣不足。血少故
也。脈浮者。病在表。可發汗。宜麻黃湯。脈浮而數者。可發汗。宜麻
黃湯。病常自汗出者。此為營氣和。營氣和者。外不諧。以衛氣



不共營氣和諧故爾。以營行脈中。衛行脈外。復發其汗。營衛和則

愈。宜桂枝湯。

病人藏無他病。時發熱。自汗出而不愈者。此衛氣

不和也。先其時發汗則愈。宜桂枝湯主之。

傷寒脈浮緊。不發汗

因致衄者。麻黃湯主之。

傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣

湯。其小便清者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。若頭痛者。必衄。宜

桂枝湯。

傷寒發汗解半日許復煩。

脈浮數者。可更發汗。宜桂

枝湯主之。

凡病若發汗。若吐。若下。若亡津液。陰陽自和者。必自

愈。大下之後。復發熱。小便不利者。亡津液故也。勿治之。得小便利。

必自愈。下之後復發汗必振寒。脈微細。所以然者。以內外俱虛故也。下之

後復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無

大熱者。乾薑附子湯主之。發汗後身疼痛。脈沉遲者。桂枝加芍藥生

薑各一兩。人參三兩。新加湯主之。發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無

大熱者。可與麻杏甘石湯主之。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按

者。桂枝甘草湯主之。桂枝四兩 炙甘草二兩發汗後其人臍下悸者。欲作奔豚。苓

桂甘草湯主之。發汗後腹脹滿者。朴薑半甘人參湯主之。傷寒若吐若

下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動。經身為振。搖者。

苓桂朮甘草湯主之 發汗病不解反惡寒虛故也芍藥甘草附子湯主之

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

茯苓二兩 人參二兩 附子一枚 甘草二兩 乾薑半兩

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃

氣和則愈若脈浮小便不利微熱稍渴者與五苓散主之猪苓澤瀉茯苓桂枝白朮

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之 傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴

者茯苓甘草湯主之茯苓桂枝芍藥甘草 中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲



飲水入則吐者名曰水逆。五苓散主之。未持脈時病人叉手自冒心。

師因教令欬而不欬者此必兩耳聾無聞也。所以然者以重發汗虛故也。

此發汗後飲水多必喘。水灌之亦喘。發汗後水藥不得入口為禁。

若更發汗必吐下不止。發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆。

顛倒心中懊懣。梔子豉湯主之。若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。

梔子生薑豉湯主之。發汗若下之而煩熱胃中窒者梔子豉湯主之傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛未欲

解。梔子豉湯主之。傷寒下後心煩腹滿。卧起不安者。梔子厚朴湯。

主。梔子厚朴傷寒醫以丸散下之身熱不去微煩者。梔子乾薑



湯主之。凡用梔子湯。病人舊微瀉者。不可與服之。太陽發汗。出

不鮮。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。真武湯主之。

茯苓 三兩 芍藥 三兩 生薑 三兩 白朮 二兩 附子 一枚

咽喉乾燥者。不可發汗。淋家。不可發汗。必便血。瘡家。雖身疼痛。不

可汗。發汗則瘡。衄家。不可發汗。出必額上陷。脈緊急。直視。不能胸。不得

眠。亡血家。不可發汗。發汗則寒慄而振。汗家。重發汗。必恍惚心亂。小便已

陰疼。與禹餘糧丸。方用禹餘糧赤石脂生梓皮各三兩赤小豆半升蜜為丸病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐衄。

本發汗。而復下之。此為逆也。若先發汗。治不為逆。本先下之。而反汗之。為逆。

若先下之治不為逆。傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急

當救裏。後身疼痛清便自調者急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂

枝湯。太陽病發熱頭痛脈反沉若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯。

傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利小腹

滿或喘者小青龍湯主之。太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱

虛其人因致胃家汗出自愈所以然者汗出表和故也。得裏未和然後復

下之。太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解。但陽脈微者先汗出

而解。但陰脈微者下之而解。若欲下之宜調胃承氣湯主之。太陽病發

