

乳癰乳巖 五十一婦人門亦有乳證當互察之

立齋曰乳房屬足陽明胃經乳頭屬足厥陰肝經男子房勞恚怒傷於肝腎婦人胎產憂鬱損于肝脾皆能致之○若因暴怒或兒口氣所吹腫痛者宜疎肝行氣○焮痛發寒熱者發散表邪○焮腫痛甚者清肝消毒並宜隔蒜灸○未成膿者疎肝行氣○不作膿或不潰者托裏爲主○潰而不斂或膿清者宜大補脾胃氣血爲主

又治法曰若膿出反痛或作寒熱氣血虛也十全大補湯○體倦口乾中氣虛也補中益氣湯○晡熱內熱陰血虛也八

珍湯加五味子○欲嘔作嘔胃氣虛也補胃爲主或用香砂
六君子湯○食少作嘔胃氣虛寒也前湯加乾薑○食少泄
瀉脾氣虛寒也理中湯或加人參附子○若勞碌以致腫痛
氣血未復也八珍湯倍用參芪歸朮○若因怒氣以致腫痛
肝火傷血也八珍湯加柴胡山梔○若肝火血虛而結核不
消者四物湯加柴胡升麻○若肝脾氣血俱虛而結核者四
君子加芎歸柴胡升麻○鬱結傷脾而結核者歸脾湯兼神
效瓜蒌散○若爲兒所吹而發腫焮痛須吮通揉散否則成
癰矣若兼餘證亦當治以前法○若婦人鬱怒傷肝脾而結

核不痒不痛一二載始潰者名曰乳巖最難治療

又治法曰若忿怒傷肝厚味積熱以致氣不行竅不通乳不出則結而爲腫爲痛此陽明之血熱甚則肉腐爲膿若膿一成卽針出之以免遍潰諸囊之患○亦有所乳之子膈有滯痰口氣熾熱含乳而睡熱氣所吹遂成腫痛於初起時須吮啞使通或忍痛揉散之失治必成癰患宜用青皮以踈厥陰之滯石膏以清陽明之熱甘草節以行污濁之血瓜蒌子以消腫導毒或加沒藥橘葉皂角針金銀花當歸更宜隨證消息加減而治仍用少酒佐之更用隔蒜灸之其效尤捷若有

膿卽針之否則通潰難於收斂

乳癰用蒲公英忍冬藤入少酒煎服卽欲睡是其功也及覺而

病安矣 見外科心法

一婦人患乳癰寒熱頭痛與荆防敗毒散一劑更與蒲公英一握搗爛入酒二三盞再搗取汁熱服粗熱菴患處而消丹溪

云此草散熱毒消腫核又散滯氣解金石毒之聖藥○一婦人左乳內腫如桃不痛色不變發熱漸消瘦以八珍湯加香

附遠志青皮柴胡白餘劑又間服神效瓜蒌散三十餘劑膿潰而愈常見患者責效太速或不解七情及藥不分經絡虛

實者俱難治大抵此證四十以外者尤難治蓋因陰血日虛也○一婦人因怒左乳內腫痛發熱表取太過致熱益甚以益氣養營湯數劑熱止膿成欲用針彼不從遂腫脹大熱發渴始針之膿大泄仍以前湯月餘始愈○一男子左乳腫硬痛甚以仙方活命飲二劑而痛止更以十宣散加青皮四劑膿成針之而愈此證若膿成未被瘡頭有薄皮剝起者用代針之劑點起皮處以膏藥貼之膿亦自出但不若及時針之則不致大潰如膿出不利更經入搜膿化毒之藥若膿血未盡輒用生肌之劑反助邪氣縱早合必再發不可不慎也○

一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴狀類傷寒以玉露散補之而愈夫乳汁乃氣血所化在上爲乳在下爲經若衝任之脈盛脾胃之氣壯則乳汁多而濃衰則少而淡所乳之子亦弱而多病此自然之理亦有屢產有乳再產却無或大便澁滯乃亡津液也三因論云產婦乳脈不行有二有血氣盛閉而不行者有血氣弱澁而不行者虛當補之盛當疎之盛者當用通草漏蘆土瓜根輩虛者當用煉成鍾乳粉猪蹄鯽魚之屬槩可見矣

俱薛按

一婦人久鬱右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不甘此

乳巖也乃七情所傷肝經血氣枯槁之證宜補氣血解鬱結
藥治之遂以益氣養營湯百餘劑血氣漸復更以木香餅灸
之喜其謹疾年餘而消若用尅伐之劑以復傷血氣則一無
可保者○一妾乃放出宮人乳內結一核如粟欲用前湯彼
不信乃服瘡科流氣飲及敗毒散三年後大如覆碗堅破如
石出水不潰而歿○大抵鬱悶則脾氣阻肝氣逆遂成隱核
不痛不痒人多忽之最難治療若一有此宜戒七情遠厚味
解鬱結更以養血氣之藥治之庶可保全否則不治亦有數
載方潰而陷下者皆曰乳巖蓋其形似巖穴而最毒也慎之

則可保十中之一二 薛按

胃脘癰 五十二

立齋引聖濟總錄云胃脘癰由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆於胃故胃脉沉細以陽氣不得上升故人迎熱甚令人寒熱如瘧身皮甲錯或欬嗽或嘔膿唾血若脉見洪數膿已成也急宜排之設脉遲緊其膿未就有瘀血也急下之否則邪毒內攻腐爛腸胃矣丹溪云內疽者因飲食之毒七情之火相鬱而發用射干湯主之愚常以薏苡仁湯牡丹皮散太乙膏選用之亦效若吐膿血飲食少思宜助

胃壯氣爲主而佐以前法不可專治其瘡

腹癰 五十三

立齋曰腹癰謂瘡生於肚腹或生於皮裏膜外屬膏梁厚味七情鬱火所致○若漫腫堅硬肉色不變或脉遲緊未成膿也四君加芎歸白芷枳殼或托裏散○腫軟色赤或脉洪數已成膿也托裏消毒散○膿成而不外潰者氣血虛也臥針而刺之○焮腫作痛者邪氣實也先用仙方活命飲隔蒜灸以殺其毒後用托裏以補其氣○若初起欲其內消當助胃壯氣使根本堅固而以行經活血之藥佐之若用尅代之劑欲

其消散則腫者不能潰潰者不能斂若用疎利之藥下其膿血則少壯者多爲難治老弱者立見危亡若有食積疝氣類此者當辨而治之

進士邊雲莊腹痛惡寒脉浮數余曰浮數之脉而反惡寒瘡疔之證也不信數日後復請視之左尺洪數余曰內有膿矣仍不信至小腹痛脹連及兩臀始悟余曰膿潰臀矣氣血俱虛何以收斂急服活命飲一鍾臀潰一孔出膿斗許氣息奄奄用大補藥一劑神思方醒每去後糞從瘡出痛不可當小腹間如有物上挺卽發瘡不省人事煩躁脉大舉按皆實省而

細察之脉雖洪大按之如無以十全大補倍加參芪至四斤
更加附子二枚煎膏服之而瘥止又用十全大補湯五十餘
劑而瘡斂○上舍周一元患腹癰三月不愈膿水清稀朝寒
暮熱服四物黃栢知母之類食少作瀉痰涎上湧服二陳枳
實之類痰涎愈甚胸膈痞悶謂余曰何也余曰朝寒暮熱血
氣虛也食少作瀉脾腎虛也痰湧胸痞脾肺虛也悉因真氣
虛而邪氣實也當先壯其胃氣使諸臟有所稟而邪自退矣
遂用六君加黃芪當歸數劑諸證漸退又用十全大補湯肌
肉漸斂更用補中益氣湯調理而愈

薛按

腸癰 五十四

孫真人云腸癰爲病小腹重強按之則痛小便如淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫甚者腹脹大轉側有水聲或繞臍生瘡或膿從臍出或大便膿血脈洪數者已有膿也血下則安若妄治者必殺人

陳無擇曰腸癰爲病身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無聚積身無熱脈數此爲腸內有膿久積陰冷所成也故金匱有用附子溫之其脈遲緊者膿未成可下之當有血洪數者膿已

成不可下此以內結熱所成也故金匱有用大黃利之

千金方灸法曲兩肘正肘頭銳骨灸百壯下膿血而安

立齋曰此證因七情飲食所致○治法脉遲緊者未有膿也宜
牡丹皮湯下之○脉洪數者已有膿也用薏苡仁湯排之○
小腹疼痛小便不利膿壅滯也用牡丹皮散主之○若臍間
出膿者不治經云腸癰爲病不可驚驚則腸斷而死故患是
者其坐臥轉側極宜徐緩時少飲薄粥及服八珍湯固其元
氣靜養調理庶可保全其生

一男子裹急後重下膿脹痛此脾氣下陷也用排膿散蠟礬丸
而愈後因勞役寒熱體倦用補中益氣湯而安○一婦人膿

成腹脹痛小便不利脉滑數此膿毒內潰也服太乙膏丸三錢膿下升許脹痛頓退更以神效瓜蒌散二劑而全退又以蠟磬丸及托裏藥十餘劑而安○一產婦小腹疼痛小便不利以薏苡仁湯二劑痛止更以四物湯加桃仁紅花下瘀血并許而愈○一婦人產後惡露不盡小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化爲膿最難治療若使流注骨節則患骨疽失治多爲敗證

薛按

附骨疽

五十五

附骨疽一證近俗呼爲貼骨癰凡疽毒最深而結聚於骨際者

皆可謂之附骨疽然尤惟兩股間肉厚處乃多此證蓋此證之因有勞傷筋骨而殘損其脉者有恃酒力房而困爍其陰者有憂思鬱怒而留結其氣者有風邪寒濕而湊滯其經者凡人於環跳穴處無故酸痛久而不愈者便是此證之兆速當因證調治不可遲也蓋其初起不過少陽經一點逆滯逆而不散則以漸而壅塞則腫腫則潰至其延漫則三陰三陽無不連及而全腿俱潰然此證無非元氣大虧不能運行故致留滯不散而後至決裂誠危證也若潰後脉和雖見困弱之甚只以大補氣血爲主皆可保全若潰後脉反洪芤而煩

躁不寧發熱口渴則必不可治○至若治此之法凡以勞傷筋骨而致者宜大營煎兼大防風湯治之○若酒色傷陰者宜八味丸六味丸或右歸丸兼大防風湯主之○若憂思鬱怒結氣者宜瘡科流氣飲或五香連翹湯兼大防風湯主之○若風寒外襲者宜五積散兼大防風湯主之○大抵此證初起卽宜用大營煎溫補氣血或兼仙方活命飲通行毒氣有火者宜速用連翹歸尾煎以解散其毒仍宜速用隔蒜灸或立鼓餅尋頭灸之以速散其毒最爲捷法其有濕熱痰飲等證當並求後法以治之庶免大害也○若環跳久痛不已

或見臀股微腫度其已成勢不能散只宜速用托補專固根
本使其速起速潰則根本既實雖肉亦無大害必且易潰易
斂而易愈也若脉見滑數按之軟熟膿已成也速宜針之無
使久留以防深蝕之患其有不明利害苟圖目前或用剋伐
消散再傷元氣或用寒涼敷藥以遏其毒氣必致日延日甚
而元氣日敗則一潰不可收拾矣考諸方書俱未詳及此證
故悉其所因并附治按於後

止齋曰附骨疽有因露臥風寒深襲於骨者有因形氣損傷不
能起發者有因剋伐之劑虧損元氣不能發出者有因外敷