

包教曉信箱

醫術解答專輯



包教曉信箱

——醫藥解答專輯

目錄

前言	一
第一章 傳染病	三
第二章 消化系統疾病	二九
第三章 呼吸系統疾病	四七
第四章 心臟血管系統疾病	五五
第五章 血液系統疾病	六七
第六章 運動系統疾病	七五
第七章 神經系統病及精神病	八三
第八章 泌尿生殖系疾病	一〇九
第九章 婦科疾病	一三三
第一〇章 妊娠期疾病	一五九
第十一章 產科疾病	一六七
第十二章 生育・節育・絕育	一七三

第三章	肛門直腸疾病·····	一九三
第四章	內分泌和代謝疾病·····	一九九
第五章	五官科疾病·····	二〇九
第六章	寄生蟲病·····	二三三
第七章	皮膚科疾病·····	二三九
第八章	膠原性疾病·····	二六三
第九章	胸部・疝氣・四肢疾病·····	二六七
第二〇章	毛髮・出汗・高矮肥瘦·····	二八一
第二一章	針灸・跌打損傷・急救·····	二九三
第二二章	物理的原因疾病·····	三〇九
第二三章	腫瘤病·····	三一三

前言

「包教曉信箱」和明報讀者精神上交通已有十多年，它是集各家智慧，竭盡所知為讀者忠誠服務。辦得雖然不大够理想，很多地方仍然有待改進，但差幸已和讀者打成一片。筆者曾經先後接過幾次來信，信封上僅寫着「香港·包教曉信箱收」，郵差先生也能將它送到明報來，可知這一欄小框框的作品，事實上已深入人心。很多讀者都將它喻作百科全書，有些讀者還將刊出的藥方剪存，對於讀者的錯愛，實在使我汗顏無已！

「包教曉信箱」同類作品，一般稱為「百科全書派」，這一類文章在我國最早見於上海申報。在本世紀初期，申報的副刊「自由談」，由天虛我生（陳栩園）主編，曾闢了「家庭百科常識」一欄，也就等於今日港報的社會服務欄。直到陳家父子以蝴蝶牌牙粉成為民族工業家，離開了申報，「自由談」才由周瘦鵑而黎烈文，才成為新文藝的園地。

明報今次徇應讀者要求，出版「包教曉信箱」專集，現在先刊行醫藥解答專輯，主要是為了讀者提出此項問題比較多，需求也比較殷切。事實上，此地人口擠迫，醫療衛生服務長久以來成為一項嚴重問題，醫院和醫生都遠不敷需要，一般市民生活繁忙，有了病痛，常為要去輪診而加深痛苦。而醫生們也因業務繁忙，且很多診所內沒有確診設備，因此也每未能詳細給病者解釋病情病理，加上江湖醫者充斥，不少人破了財又加深了病，很多報章闢有醫藥解答專欄，無疑是為適應此類讀者需求而

設辦。但香港並不像國內一樣，提倡中西醫結合，相反的，是中西醫學如楚河漢界完全分隔，有時更互相批評及攻擊。因此若干此類醫藥解答專欄，不免存有一種偏見。本欄則自始至終採取客觀的態度，不會揚中抑西，也不會揚西抑中。那種病適宜中藥或針灸治療，那種病適宜西法治療，筆者都作出了詳細分析，只求對病者有實效，從來不存有偏見，這一點也是本欄的特色。

筆者曾在電台擔任過短期客串，為聽眾解答醫藥問題。但筆者總覺得，天空的播音，在介紹藥物時總不如白紙黑字的容易使讀者易於領畧，藥方也可以留存。因為播出藥名時很多人都來不及執筆記錄，時間稍縱即逝，聽不清楚的大都有茫然之感。而且一音之訛，差之毫釐，謬以千里，在實用效果上當然遠不及書刊報章。本欄由於篇幅有限，讀者來信山積，囿於條件，未能逐一作答，對於這一點，筆者常常感到歉咎。單行本的刊行，內容經過篩選，去蕪存菁，分門別類，若干部分還作了一些補充。此書放置案頭，可作家庭醫藥顧問，諒能幫助讀者解決一些問題。

書內選列各方，都是經過多次實驗證明有效的方藥，適宜讀者們作普通常見疾病參考之用。但這些方劑，仍須遵守中醫「隨症施治」的原則，方能充分發揮方劑的獨特性能。在適應症的情況下，讀者是可以照方試用。但所介紹的是一病一方或一症一方，因而，不能以一方而適應一種病症整個過程中的各個階段和各種變化。如果遇着病情比較複雜的場合，最好通過醫生指導，較為安全。同時，還希望將試用經過，療效如何，隨時來信告知，以便通過更多病例，進一步總結經驗，肯定效率，作為再版時改進、補充的依據。

謝永光 一九七八年九月五日

第一章 傳染病

流行性感冒

【答鄧淑芳女士】治流行性感冒可用下方：金銀花三錢、桑葉三錢、牛蒡子三錢、荊芥錢半、連翹三錢、薄荷八分（後下）、杭菊二錢、桔梗一錢、北杏仁二錢、枇杷葉三錢、蘆根三錢、淡竹葉二錢、甘草八分，水三碗煎成一碗服。加減法：熱甚口苦者，加黃岑三錢或山梔三錢；骨痛甚者，加葛根五錢、桑枝四錢；不惡寒出汗者，去荊芥、薄荷；無咳者，去北杏仁、枇杷葉。西藥療法一般採用對症治療，如止痛退熱用 A P C，鎮咳用 Hustosil 藥片等等，亦有用抗菌素如金黴素（Aureomycin）等，此藥對流感的病毒本身雖無抑制作用，但對因感冒而引起的諸如呼吸道感染等都是很有效果。而且因其抗菌範圍廣泛，故對於預防因感冒而引起的各種併發症如肺炎等，都能達到目的。但這種藥物服後有口炎、腹瀉、眩暈等副作用，應在醫生指導下服用。

【答何立鈞先生】中醫治療流行性感冒，有很多有效方劑，「桑菊飲」和「銀翹散」，都是有名的方藥。兩者合用，加葛根、陳皮、川樸，功效尤著。大陸出品之「銀翹片」，即根據「銀翹散」原方製成，此方出自「溫病條辨」，由銀花一兩、連翹一兩、桔梗六錢、薄荷六錢、竹葉四錢、生

甘草五錢、荊芥穗四錢、淡豆豉五錢、牛蒡子六錢等藥味組成。本方對治療流行性感冒之頭眩咳嗽、咽喉疼痛，有卓效，但解熱之力不彰。數年前流感在本港大流行，伴有高熱的病人多名服過上述藥片不效，我建議他仍續服用這種藥片，另用生石膏、鮮蘆根兩味煎水送服，果然藥到病除（按：上述兩味均屬強有力之退熱藥）。對於治療流感，單味黃皮樹葉亦可奏效，其法是用陰乾黃皮樹葉三錢，兩碗水煎成一碗，一次服。

【答黎悅容女士】維他命C不僅可預防感冒，而且可以配合其他藥物用於治療感冒及流行性感冒，不過使用的份量一定要重，每次大約服1,000mg（每片100mg，連服十片），每日約服三次，效果相當好。如配合「精製銀翹片」同服，收效尤速。

香港型流行性感冒

【答徐祖輝先生】流行性感冒的病原是一種濾過性病毒，這種病毒的內層是一種「核酸」組織，它的外壳是一層蛋白質，在蛋白質的上面長了很多「鬚鬚」，這些「鬚鬚」是由脂肪蛋白形成。醫學家把流行性感冒病毒，分成A、A1、A2、B、C，再加上最近新出現的A3等型體。醫學家分離病毒型體的依據，就是以它們的「鬚鬚」長短作參考。病毒的型體雖被分成很多種，但是外型却大致相像，它們都是橢圓型，活動能力也不相上下。病毒隨着空氣傳染，進入人體的呼吸系統後，開始活躍，它鑽進任何一個細胞體內，繼續生長。流行性感冒的病毒，對某一個地區的傳染作用，幾乎都是一定的週期性，也就是說，流行性感冒的病毒在離開一個地區之後，等它下次再來侵襲時，中間已經

相隔了很多年。令醫學界人士納悶的是，在這一段很長的時日裏，這些小晶體究竟跑到那裏去了？醫學界一直在追蹤這些小晶體，可是它們太微小，捉摸不定，所以時至今日，還沒有人發現在週期間歇中，病毒的去向究竟是何方？由於不能摸清楚病毒的來去蹤跡，所以預防流行性感胃的疫苗，也就不易事先準備。如果等它快要入境的時候，再着手趕製疫苗，時間上將受到很大障礙。日本細菌學家福見秀雄已從香港流行性感胃的病患檢驗中，判斷此種病毒是「A3型」（又稱香港型）。在以往被醫學界公認的病毒體，沒有A3，日本的醫學專家把這種病毒取名為A3的理由，就是因為它的「孺子」和以往那時五種不同。A3型流感和前此的流感相比，其症狀並不覺得特別嚴重。人受感染後，首先是發冷、頭痛、發燒，熱度在卅九——四十度。但是抗生物質並不見效，只有解熱劑有效，平常身體健康的人，對流感不必太害怕。只是老人和兒童，在熱度開始下退時須要注意肺炎併發症，在這個時候可使用抗生物質。比老人、兒童更需要注意的，是平時身體虛弱有老毛病的人。例如重症的肺結核病人，心臟病、腎病和糖尿病人，感染上流行性感胃後，死亡率比較高。

豬型流行性感胃

【答朱兆華先生】豬型流行性感胃的病原體是種濾過性病毒，由於這種病通常在豬隻中傳染，因此稱它為豬型流行性感胃。這種病的傳染，來自豬身上的肺蟲，肺蟲產卵後，便由咳嗽、打噴嚏，非常快速而普遍的，將卵自空氣中傳染給其他的豬隻。當然，糞便也會傳染。這種豬型流行性感胃，除了豬而外，馬、老鼠和鳥類也會傳染，不過牠們的傳染率不很普遍。豬隻肺部肺蟲所產生的卵，經普

遍傳染後，由於每隻染患病毒的豬，在此期間都會咳嗽和打噴嚏，於是，凡有豬的地方便有肺蟲卵的存在。

豬型流感又稱西班牙型流感，一九一八年首次在西班牙大流行，到今年正好是六十年，其間流行性感冒有過五次大流行的紀錄，正好每十年（或十年的一倍）流行一次。流行性感冒為什麼每十年流行一次？原因是因為流感病毒經過一再傳染，其毒力越來越強。而人體經病原菌傳染後，抵抗病毒的抗體也越來越強，兩者相鬥的結果，病毒失敗投降，結束了流行。然而，這些濾過性病毒為求生存，其抗原分子自然要求變化，才能擊敗敵人——人體的抗體。而這種「蛻變」，幾乎要十年時間，始可完成其「重整軍威」的歷程。流感濾過性病毒，有兩種抗原體：一為凝血抗原（H），一為神經醇抗原（N）。一九一八年首次豬型流感，與第二次一九二七年的A O型流感，它的神經醇是相同的，其所區別的，是凝血抗原的分子排列稍有差異。一九五七年的A₂型，與一九六八年的香港型A₃流感，簡直等於學生兄弟一般，毫無差別。事實上，豬型流感是五種流感中最輕的一種，豬被傳染後，死亡率為百分之四。假如豬隻本身具有寄生蟲時，其死亡率即可增至百分之五十六。人傳染豬型流感後，三至四天便可自動痊癒，不過，如患有下列各種疾病時，情況就會完全兩樣：①呼吸系病者：會借重外來的細菌，造成次原發性肺炎，引起嗜血性感冒桿菌、葡萄球菌和肺炎菌等併發症，因而導致死亡。②循環系病者：如果患者是小孩或老人，會造成心肌炎、心內膜炎、心包膜炎等併發症，無藥可治，於極短時間內死亡。③神經性系疾病者：會造成出血性腦炎、毒性腦炎等併發症，很快便會死亡。

易患傷風

【答葉芳女士】你說對於預防傷風，常用雲苓、淮山煎水當茶飲，頗有佳效。來信說令郎夏天常飲用此方，即使染上傷風也不會發高燒。到了冬天則用太子參保瘦肉或炖瘦羊肉，平常冲涼時放點驅風油在熱水中，如果遇上患染傷風時則多放幾滴，此外平時還要注意使孩子們多從事運動，多鍛煉體魄。來信向大家介紹你的經驗，這種做法無疑很好，在此特向你致以衷心的感謝。事實上，一個人如患易染傷風，主要是由於身體抵抗力弱，單靠補充營養及服食藥物，不及藉着多運動來鍛煉體魄那麼易於收效。體力強健，對疾病的抵抗力從而增強，傷風自然會大大減少。其次睡眠充足和有足夠的陽光也很重要。食療方面，冬天吃羊肉最佳，可配合太子參或北芪煲湯，功效最宏。淮山和雲茯苓、白朮等都是固脾妙藥，中藥配製的「肥兒丸」不能缺少上述幾味，能够加入白朮一味，功效當會更好，不過淮山一定要用正貨，目前市面假淮山藥充斥，如果誤用了它，功效將會大打折扣。

【答梁根先生】你易患傷風，常流鼻涕已達廿年之久，可試用下方：藿香葉生晒研末，用豬胆汁和水泛丸。每日服二錢，開水送下。易患傷風，是體質虛弱之故，平日應多作體育鍛煉，每日服魚肝油丸，維他命C，每天服200mg（每片含量50mg者服四片，分三、四次服），以增強抵抗力。如果頻頻感染傷風時，除了吃維他命C片外，另服食一些組織胺的藥物例如Piriton，每日臨睡前服一片，亦有預防傷風的功效。

傳染性肝炎

【答求助人先生】肝炎一般是指傳染性肝炎而言，患了肝炎的人主要症狀是全身無力、胃口不好、厭油食、噁心、嘔吐、腹脹，右上腹（肝區）隱痛，有些病人可以有發熱，全身黃疸，小便濃茶色，或有皮膚瘙癢等。本病是由傳染性肝炎病毒引起的急性消化道傳染病，通過消化道（日常生活接觸、食物、水被污染）或由注射接種（如使用被病毒污染的注射器、針頭，以及輸入含病毒的血漿及全血）的途徑而傳染，主要病變為瀰漫性肝細胞損害。來信說你有位親戚在鄉間患上慢性肝炎，這種病一般症狀持續，勞動力下降，肝臟腫痛及硬度增加，同時出現進行性肝脾腫大、肝功能持續損害。常出現面部色素沉着，毛細管擴張及肝掌等，此型經治療後大部分可以好轉，部分可以發展成為肝硬化（肝硬化多會有腹脹、腹水、雙下肢浮腫，右上腹痛等症狀）。

治療傳染性肝炎，一般可服用Lirion藥丸，注射A.T.P.或Polielinal等。A.T.P.即三磷酸腺苷，是一種輔酶（亦稱生理活性維他命），此類藥物的主要作用是護肝，有一定療效。中藥治療可選下方：土茵陳一兩、鵝骨草一兩、山梔子三錢、飛滑石四錢、黃柏四錢、藿香三錢、木通四錢、晚蠶沙四錢、黃芩四錢，清水三碗煎成大半碗，分二次服。若肝腫大作痛、嘔吐、食慾缺乏，則調理胃腸之芳香劑如厚樸、枳實、半夏、鬱金、陳皮、薑黃等都可酌量加入。若發熱者則柴胡、黃芩不可少。茵陳蒿為中醫治黃疸專藥，促進胆汁分泌之力甚大，並能利尿以排除主入血中之胆汁。山梔子、黃芩、黃柏則屬消炎劑，木通、飛滑石則為利尿劑，目的在排除已入血中之胆汁。晚蠶沙、藿香

有調理腸胃作用。

【答李崇基先生】營養與休息爲治療肝炎基本原則，病人平時應注意生活及飲食，不要過勞，不宜飲酒，忌吃含有脂肪性的食物。大小便須嚴格消毒，以免傳染他人。飲食方面，盡可能進食營養豐富的食品，維他命B、維他命C、葡萄糖都可服用，亦可服用下列藥品營養肝臟：① Lipochol (Takeda) ② Proheparum (Nordmark)。你如果要寄藥物，可寄兩者中任何一種。同時可併寄大陸出品中藥成藥「利肝片」、「鷄骨草丸」等。（體虛另加黃芪三錢、黨參三錢煎湯送服）。

【答徬徨的媽媽女士】你女兒患的是無黃疸型傳染性肝炎，和黃疸型肝炎比較，本病的症狀有許多不同之處。其特點是病情較輕，缺少自覺症狀，多數病例在普查時發現。按照你女兒目前的病情，可試服下方：綿茵陳五錢、當歸一錢半、地黃四錢、柴胡二錢、甘草七分、白芍三錢、大黃一錢、香附三錢、水煎服，每日一劑。此方適用於急性黃疸型肝炎、無黃疸或遷延型肝炎，慢性肝炎亦有一定療效。（以上是小兒用量，成人可加倍）。

【答余妙儀小姐】肝炎初期症候與一般腸胃炎混淆不清，食慾不振、嘔吐、上腹不適，同時間或有急性腹痛的發生，想確定是否肝炎，應作肝功能檢查，化驗一下轉氨酶，便可獲得結論。血清中轉氨酶在臨床診斷上價值較大者有二種：一爲谷氨酸——草酰乙酸轉氨基，（簡稱谷——轉氨酶，S.G.O.T.），另一種爲谷氨酸——丙酮酸轉氨基酶（簡稱谷——丙轉氨酶，S.G.P.T.）。前者主要存在於肝臟、心肌、骨骼、腦和腎臟等組織中，各種的原因引起上述組織的炎症或其他的病變，均可使細胞內的該種酶釋放於血液中，而使血清中轉氨酶增加。故此如果檢驗的結果是增高的話，亦

不能主觀地認為就是「傳染性肝炎」，必須結合臨床症狀，以及其他的肝功能檢驗結果，全面分析才能下結論。

流行性肝炎驗方

【答馬劍梅小姐】最近此間若干報章發表廣州「紅醫崗」向羣衆介紹一批民間治理流行性肝炎驗方，現刊錄如後：

(一)夏枯草、蒲公英、茵陳各四錢、甘草二錢。(二)田基黃五錢、夏枯草二錢、甘草五分。(三)夏枯草五錢、板藍根一兩、布渣葉五錢。(四)鮮垂絲柳枝葉五錢至二兩(乾藥減半)。(五)金錢草六錢、茵陳一兩、紅糖適量。以上各方，每日服一次，連服五至七天，小兒劑量減半。

流行性肝炎分黃疸型及無黃疸型兩種。如患黃疸性肝炎，一般的特徵有眼黃、身黃、小便黃、大便呈灰白色、脅痛及口苦。可服下方：田基黃六錢、山梔子錢半、夏枯草五錢、鬱金三錢、綿茵陳一兩、甘草八分、澤瀉四錢。以上各方，主要藥物是夏枯草、田基黃、茵陳、板藍根。茵陳蒿是中醫治黃疸的主藥，其餘如田基黃、板藍根等也是治肝炎妙藥。各方藥效差不多，而且多屬平賤之品，藥價不會太貴，適合一般人採用。肝區疼痛可加鬱金三錢，熱不退加黃芩三錢、柴胡二錢，亦可配合成藥「肝炎寧」服用，功效更佳。

流行性腮腺炎

【答陳慧蓮女士】流行性腮腺炎俗稱「疳腮」，本病為濾過性病毒，經飛沫或直接傳染所致。多

發於春秋二季，常侵襲五至十五歲的兒童。兩歲以下甚少罹染此病。發病後一般有高熱，伴有惡心嘔吐，食慾不振，最主要的特徵是耳下部腫大、疼痛、吞嚥和嚼嚼時更明顯，有時頰下腺和舌下腺也腫痛，口腔痰較多，在上牙第二臼齒處的近腮開口處呈現炎症充血。這種病通常經過兩星期左右可好轉，但有時可併發睪丸炎、腦膜炎，雖然不多見，但危害性却很大，所以必須及早治療。

治療本病中藥的效果較佳，可服下方：金銀花八錢、蒲公英三錢、玄參二錢、夏枯草三錢、連翹三錢、柴胡二錢、酒黃芩二錢、炒僵蠶二錢、牛蒡子三錢、苦桔梗二錢、浙貝母二錢、天花粉二錢、生甘草一錢，水三碗煎成一碗，一日分三次服。加減法：頭痛無汗惡寒者，加荆芥二錢、白芷二錢，壯熱神昏譫語者，加生石膏末各五錢、知母二錢。咳嗽喉痛者，加冬桑葉、白茅根各二錢。大便秘結者，加川軍二錢、川樸二錢、炒枳實二錢。脾虛便溏者，減牛蒡子、玄參。加粳粉葛、雲茯苓、焦蒼朮各二錢。小便赤澀者，加車前草三錢、飛滑石二錢。此方效果卓越，一般服藥一、二劑即行退熱，三劑即可腫消痛止。治療本病與其他傳染病一樣，除服用藥物外，應囑病人臥床休息，多飲開水，忌食酸性及刺激性食物。再加局部熱敷，可以減輕疼痛和消腫。或用鮮蒲公英搗爛為泥貼敷腫處，其效更佳。病童罹染本病時，應使與其他兒童隔離，不與病兒接觸，直至病愈為止。本病預防方法，預防注射已開始使用，可增強免疫力，有效期二年，只可惜尚未普遍。中藥預防，以板藍根為主藥，每次可用一兩煎水服，可增強抵抗力。亦可配合金銀花三錢、蒲公英一兩同煎，功效更宏。

麻疹

【答明月先生】小兒麻疹照中醫辨證療法，可分為三期，第一期注重解表透發，第二期着重涼血

清熱，第三期着重溫補。如果錯斷病情，妄投藥物，將會貽誤病機。無論經由中西醫治療，病兒痊癒後必須注意補養。因病兒患染此症，在與疾病搏鬥過程中虛耗體力甚大，培植方法是多予營養，比方鷄汁、牛肉汁、九種維他命丸、胎盤精衣片等等均可。身體內對病菌抵抗時有時也會呈現發燒現象，孩子發熱不可妄投藥物，最好帶他往看醫生。

【答邵霞女士】你今年卅五歲，已有兒女各一名，但自出生後到今天為止還未出過麻疹，曾聽人說過，每個人一生一定要出麻疹一次，年紀老了也會發病，你因此常常耿耿於懷。其實麻疹沒有什麼潛伏禍害，中年後出麻雖會較為嚴重，但並不危險。醫理方法是照普通治療小兒患染的同樣方式處理，當然可以注射預防針，像你這樣年紀還未出過麻的人，在世界上實在多得很。

德國麻疹

【答杜惠珍小姐】最近若干影視界人士患有德國麻疹，因而引起人們對此種疾病的注意。德國麻疹實際上是一種類似麻疹的風疹（Rubella），雖然其症狀與麻疹及猩紅熱類似，但病原體不同，病狀也較輕。德國麻疹的病原體是一種特殊的濾過性病毒，其傳染途徑與麻疹相同。易侵襲兩歲至十歲兒童，乳嬰較少，多見於春夏季節，其流行情況，遠不如麻疹之盛。一度患本病後，可獲得病後免疫性，其免疫期間，可達數十年。

本病潛伏期約二至三周，有輕微的上呼吸道炎症狀，低熱，枕後和頸部淋巴結腫大，及紅色斑丘疹，為其特徵。有自發痛及壓痛，此種淋巴腺腫脹，直至退熱後為止，發疹後即退熱，也有全個病程

中並無發熱的。皮疹出現和消失較快，出疹順序不規則，皮疹較麻疹的皮疹小，不融合，指壓疹部，則見褪色。皮疹邊緣不作鋸齒狀，疹退後無色素沉着和脫屑，沒有麻疹口腔粘膜斑。麻疹傳染性很強，極易造成廣泛流行，危害小兒健康，但本病却不致這麼嚴重。除對症治療外，需有良好的護理，平時應多作靜臥休息。孕婦在妊娠四個月內患德國麻疹時可誘發胎兒畸形，由於妊娠早期感染德國麻疹與胎兒先天畸形有密切關係，故預防孕婦感染本病甚為重要。接觸本病患者後，應即注射兩種球蛋白（r-Globulin），每次六CC至九CC。

痲瘋病

【答明報長期讀者先生】痲瘋病的主要症狀是眉毛脫落，這是因為皮下細胞受到侵害。初起的時候，在人體皮膚上發現一些像癬的東西，可是這個癬的地方是麻痺而沒有知覺的，病狀加深的時候，是病菌侵入神經，破壞人體內的組織，所以到鼻、面、手、腳發腫時，已經發展到嚴重的階段了。本病侵入途徑，通常隨着吸氣吸入病菌而先侵鼻膜，其他如消化器、呼吸器、生殖器、汗腺、皮脂腺等，都可成為侵入門戶，昆蟲蜇傷也有侵入可能。檢驗痲瘋一般是將病人鼻涕、痰液及潰瘍面的膿汁分泌物作抹片染色檢查，並不是以驗血作為診斷根據。目前治療痲瘋病的藥還是氫的製劑，像普羅命（Promin）、地亞霜（Diasone）、蘇非特朗（Sulphetrone）。還有一種新藥叫做普羅馬息錠（Promacetin）。這是在吃飯時候吞服的，這種藥很有效，但時間要兩三年，治療期似嫌太久，還是未臻十分理想。預防的辦法，就是少和痲瘋病人接觸，尤其是小孩更容易傳染到。當然，如果一個人