

主治各經執藥

肝氣柴胡
血黃芩

心氣麥門冬
血黃連

脾氣白芍
血大黃

肺氣石羔
血山梔

腎氣玄參
血黃柏

膽氣連翹
血柴胡

胃氣葛根
血大黃

三焦氣連翹
血地皮

膀胱氣滑石
血黃柏

大腸氣連翹
血大黃

小腸氣赤炭
血木通

胞絡氣麥門冬
血牡丹皮

主治骨肉分癆瘵發執藥

肝氣當歸
血柴胡

心氣生地
血黃連

脾氣芍藥
血木瓜

肺氣石羔
血桑皮

腎氣知母
血生地

膽氣柴胡
血瓜蒌

胃氣石羔
血芒硝

三焦氣石羔
血竹葉

膀胱氣滑石
血澤瀉

大腸氣芒硝
血大黃

小腸氣赤炭
血木通

已上諸藥治上中下三焦內熱兼治濕熱之劑

治濕門

即湯液濕化成也。古菴云。氣虛不能運化。水穀而生濕。宜補氣除濕藥。又宜調中消

導藥。行濕利二便藥。外濕宜汗散。宜用風門藥。風能勝濕也。大濕寒皆屬陰。宜與治寒門通看。

人參

甘溫補五臟止渴調中利濕痰明目開心通血脉安

寃定臈鮮虛煩

參。泰也。久服補元氣有參贊之功。五參皆然。無毒。浮而升陽也。主補五臟。隨本

臟藥為使。以升麻引。則瀉肺脾中火邪。以補下焦元氣。一切勞傷肺

以伏苓引。則瀉腎中火邪。以補下焦元氣。一切勞傷肺

脾。陽氣不足。喘促短氣。少氣最妙。惟陰虛火嗽吐血者

慎用。故曰。肺寒還可用。肺熱則傷肺。肺寒者。麻黃湯

遲。假參之力。通經活血。則元氣亦自是發生而盛矣。肺

熱者。氣血激行。再加通迅。以助其激速。而脾氣耗甚矣。肺

止渴者。生津也。調中安脾助胃。去腸胃中冷。心痛脇滿

霍亂反胃。消濕痰。定喘消積。明目開心。入手太陰而能

補陰火。乃氣中之血藥也。故生脉散及表藥痘疹藥中

用者。亦取其通經而走表也。善能安寃定臈。辟邪止

驚除中虛煩熱。與黃芪同用。則助其補表。與白朮同用。則助其補中。與熟地同用。而佐以茯苓。則助補下焦。而補腎。或泥於作飽。而不敢用。蓋不知少服。則濕壅。多服。則宣通意也。○形如人形。大如鷄腿者。去蘆。不令人吐。和細辛。密封。千年不壞。反藜蘆。惡鹵鹹。

甘溫性無毒。補益三焦。呼羊肉。內托癰疽。外欬汗。生

津退熱。効尤速。

黃色。耆老也。服之延年。又名芪者。底也。補下元也。可升可降。陰中之陽也。入手

少陽手足太陰經。東垣云。溫肉分而實腠理。益元氣而補三焦。蓋補肺皮毛自實。治上焦虛喘短氣者。瀉肺中火也。中焦脾胃虛弱。脉弦。血脉不行。羸瘦腹痛。下焦久瀉。痢腸風崩帶。月事不勻。胎前產後諸虛疾。小兒百病。補三焦腎命門不足。呼為羊肉。又云。內托陰症之瘡瘍。外因表虛之盜汗。治癰疽久敗。排膿止痛。生肌收口。五臟惡血。大風癩疾。五疳鼠瘻。肺癰已潰者。用此從裏托出。有汗則止。無汗則發。表虛有邪。發汗不出者。服此。

則汗。燕止渴生津。生血補中。瀉陰火。退虛熱之聖藥也。
惟蒼黑氣盛者。禁用。表邪旺者。亦不可用。用之反助邪。
氣。陰虛者。亦宜少用。用之以升氣於表。則內反虛耗矣。
○皮微黃。肉白柔軟。出綿上者。服之長肉。瘡瘍生用。肺
虛蜜炙。下虛鹽水炒。惡龜甲白蘚皮。畏防風。風能
制芪。芪得防風。其功愈大。蓋相畏而相使者也。

甘草 甘平。生瀉火。炙之。健胃可和。中解毒。養血。堅筋骨。下

氣通經消腫紅。其熱。寒藥用之。緩其寒。善和諸藥。解百

毒。故又名國老。魚毒。可升可降。陰中之陽也。入足三陰

經。生則分身稍瀉火。枯子生用。性寒。能瀉胃火。解熱毒。

除胸中積熱。去莖中痛。節生用。消腫瀉毒。治咽痛。炙則

性溫。能健脾胃。和中。身大者。補三焦元氣。止渴。止嗽。及

肺痿吐膿。腹中急痛。赤白痢疾。又養血補血。堅筋骨。長

肌肉。倍力。下氣除煩。滿逆氣。通經脉。消諸癰疽。瘡瘍。紅

腫。與黃芪同功。若未潰者。宜生。已潰。與不紅腫者。宜炙。

大抵脾胃氣有餘。如心下滿。及腫脹。嘔吐。痢疾。初作。皆

不可用。下焦藥亦少用。恐緩不能達。凡藥宜少用。多用則泥膈而不思食。抑恐緩藥力而少効。○白朮苦參為使。惡遠志。反大戟荒花。甘遂海藻。忌菰菜猪肉。

白茯苓

甘平滲濕。消痰潤肺。伐腎邪。養心神。又調脾胃。臍益氣助血補虛家。赤者須知破氣血。利溲入丙功尤賒。

茯苓

也。苓。靈也。松脂伏於地中而生。治病有靈驗也。味甘淡氣平無毒。浮而升陽也。入手太陰足太陽少陽經東垣曰。白茯苓補虛勞多在心脾之有準。又云。白者入壬癸是三焦通行藥也。滲濕者利小便。消浮腫。暴病行水之聖藥也。消痰潤肺者。主胸脇逆氣煩滿欬逆。口焦舌乾消渴津少。一切痰壅痰飲肺痿肺火不可缺也。腎邪者淋瀝淋結白濁腰脛腫痛無力等症。皆腎經停蓄邪水之所為也。惟此藥能伐去邪水以安真水。養心神者治憂悲驚邪恐悸健忘好睡。心下結痛。保神養神安寢之主藥也。調脾胃臍氣者。小便澀而能利。小便多而能止。

大便結而能通。大便多而能止。一切脾胃不和。水穀不分。寒熱魚定。嘔逆不止。須用之。補虛者。本經云。長陰益氣力。日華云。補五勞七傷。安胎。暖腰膝。卅溪云。凡藥氣重者。主氣味重者。助血。茯苓雖曰淡滲。而味甘且重。不走真氣。佐以人參等補劑下行。亦能補虛固腎。陰虛者。少用無害。養生家。每取白者。蒸暴三次。為末。以牛乳汁和膏服之。或蜜浸。或酒浸。封固百日後。常服不饑延年。腸化為筋。通神致靈。要知虛而上有痰火。下有濕熱者。最宜。若勞後陽虛。小便多。汗多者。禁用。赤茯苓。味淡入足太陰。手少陽。少陰經。東垣云。赤者入丙丁。主破結血。結氣。瀉小腸火。利小便。分水穀。陰虛者。切忌。蓋白術而赤瀉也。○出雲南。似人形。龜鳥味并者佳。去麋皮枰末。水飛浮去赤膜。晒乾。免致損目。有生山之陰。味苦者。須熟湯淋去苦味。馬刀為使。惡白。欽畏牡蒙地榆雄黃。秦艽龜甲。忌醃及酸物。得甘草防風。芍藥。紫石英。麥門冬。共療五臟。

茯苓能療風虛眩。恚怒驚悸。善忘健。補虛勞。乏辟不祥。心

下堅滿亦可羨

假松之氣。津盛發泄於外者。結為快。甚。津氣不甚盛者。抱根而生。名為快神。言

專能欽伏神氣也。

味甘氣平。無毒。陽也。治風眩風虛。心

虛之要藥。止悲怒驚悸善忘。開心益智。定寃。臆。養精神。

療五勞口乾。補虛乏。辟不祥。又治心下急痛。堅滿。人虛

而小便不利者。加而用之。

○去皮及根。畏惡同茯苓。

薯蕷

甘溫氣最平。能補榮衛治濕疑腰疼夢失虛羸熱。又

止頭風眼眩睛

毒。暑。暑。暑。色明也。薯蕷。形如芋也。俗名山藥。無

氣不足久泄者必用之。

補心氣。開達心孔。安寃。多記。補

肺津潤皮毛乾燥。除煩熱。或寒熱邪氣。下逆氣。補腎陽。

氣強陰。澁夢泄。止腰疼。東垣云。山藥而腰濕能醫。丹溪

云。主者消腫硬。蓋補氣血。則留滯自不容不行也。補脾

能堅筋骨。及頭面遊風頭風眼眩。久服益顏色。長肌肉

病人虛羸。加而用之。

○懷慶者佳。熟則滯氣。濕則滑。惟

乾實者入藥。二門家

紫芝為使。惡甘遂。

紫芝為使。惡甘遂。

白朮 甘溫健胃脾。寒濕熱濕盡相宜。痰痞嘔泄腫汗渴。燕

補氣血安胎兒。木濁也。色白而形濁也。味甘而辛。苦不烈。無毒。可升可降。陽也。入手太陽少陰。

足陽明太陰經。補脾胃虛弱。不思飲食。去諸經濕。又退

胃熱。除寒熱。消虛痰痞氣宿滯。止霍亂嘔逆泄瀉。腹中

冷痛。利小便。消水腫脹滿。又有汗則能止。魚汗則能發

緩脾生津。除濕渴。利腰膝間血。上而皮毛。中而心胃。下

而腰膝。在氣主氣。在血主血。故補虛藥多用之。燕安胎

產。產後中風口噤。及大風痿痺。足脛痠痛。皆効。丹溪云。

與二陳同用。則健胃消食。化痰除濕。與芍藥當歸枳實

生地之類同用。則補脾而清脾家濕熱。再加乾姜。去脾

家寒濕。東垣云。佐黃芩。有安胎之能。君枳實。有消痞之

妙。惟傷寒動氣不宜用。○米泔浸半日。去蘆。瀉胃火生

用。補胃虛土炒。防風地榆為使。忌

桃李雀鵲肉。○已上補氣除濕藥

蒼朮

辛烈苦甘溫。主風寒濕痺。疸屯腫滿。痰積瘡。皆散。止

嘔瀉治頭目昏

蒼以色言。魚毒浮而升。陽也。入足陽明大陰經。主風寒濕痺死肌痙瘕。逐皮間

風水結腫。心下滿悶。腹中脹痛。窄狹。消痰飲。眩癖氣塊。祛瘡除蘊。痼山嵐瘴氣。止霍亂吐瀉不止。治大風在身。面風眩頭痛。目淚出。青盲雀目。內外翳障。久服烏鬚注。顏壯筋骨。明耳目。潤肌膚。是驗。然此皆為陽虛者言也。用溪云。辛散雄壯。發汗甚速。以黃柏牛膝石羔下行之。藥引之。則治下焦濕疾。入平胃散。能去中焦濕疾。而平胃中有餘之氣。入葱白麻黃之類。則能散肉分至皮表之邪。惟血虛怯弱。及七情氣悶者。慎用。誤服耗氣無燥津液。虛火動而痞悶愈甚。米泔浸七日。夜去粗皮。炒黃色。或童便浸。防風地榆為使。忌桃李雀鷄肉。仰考神農經云。若欲長生。須服山精。言木結陰陽之精。未嘗分蒼白也。自陶隱居分用。而後貴白而賤蒼。善乎東垣云。補中除濕。力不及白。寬中發汗。功過於白。

平胃味辛氣亦平。去濕痰健胃脾經。傷寒嘔欬咽喉腫胸

蒲頭痰盡忌生

夏至第三候生。葉亦半生。天然妙也。有

陽經。性燥勝水。善去脾經濕痰。痰去而脾胃主氣自健。飲食自進。寒痰風痰亦用者。辛溫故也。主傷寒寒熱溫瘧嘔吐欬逆上氣。及形寒飲冷傷肺而咳。治咽喉腫痛。心下堅脹。腸鳴。胸中痰氣痞塞。及痰厥頭痛。頭眩。非此不除。兼消癰腫。瘰癧。氣虛而面色痿黃。有痰氣者加而用之。凡用生令人吐。熟令人下。故局方多用熟者。但本草云。生微寒。熟溫。宜生者。姜佐熱煎可也。凡諸血症及自汗渴者。禁用。用溪云。燥而耗津。雖少陽病渴者亦忌。惟氣症因動火上升。用半夏調其氣而動火伏而渴自止。○臘月熱水泡洗。置露天水過。又泡共七次。留久極妙。如虛症及孕婦。忌用。用麴。免致損血墮胎。射干。柴胡。為使。惡皂莢。畏雄黃。生乾姜。秦皮。龜甲。及烏頭。忌海藻。羊肉。羊血。餘糖。○造麴法。先將半夏湯泡九次。曬乾。為末。隨病用藥。或煎膏。或絞汁。調末為丸。如彈子大。用楮葉或紙包裹。以稻草上下。會七日。生毛。取出。懸風烟之上。愈久愈良。如治諸痰。用生姜自然汁。風痰用牙皂煎。

膏甚者少加麝香。寒痰青。濕痰白。用老姜煎濃汁加白礬三分之一。火痰黑。老痰膠。用竹瀝或荆瀝少入姜汁。皮裏膜外痰核。用白芥子竹瀝。虛勞熱痰。用麻油浸三五日炒為末。麩糊為麴。治顛癇一切健忘舌強等似風痿症。用臘月黃牛膽汁。畧入熟蜜。小兒驚風。加南星等分。用甘草煎膏。脾虛慢驚及鬱痰。用香附蒼朮川芎等分煎膏。中風卒厥。傷寒并諸瘡瘍內結不便。一切宜下之病。用皮硝白粉霜十分之三。共用河水煮透為末。以大黃煎膏。痰積沉痼。取二兩入海粉一兩。雄黃五錢。為末蜜丸。一切沉痼痰病。用黃牛肉煮成膏。造麴日乾。

反辛溫利膀胱主除痰氣逆胸堂消導脾胃止嘔瀉發

表寒濕佐生姜

橘色如橘王有文。魚毒味厚。可升可降。陽中之陰也。除膀胱留熱停水。五淋。利

小便。主胸中痰熱逆氣。客氣消痰止氣嗽潤肺。和胃健脾。輕則水穀不化衝胸作嘔。或下泄。或氣痢。或霍亂重則癥瘕積滯。皆能消導。蕪去白虫。解酒毒。治下焦冷氣。臟間虛冷氣。脚氣衝心。久服去臭下氣通神。丹溪云。與

白朮半夏同用。則滲濕而健脾胃。與甘草白朮同用。必用。則補脾胃。魚甘草白朮而多用。獨用。則瀉脾胃。與蒼朮厚朴同用。去中脘以上至胸膈之邪。再加生姜葱白麻黃之類。則能散肉分至皮表有餘之邪。○陳久者良。隔年者亦可用。留白罌炒。健脾胃和中。去白曰橘紅。消痰瀉肺發表。入下焦用鹽水浸。肺燥者童便浸晒。白檀為使。又有一種曰抽。比橘差大。不堪入藥。○青橘葉。道胸脇逆氣。行肝氣。乳腫痛及脇癰。藥中用之以行經。○橘核。治腎注腰疼。膀胱疝痛。腎冷炒去壳為末。酒調服。

青皮 苦寒破滯氣入肝膽又利脾胃。膈脇小腹痛且膨。疝

積愈低愈能治

皮。橘皮一種。大而色紅已成熟者曰橘皮。小而色青未成熟者曰青皮。魚毒沉

而降。陰中陽也。入手少陽經。厥陰引經藥。主破滯氣利脾胃。消飲食。除積結。膈氣。止小腹痛。須用之。又瀉肝氣。治脇痛。疝氣。及伏膽家動火驚症。用二三分可也。橘皮治高青皮治低。故東垣云。破滯氣愈低而愈効。削堅

積愈下而愈良。氣虛弱者少用。蓋有滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣。氣短者全禁。去穢用。消積定痛。醋炒。

枳壳微寒味苦酸逐水消痰胸膈寬止嘔瀉痢攻堅積散

痔祛風利竅關

枳即橘屬去穢用壳無毒浮升而微降陰中陽也逐心下停水去胃中濕消脹

滿瀉肺痰氣勞氣咳嗽背膊悶倦胸膈痞結腹脇滿痛東垣云消心下痞塞之痰泄腹中滯塞之氣是也止嘔逆反胃霍亂及五膈氣瀉痢消宿食破癥瘕痢老積腸風下血痔腫本草所謂安胃是也治遍身風疹痒庇痺痛藥性論云主皮毛之病是也兼通閉節利大小腸瘦胎催生氣血虛弱者禁用。水浸軟去穢。麩炒香熟。

枳實比壳性更酷主治大同下脇腹更消脾癰破堅癥瘕

泄陰痿莫誤服

與枳壳一種大而色黃紫多穢曰壳小

陰逐停水消痰飲寬胸思安胃氣止喘逆破積聚利五臟除寒熱結功同枳壳但枳壳性詳而緩枳實性酷而

速更能去脾間瘀血瘀血去而痞自消去日久稠痰消
年深堅積丹溪云脾胃濕熱生痰有積者入白木中四
分之一脾用枳實有推墟何壁之功故治下主血在胸
腹之分胃用枳壳損至高之氣故治高主氣在胸膈之
分皆踈通決瀉滑竅破結實之剋本草云止滯泄益熱
明目亦謂積去而脾健神清也藥性語云腎而傷令陰
痿而有氣加而用之借以達下耳要之實症可用虛而
久病慎不可誤服海藏云益氣佐以參朮乾姜破氣佐
以牽牛硝黃其善用枳實者乎又與黃芪等分称丸服
治腸風下血單用蜜製服治五痔為末飲調服治胸痺
氣壅心膈不利及小兒久痢淋瀝水穀不調炒熱熨婦
人陰腫痛。壳實俱宜商川陳久者水浸軟去穢麩炒

厚朴苦溫除痰濕最散心腹脹痛急霍亂積痢并頭疼治

痺消瘀通經翕

皮厚質朴味苦辛無毒可并可降陰中

世五臟一切氣治心腹煩痛胸滿散結之補藥也療霍
亂轉筋胃中冷逆胸中吐不與或嘔酸水消宿食厚腸

胃走積年冷氣腹內腸鳴止瀉止痢又治中風傷寒頭
疼寒熱氣血痺死肌調閑節破宿血通婦人月經及產
前後腹臟不安兼定驚悸下淋露去三虫本經云與枳
實大黃同用則能泄實滿而解熱脹是消痰下氣也與
橘皮蒼木同用則能除濕滿而平胃氣是溫中益氣也
與鮮利藥同用則治傷寒頭痛與泄利藥同用則厚腸
胃大抵用苦則泄用溫則補胃弱氣虛者終不敢用以
其味苦而辛能散人元氣也此丹溪謂平胃散用之不
使胃土太過而復其平以至於和而已非溫補之謂也
吁竹瀝山藥涼而能補橘皮厚朴熱而能泄用者悟之
○肉厚色紫者佳去粗皮入湯藥用生姜汁炒入丸藥
用醋炙或醋炙乾姜為使惡澤瀉寒水石硝石忌豆

射于苦寒消食熱寬膨下氣逐老血破癖通經治兒疳便

毒喉風痰核結

形如射鳥之等有小毒開胃下食除飲

滿肺氣喘嗽欬逆上氣療老血在心脾間欬唾言語氣
臭破癥結瘀癖瘰癧血通女人月閉治小兒疳氣發時腫

痛如刺。散結氣。消腫毒。去胃癰。治便毒足厥陰濕氣因
疲勞而發。取三寸同生姜煎服。利兩三行即効。又治咽
痛水漿難入。不得消息。嚥汁立差。丹溪云。屬金而有木
與火水。行太陰厥陰之積痰。使結核自消。甚捷。久服令
人虛。即烏扇根。紫花者是。紅花
者非。三月採。米泔浸一宿。日乾。

旋覆花。鹹甘冷。烈逐水消痰止嘔噎。寬胸脇清頭目風。治

痺又利腸臟結

花如菊。淡黃綠繁茂。圓而覆下。俗名金沸草。有小毒。治心脇痰水。及膀胱留飲。

寒熱水腫。消胸上痰結。噎如膠漆。開胃止嘔逆。不下食。
治傷寒汗吐下後。心下痞堅。噎氣不止。及結氣脇下滿。
去頭面風。目中眵。風氣濕痺。皮間死肌。利大腸。去五
臟間寒熱。結氣。兼通血脈。除驚補中。下氣。衍義云。走散
之藥。稍涉虛者。禁用。○去梗葉蒸熟。晒干。入煎藥用。絹
濾過。免傷人肺。○葉治金瘡。止血。搗傳之。○根治破所
斷筋。急取搗汁。滴瘡中。仍用查封瘡上。過半月斷筋自
續。○又有一種旋花。性治大同。今少識者。故不錄入。

大腹皮辛溫無毒消腫寬膨定喘促止霍亂通大小腸痰

膈醋心氣攻腹

腹大而平者名大腹尖者名攢榔大腹皮消腫寬脹定喘止霍亂通大小腸治

冷熱氣攻心腹大腸毒壅痰膈醋心並以姜鹽同煎入

疎氣藥良下一切氣調中開脾胃健胃用溪云性溫疎通

脾胃有餘之氣虛者不可用○鴝鳥多棲此樹宜先以酒洗後以大豆汁洗火焙赤

京三稜苦辛平澁消積散癥功可立又治心腹脹且疼破

血通經下乳汁

京當作荆楚地所出也葉似芡蒲莖皆三稜魚毒陰中陽也治老癖癥瘕積塊

快氣寬胸氣脹鼓滿最宜婦人血脈不調心腹刺痛通

月經產後腹痛血暈宿血及氣滯乳汁不行兼治小兒

癰熱魚辜疔瘰癧撲損瘀血亦用色白屬氣破血中之氣

真氣虛者勿用○生細根屈如爪者名鷄爪三稜又名

草三稜不生細根形如烏梅者名黑三稜根黃白色形

如釵股者名石三稜色黃觔重狀若鯽魚而小者名京