

證治準繩第三冊目錄

諸嘔逆門

嘔吐膈氣總論

嘔吐

漏氣 嘔苦

走哺 吐酸

吐食 乾嘔

嘔清水

惡心

反胃

嘔蟲 嘔涎沫

噎

吐利

霍亂

乾霍亂

關格

呃逆

噫氣

諸逆衝上

諸血門



南京中醫藥大學圖書館版權所有

諸見血證 九竅出血 毛孔出血

鼻衄 舌衄

齒衄 耳衄

吐血 欬嗽血

咯血 溲血

下血 腸風 中蠱 臍毒 畜血



南京中醫藥大學圖書館版權所有

證治準繩第三冊

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

嘔吐膈氣總論

潔古家珍吐證有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其症食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假爲積而痛其脉浮而

茲其證或先痛而後吐或先吐而後痛法當以小毒藥去其積檳榔木香和其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脉大而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法宜毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大腑秘結而自愈也此事難知問嘔吐噦胃所主各有經乎答曰胃者總司也內有太陽陽明少陽三經之別以其氣血多少而爲聲物有無之不同卽吐屬太陽有物無聲乃血病也有食入卽吐食已則吐食久則吐之別嘔屬陽明有物有聲氣血俱病也仲景云嘔多雖有陽

明證不可下噦屬少陽無物有聲乃氣病也

此以乾嘔爲噦

也

醫家大法食利則吐爲之嘔生薑半夏湯

食

入則吐爲之暴吐生薑橘皮湯食已則吐爲之嘔

吐橘皮半夏湯食久則吐爲之反胃水煮金花丸

食再則吐爲之翻胃易老紫沉丸且食不能暮

食則吐食不下脉實而滑半夏生薑大黃湯下之

潔古論吐分三焦其說蓋本於黃帝所謂氣爲上膈

食飲入而還出爲下膈食晬時乃反出之其上焦食

已暴吐者今世謂之嘔吐也中下二焦食久而吐食

再而吐者今世謂之膈氣反胃也分嘔吐膈氣爲二

門 趙以德云夫陰陽氣血隨處有定分獨脾胃得之則法天地人而三才之道備故胃有上中下三脘上脘法天爲陽下脘法地爲陰中脘法氣交之分陽清而陰濁故陽所司者氣陰所司者血然陽中亦有陰陰中亦有陽於是上脘氣多血少則體乾道之變化動也下脘血多氣少則體坤道之資生靜也中脘氣血相半故運上下動靜升降之氣行由是物之入胃各從其類聚水飲者物之清穀食者物之濁然清中有濁濁中有清故飲之清者必先上輸於司氣之肺而後四布爲津爲液清中之濁者則下輸膀胱爲



便溺出焉食之清者亦必先淫精於司血之心肝以
養筋骨經脉更化榮衛流注百骸濁中之濁者則自
下脘變糟粕傳送下大腸出焉若邪在上脘之陽則
氣停氣停則水積故飲之清濁混亂則爲痰爲飲爲
涎爲唾變而成嘔邪在下脘之陰則血滯血滯則穀
不消故食之清濁不分而爲噎塞爲痞滿爲痛爲脹
變而成吐邪在中脘之氣交者盡有二脘之病是故
嘔從氣病法天之陽動而有聲與飲俱出猶雷震必
雨注也吐從血病法地之陰靜而無聲與食俱出象
萬物之吐出於地也氣血俱病法陰陽之氣交則嘔

吐並作飲食皆出然在上脘非不吐食也設陽中之
陰亦病則食入卽吐不得納於胃也非若中脘之食
已而後吐下脘之食久而方出其下脘非不嘔也設
陰中之陽亦病則吐與嘔齊作然嘔少於吐不若上
脘之嘔多於吐也不食而嘔者陰寒也

嘔吐

漏氣

走哺

吐食

乾嘔

惡心

嘔苦

吐酸

吞酸

嘔清水

吐涎沫

吐涎沫

吐涎沫

東垣曰夫嘔吐噦者皆屬於胃胃者總司也以其氣血多少爲異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下孫真人曰嘔家多服生薑乃嘔吐之聖藥也氣逆者必散之故以生薑爲主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以陳皮去白主之噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以薑製半夏爲主故朱奉議

治嘔吐噦以生薑半夏陳皮之類是也究三者之源
皆因脾氣虛弱或因寒氣客胃加之飲食所傷而致
也宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之若
但有內傷而有此疾宜察其虛實使內消之痰飲者
必下之當分其經對證用藥不可亂也 金匱方諸
嘔吐穀不得下者小半夏湯主之又云嘔家本渴渴
者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主
之用半夏一升生薑半斤水七升煮取一升半分溫
再服又云卒嘔吐心下痞有水眩悸者小半夏加茯
苓湯主之卽前方加茯苓四兩也然則生薑半夏固

通治嘔吐之正劑矣然東垣云辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者唯宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈此仲景心法也一寒而嘔吐則喜熱惡寒四肢淒清或先覺噦酸脉弱小而滑因胃虛傷寒飲食或傷寒汗下過多胃中虛冷所致當以剛壯溫之宜二陳湯加丁香十粒或理中湯加枳實半錢或丁香吳茱萸湯藿香安胃散鐵刷湯不効則溫中湯甚則附子理中湯或治中湯加丁香並須冷服蓋冷遇冷則相入

庶不吐出

羅謙甫云諸藥不曾有患人用附子理中愈者紅豆丸神效

湯四逆湯加丁香到口卽吐後去乾薑只參附加

木二香煎熟更磨入沉香立吐定蓋虛寒痰氣凝結

丁香附既溫佐以沉香則通乾薑白朮則泥耳

嘔食少則出喜冷惡熱煩躁引飲脉數而洪宜二陳

湯加黃連炒梔子枇杷葉竹茹乾葛生薑入蘆根汁

服金匱方嘔而發熱者小柴胡湯主之潔古用小

柴胡湯加青黛以薑汁打糊丸名清鎮丸治嘔吐脉

弦頭痛蓋本諸此胃熱而吐者聞穀氣卽嘔藥下

亦嘔或傷寒未解胸中有熱關脉洪者是也並用蘆

根



根汁金匱方嘔吐而病在膈上後思水解急與之
思水者猪苓散主之嘔而胸滿者吳茱萸湯主之
嘔而渴煮枇杷葉汁飲之嘔而腸鳴心下痞者
半夏瀉心湯主之氣嘔吐胸滿膈脹關格不通不
食常飽食則常氣逆而吐此因盛怒中飲食而然宜
二陳湯加枳實木香各半錢或吳茱萸湯不效則丁
沉透膈湯及五膈寬中湯食嘔吐多因七情而得
有外感邪氣併飲食不節而生大槩治以理中爲先
二陳湯加枳實一錢或加南星七分沉香木香各四
分亦好或只服枳南湯或導痰湯又有中脘伏痰

遇冷卽發俗謂之冷癰或服新法半夏湯或搗脾湯
有痰飲粥藥到咽卽吐人皆謂其番胃非也此乃
痰氣結在咽膈之間宜先以薑蘇湯下靈砂丹俟藥
可進則以順氣之藥繼之 外有吐瀉及痢疾或腹
冷痛進熱藥太驟以致嘔逆宜二陳湯加砂仁白芷
蔻各半錢沉香少許 嘔吐諸藥不效當借鎮重之
藥以墜其逆氣宜薑蘇湯下靈砂丹百粒俟藥得止
却以養正丹半硫丸導之嘔吐津液旣去其口必渴
不可因渴而遽以爲熱 若陰虛邪氣逆上窒塞嘔
噦不足之病此地道不通也正當用生地黃當歸桃

仁紅花之類和血涼血潤血兼用甘草以補其氣微
加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則氣逆嘔噦
自不見矣 復有胸中虛熱穀氣久虛發而爲嘔噦
者但得五穀之陰以和之則嘔噦自止

漏氣 身背皆熱肘臂牽痛其氣不續膈間厭悶食
入卽先嘔而後下名曰漏氣此因上焦傷風閉其腠
理經氣失道邪氣內着麥門冬湯主之

走哺 兩下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆不禁
名曰走哺人參湯主之

吐食 上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先降

氣和中以桔梗湯調木香散二錢隔夜空腹服之三
服後氣漸下吐漸去然後去木香散加芍藥二兩黃
芪一兩半同煎服之病愈則止如大府燥結食不盡
下以大承氣湯去芒硝微下之少利爲度再服前藥
補之如大便復結又依前微下之保命集用荊黃
湯調檳榔散中焦吐食由食積與寒氣相格故吐
而疼宜服紫沉丸金匱大黃甘草湯治食已卽吐
又治吐水吐食而脉弦者由肝勝於脾而吐乃由
脾胃之虛宜治風安胃金花丸青鎮丸主之金匱
茯苓澤瀉湯治胃反吐而渴欲飲水者

乾嘔

金匱方乾嘔噦若手足厥者陳皮湯主之

卒乾嘔不息取甘蕉汁溫服半升日三或入薑汁

搗葛根絞取汁服

惡心

惡心乾嘔欲吐不吐心下映漾人如畏船宜

大半夏湯或小半夏茯苓湯或理中湯治中湯皆可

用金匱方病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不

噦徹心中憤憤然無柰者生薑半夏湯主之胃氣

虛弱身重有痰惡心欲吐是邪氣羈絆於脾胃之間

當先實其脾胃茯苓半夏湯主之舊有風證不敢

見風眼澀眼黑胸中有痰惡心兀兀欲吐但遇風覺