

痘學真傳卷之七目錄

三豆湯

煮砂方

玄菟丹

升麻葛根湯

九味羌活湯

羌活透肌散

解毒疎痘湯

前胡化癰湯

消毒飲

參蘇飲

黃連香薷飲

十味香薷飲

麻黃湯

竹葉石膏湯

小柴胡湯

人參白虎湯

獨聖散

獨勝散

透肌散

紫草飲

仲陽四聖散

棗變百祥丸

小承氣湯

三黃湯

四順清涼飲
消癰承氣湯
追蟲散

小無比散
黃連解毒湯
涼血地黃湯

犀角地黃湯
十神解毒湯
大連翹飲

紫草化毒湯
扁鵲四聖散
辰砂益元散

加味如聖散
生脉散
二陳湯

生地黃散
甘桔湯
六一湯

保元湯
二神湯
附子理中湯

十二味異攻散
十一味異功散
瀉肝散

鬼糞散
海藏地黃丸
通聖散

應驗目疾方

活血散

潤腸丸

十三味敗毒散內解散

迦源解毒湯

木香大安丸

六神散

內託散

回漿散

養心化毒湯

託裏散

養脾湯

加味地黃丸

保嬰百補丸

八珍湯

十全大補湯

白朮茯苓澤瀉湯

補中益氣湯

黃耆建中湯

四君子湯

參朮湯

當歸活血湯

歸脾飲

四物湯

六味地黃丸

葉氏痢症丸

抱龍丸

葉氏疳積散

黃疸丸

疝氣散

口疳散

又方

摻藥

拔疔散

敷疔散

神效解毒膏

洗痘湯

辟穢香

止汗粉

吹喉散

翻癰散

痘後膿泡疥瘡方

水火丸

痘學真傳卷之七

梁谿葉大椿子容甫著

門人華若虬松孺較輯

方釋

三豆湯

大黑豆

赤小豆

菉豆

各一兩

甘草

三兩用水

八升將大粉草剉細三豆淘淨同煮至豆熟爲度逐目空心面東任意食豆飲汁或將豆曬乾入汁再浸再晒○三豆皆涼品而寓生發之意黑歸腎浸盡爲度

以制相火赤歸心以制君火菉歸陽明以制胃火常服而不嫌其峻烈功緩而實取其穩便未出痘

時及將出發熱時皆可服、扁鵲為方藥之祖、故首
弁之、

煮砂方

硃砂

四兩

黃連

鼠粘子

各一兩

紫草

五錢先將三味

煮二次每煮用水四碗煎至二碗去查濾淨用布
裹砂穿弔鍋上離鍋底一指煮前藥水以乾為度

取硃砂曬乾次
再用後四味

當歸

六兩

川芎

五兩

升麻

四兩

甘草

三兩如前

煮二次每煮用水十碗煎至五碗仍如前煮砂水
乾為度另用糯米一升炒黃貯磁罐封固遇痘發
熱或見紅點時每兒一歲用硃砂糯米各一分入
白蜜一匙酒三大匙米湯小半甕每日調服一次
為度 ○硃砂得離火之色稟坎水之性能墜下以解

先天之毒黃連鼠粘紫草以助清火化毒之功初

煮之當歸川芎以養血分升麻以升沉滯甘草以和苦寒次煮之可謂識痘毒之原探稀痘之奧稀痘方古來甚多而寔理之所無蓋以毒種于賦形之頃藏于兩腎之內原非藥力可能挽回然古人書不敢偏廢此方可供採選

玄菟丹

菟絲子

八兩

玄參

四兩各爲不黑糖調服初生者一錢量加至一兩五

錢

○菟絲養先天之水玄參清腎家之火一養一

清則痘毒自減童年久服不特稀痘且免癆瘵

升麻葛根湯

升麻

葛根

各一錢

白芍藥

一錢五分

甘草

一錢

○首卷有論

九味羌活湯

羌活

白芷

生地

黃芩

各一錢

蒼

朮

細辛

川芎

防風

各八分

甘草

四分

○痘未見

點在疑似之間而風邪壅遏頭痛發熱驚搐火甚者此方主之羌活主治太陽之邪而芷芩蒼細芎防雖分散諸經之邪其立方之旨專散太陽外感如頭痛發熱等症湯名羌活言治太陽也加生地甘草以和諸藥之辛燥

羌活透肌散

羌活

柴胡

前胡

山查

各一錢

茯苓

芩 陳皮 川芎

半夏各六
當歸分

甘草

桔梗

各四

○表氣未疏則出有不盡、羌活柴胡前胡以疏表、裏氣未利則出有不速、半夏茯苓陳皮甘草桔梗以調理、芎歸山查活血消滯則痘盡出、初發宜用解毒疎痘湯

羌活

防風

荆芥

柴胡

白芷

各一錢

連翹

黃芩

鼠粘子

紫草

蟬蛻

黃

連

各八分

川芎

當歸

各六分

○痘已見點、客邪未解、

內毒本輕者此方主之、羌防荆芥柴胡白芷以發表、翹芩鼠紫蟬連以清火、芎歸以和血、邪解則毒

出而痘自疎矣如升麻葛根湯未効續用此方

前胡化癰湯

紅花

當歸

錢各一

鬱金

錢七

荆芥

錢四分

前

胡

分八

赤芍

白芷

甘草節

陳皮

錢各五

胡荽子

三十粒

○紅花當歸芍藥鬱金流通血道血和則邪

火自解前胡陳皮祛風熱消痰氣佐白芷荆芥荜

子以發散甘草節以消毒內用和血外用升發癰毒

自化凡痘未出先癰及出時夾癰黑陷大便自利

者宜用

消毒飲

牛蒡子

錢二

荆芥穗

錢一

甘草

防風

錢各五

○君牛蒡利咽喉熱壅臣芥穗祛肌膚風火佐防風以散太陽不去之風邪甘草以緩三種辛溫之氣味痘初發及四日以前風邪不解上焦火盛痘有火色宜用之如回脫後餘熱未解而感微風者亦可用

參蘇飲 紫蘇 葛根 白茯苓 半夏 前胡

桔梗

陳皮

各一錢

人參

七分

甘草

五分

○風寒客於表

紫蘇乾葛以發散痰氣壅於內茯苓半夏前胡桔梗陳皮以開導滲濕如用於初發之時恐邪盡中

虛難成功於後日、用於回靨之際、純用發散、恐氣虛不能克托外邪、故用參草以調補之、痘家氣虛外感、宜酌用、

黃連香薷飲

香薷

一兩

厚朴

白匾豆

各五錢

黃連

三錢

○感冒暑毒、煩躁顛狂、大渴引飲、舌生胎刺、痘色乾焦、或夾斑、或發水泡、用香薷開腠理、以消暑、黃連入心家、以清熱、厚朴散胸腹之結、匾豆和脾胃之氣、則暑邪自解而伏熱亦散矣、

十味香薷飲

香薷

三錢

人參

黃耆

白朮

白茯苓

苓各六分 白扁豆 甘草 陳皮 厚朴 木瓜各一

錢 ○痘至五六朝以後忽然中暑身體倦怠頭痛

吐利者此方主之香薷以散暑邪參耆以固肺氣
木苓豆甘以扶脾胃陳厚疏通木瓜收斂誠出痘
中虛傷暑之良方也

麻黃湯 麻黃三錢 桂枝二錢 杏仁七枚 甘草一錢 ○時值嚴

寒腠理閉錮非麻黃桂枝之熱不可以利關竅達
皮毛恐辛熱傷肺故用杏仁利其氣甘草和其氣
凡天寒出痘見點不快壯熱不汗或手足冰冷用

之

竹葉石膏湯

竹葉

片二十

石膏

一兩六錢

粳米

半合

半夏

二錢

五分

人參

三錢

甘草

一錢

麥冬

一兩

○

竹葉

石膏

門冬

以清

餘熱人參以補不足半夏以散結氣甘草粳米解

石之寒而不損胃凡痘六七日後邪熱未退宜用

此方

小柴胡湯

黃芩

柴胡

各二錢

半夏

一錢

人參

七分

甘草

五分

生薑

三片

大棗

二枚

○

柴胡

黃芩

能解熱邪

半夏

生

薑能散結滯人參甘草能補中氣凡痘前感冒寒

暑至七朝以後而餘邪未盡發熱無汗不可再攻亦不可驟補宜服此方如痘初回脫而感冒者亦可用

人參白虎湯

石膏

錢五

知母

錢三

人參

錢二

甘草

分八

○石

膏清胃熱以解肌知母益腎水而清肺人參甘草以補中氣令痘生長凡痘舌乾口燥壅熱傷暑元神不足者首尾皆可用

獨聖散

穿山甲

錢一

麝香

草湯

一分

爲末

紫

調服

○穿山甲無

堅不破麝香無竅不通二味力皆攻發用紫草湯

調服、減其燥烈之性也。凡痘在三四朝後已離本位、悶遏不發者、及痘毒伏於筋骨間壅滯不行者、宜服之。

獨勝散

牛蒡子

三錢僵蠶

一錢 爲末 茅根湯調服

○牛蒡利肺

家熱壅、䟽三焦鬱結、毒非此不解、僵蠶流走經絡、開豁肉理、毒非此不出、獨聖散用走脾胃、其性似溫、此方專走肺經、其性近涼、

透肌散

紫草

二錢

木通

一錢五分

升麻

蟬蜋

人參

甘草

白芍藥

各五分

○紫草木通俱涼走而清心

家之火、導入小腸以達膀胱、升麻蟬蜋、升發火邪、以達腠理、參草以補中氣、使邪不畱于內、白芍調陰氣而和榮衛、欲使痘毒發盡而不容稍畱也、故名透肌、凡氣虛血熱、五六朝間用、

紫草飲

人參

六分

甘草

四分

穿山甲

八分

紫草

蟬蜋

各一

錢

○痘至七八朝時、中氣已虛、毒未解、熱未除者、用人參、甘草以補之、山甲以攻之、紫草、蟬蜋以清之、

仲陽四聖散

紫草

木通

枳殼

甘草

等分

○痘