

周氏醫酒學子鼓書



本艸經疏卷十

艸部下品之上

總六十二種今疏其要者一十六種

附子

半夏

大黃

葶藶

桔梗

艸蒿

旋復花

藜蘆

射干

常山

甘遂

白欬

白及

大戟

貫衆

羊躑躅

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金
瘡破癥堅積聚血瘕寒溼踈痺拘攣膝痛腳疼冷弱不
能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌
骨強陰又墮胎爲百藥長冬月採爲附子春採爲烏頭

本草綱目
忌煎汁得蜀椒食鹽可引之下行地膽爲之使
惡蜈蚣畏防風黑豆甘艸黃耆人參童便犀角

〔疏〕附子全稟地中火土燥烈之氣而兼得乎天之熱
氣故其氣味皆大辛大熱微兼甘苦而有火毒氣厚
味薄陽中之陰降多升少浮中沈無所不至入手厥
陰命門手少陽三焦兼入足少陰太陰經其性走而
不守得甘艸則性緩得肉桂則補命門本經主風寒
欬逆邪氣寒溼蹇跛拘攣膝痛腳疼冷弱不能行步
以此諸病皆由風寒溼三邪客之所致也邪客上焦
則欬逆邪客下焦則成蹇跛拘攣膝痛腳疼冷弱不
能行步此藥性大熱而善走故亦善除風寒溼三邪
三邪祛則諸證自瘳矣癥堅積聚血瘕皆血分虛寒

凝而不行所成血得熱則行故能療之其主金瘡亦
謂金瘡爲風寒所鬱擊血瘀不活之證而非血流不
止之金瘡也別錄又主腰脊風寒腳氣冷弱心腹冷
痛及脾虛寒客中焦爲霍亂客下焦肝腎之分爲轉
筋借諸補氣藥則溫中補血藥則強陰堅肌骨火能
消物氣性熱極入血善行故善墜胎爲百藥長引參
朮黃耆茯苓則溫煖脾胃除脾溼祛腎寒補下焦陽
虛佐之以桂則除臟腑沈寒三焦厥逆溼瀼腹痛胃
寒虬動氣虛經閉補陽虛散虛壅亦可入足太陽少
陰故治督脈爲病脊強而厥督脈夾脊而上並足太
陽膀胱經膀胱者腎之府故主之也天雄烏頭側子

虛氣弱之病而誤用之於陰虛內熱血液衰少傷寒
溫病熱病陽厥等證靡不立斃謹列其害如左醫師
司命宜詳玩而深鑒之亦生人之大幸也傷寒陽厥
其外證雖與陰厥相類而其內實不相侔何者陽厥
之病若係傷寒溫疫其先必發熱頭疼口渴其後雖
頭不疼而表熱已除然必面赤顴紅二便不利小便
必赤或短少是其候也此當下之病也產後血虛角
弓反張病名曰瘓瘓者勁也是去血過多陰氣暴虛
陰虛生內熱熱則生風故外兼現乎風證其實乃陰
血不足無以榮養於筋所致足厥陰肝家大虛之候
此宜益陰補血清熱則愈也故凡病人一見內熱口

乾咽乾口渴渴欲引飲咳嗽多痰煩躁五心煩熱骨
蒸勞熱惡寒陰虛內熱外寒虛火上攻齒痛脾陰不
足以致飲食無味小便黃赤短澁及不利大便不通
或燥結腹內覺熱悶喜飲冷漿及鮮果畏火及日光
兼畏人聲木聲虛陽易興夢洩不止產後發熱產後
血行不止及惡瘡臭穢小產增寒壯熱中暑厥暈陰
虛頭暈中暑暴泄利下如火赤白滯下小兒中暑傷
食作泄小便短赤口渴思飲血虛腹痛按之卽止火
炎欲嘔外類反胃而惡熱焦煩得寒暫止中熱腹中
絞痛中暑霍亂吐瀉或乾霍亂或久瘧寒熱並盛或
赤白濁赤白淋尿血便血血崩吐衄齒衄舌上出血

目昏神短耳鳴盜汗汗血多汗惡熱老人精絕陽痿
少年縱慾傷精以致陰精不守精滑腦漏婦人血枯
無子血枯經閉腎虛小便餘瀝血虛大便燥結陰虛
口苦舌乾心經有熱夢寐紛紜下部溼熱行履重滯
溼熱痿痺溼熱作泄溼熱腳氣小兒急驚內熱痘瘡
乾焦黑陷痘瘡火閉不出痘瘡皮薄嬌紅痘瘡因熱
咬牙痘瘡挾熱下利痘瘡餘毒生癰中風疆仆不語
中風口眼歪邪中風語言蹇澀中風半身不遂中風
痰多神昏一切癰疽未潰金瘡失血發瘧血虛頭痛
偏頭風痛上來內外男婦小兒共七十餘證病屬陰
虛及諸火熱無關陽弱亦非陰寒法所均忌倘誤犯

之輕變爲重重者必死枉害人命此藥居多臨證施
治宜謹審之世徒見其投之陽虛之候肺腎本無熱
證者服之有起死之殊功而不知其用之陰虛如上
諸病亦復下咽莫救故特深著其害以表其非嘗試
輕用之藥也業醫君子可不慎諸

半夏味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒寒熱心下堅下
氣咽喉腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗消心腹胸膈痰
熱滿結咳嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮
胎療痿黃悅澤面目生令人吐熱令人下用之湯洗令

滑盡

射干爲之使惡皂莢畏雄黃生姜乾姜
秦皮鼈甲反烏頭忌羊血海藻飴糖

〔疏〕半夏得土金之氣兼得乎天之燥氣故其味辛平

苦溫火金相搏則辛而有毒潔古謂味辛苦性溫氣
味俱薄沈而降好古謂其辛厚苦輕陽中陰也入足
太陰陽明少陽亦入手少陰經柴胡爲之使辛溫善
散故主傷寒邪在表裏之間往來寒熱苦善下泄邪
在胸中則心下堅胸脹欬逆邪在上焦則頭眩邪在
少陰則咽喉腫痛別錄亦謂其消心腹胸膈痰熱滿
結欬逆上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆亦皆邪在上
焦胸中之所致故悉主之也中焦者足太陰之所治
也有溼有熱清濁不分則腸鳴溼熱勝則自汗入足
太陰故并主之辛能散結故消癰腫脾家溼熱則面
色痿黃實脾分水燥溼則前證俱除面目因而滑澤

矣辛溫有毒故墮胎也

主治參互

張仲景傷寒論小結胸痛正在心下按之則痛脈浮而滑者小陷胸湯主之半夏半升黃連一兩栝樓實大者一箇水六升先煮栝樓至三升去滓內二味煮取二升分三服 又治少陰咽痛生瘡不能言語聲不出者苦酒湯主之半夏七枚打碎雞子一枚頭開一竅去黃納苦酒令小滿入半夏在內以環子坐於炭火上煎三沸去滓置盃中時時嚥之極驗未瘥更作 金匱要略治支飲作嘔嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤

本州縣志 卷一
憤並宜小半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水
七升煮一升五合分溫服 又治嘔噦眩悸穀不得
下半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切
以水七升煎一升半分溫服之 又心下悸忪半夏
麻黃丸半夏麻黃等分爲末蜜丸小豆大每服三十
丸日三 又嘔吐反胃大半夏湯半夏三升人參三
兩白蜜一升水一斗二升和揚之一百二十遍煮取
三升半溫服一升日再服亦治膈間支飲 又張仲
景方治黃疸喘滿小便自利不可除熱者用半夏半
斤生薑半斤水七升煮一升五合分再服有一人氣
結而死心下暖以此少許入口其人遂活 潔古活

法機要方風痰頭暈嘔逆目眩面青黃色脈弦者小
資金花丸用生半夏生天南星寒水石煨各一兩天
麻半兩雄黃二錢小麥麴三兩爲末水和成餅水煮
浮起漉出搗丸梧子大每服五十丸薑湯下極效亦
治風痰咳嗽二便不通風痰頭痛 又治風痰喘逆
兀兀欲吐眩暈欲倒半夏一兩雄黃三錢爲末薑汁
浸蒸餅丸梧子大每服三十丸薑湯下已吐者加檳
榔 又治溼痰咳嗽面黃體重嗜臥兼食不消脈緩
者白朮丸用半夏南星各一兩白朮一兩半爲末薄
糊丸梧子大每服五十丸薑湯下 又治氣痰咳嗽
面白氣促洒淅惡寒愁憂不樂脈澹者玉粉丸用半

夏南星各一兩官桂半兩爲末糊丸梧子大每服五十丸薑湯下 和劑局方治停痰畱飲胸膈滿悶氣

短惡心飲食不下或吐痰水茯苓半夏湯用半夏泡五兩茯苓三兩每服四錢薑七片水一鍾半煎七分甚捷徑 又搜風化痰安神定志利頭目辰砂化痰

丸用半夏麴三兩天南星炮一兩辰砂枯礬各半兩爲末薑汁打糊丸梧子大每服三十九食後薑湯下

又治風痰喘急干縉湯用半夏湯洗七箇甘草炙

皂莢炒各寸許薑三片水一盞煎七分溫服 又治

停痰冷飲嘔逆橘皮半夏湯用半夏水煮熟陳橘皮各半兩每服四錢生薑七片水二盞煎一盞溫服

又治胃寒噦逆停痰畱飲藿香半夏湯用半夏湯泡炒黃二兩藿香一兩丁皮半兩每服四錢水一盞薑七片煎服 又治伏暑引飲脾胃不和消暑丸用半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘艸半斤爲末薑汁麵糊丸梧子大每服五十丸熱湯下 又治中焦痰涎利

咽清頭目進飲食半夏泡七次四兩枯礬一兩爲末薑汁打糊或煮棗肉和丸梧子大每薑湯下十五丸寒痰加丁香五錢熱痰加寒水石煨四兩名玉液丸 御藥院方治膈壅風痰半夏半斤酸漿浸一宿溫湯洗五十遍去惡氣日乾爲末漿水搜作餅日乾再研爲末每五兩入生龍腦一錢以漿水濃腳和丸雞

頭子大紗袋盛避風處陰乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下 葉氏方治風痰溼痰青壺丸半夏一斤天

南星八兩各湯泡晒乾爲末薑汁和作餅焙乾入神麴半兩白朮末四兩枳實末二兩薑汁麴糊丸梧子大每服五十丸薑湯下 作三仙丸能化痰利氣

斗門方消痰開胃去胸膈壅滯用半夏洗泡焙乾爲末自然薑汁和作餅溼紙裹煨香以熟水二盞同餅一二錢入鹽五分煎一盞服之大壓痰毒及酒食傷極驗 機要又治結痰不出語音不清年久者亦宜玉粉丸半夏半兩桂心一字草烏半字爲末薑汁浸蒸餅丸芡實大每服一丸夜臥含嚙 活幼口議治小

兒痰吐或風壅所致或咳嗽發熱飲食卽嘔半夏泡
七次半兩丁香一錢以半夏末水和包丁香用麴重
包煨熟去麴爲末生薑自然汁和丸麻子大每服二
三十丸陳皮湯下 肘後方治胃寒霍亂腹脹用半
夏桂枝等分爲末水服方寸匕 又治產後暈絕半

夏末冷水和丸大豆大納鼻中卽愈此扁鵲法也

永類鈴方打撲瘀痕水調半夏末塗一宿卽沒 魏

元君方卒歿不寤用半夏末吹鼻中卽活 子母秘

錄治五絕急病一日自縊二曰牆壓三曰溺水四曰

魘魅五曰產乳並以半夏末納大豆一丸入鼻中心

溫者一日可活也 劉長春經驗方治吹奶腫痛半

夏一箇煨研酒服立驗一方以末隨左右嚙鼻効
篋中方治蝎蠱螫人用半夏末水調塗之立止

簡誤

半夏辛溫性燥而有毒雖能祛溼分水實脾開寒溼
痰氣鬱結痰而其所大忌者乃在陰虛血少津液不
足諸病故古人立三禁謂血家渴家汗家也故凡一
切吐血衄血咯血齒衄舌上出血金瘡產後失血過
多尿血便血腎水真陰不足發渴中暑發渴陽虛自
汗陰虛盜汗內熱煩躁出汗諸證皆所當禁者也然
三禁之外應忌者尙多茲更詳列於後凡咳嗽由於
陰虛火空上炎燥肺喉痒因而發嗽內熱煎熬津液