

# 本草彙言

七



# 本草綱目

## 九





皮木樨



合歡



棟實



刺藜



秦皮



皂莢



子烏



槐實



北京中醫藥大學圖書館藏





柳

無患子

檉皮

藥華木花

檉柳

肥兒菜

訶梨勒





蘇方木

榆皮

水楊

白楊

槐木

桑葉

烏柏木





桐聖子



梓白皮



巴豆



青桐



梧桐



大楓子

本草彙言卷之九目錄

本部 喬木類

黃蘗

厚朴

杜仲

黃燭木

椿

根葉

乾漆

海桐皮

棟實

皮根

槐實

槐花

枝木皮

葉根皮

樺木皮

秦皮

無食子

合歡

枝子

皂莢

皂莢子

皂莢刺

欖櫚皮

肥皂莢

無患子

莢核

藥華木花

訶黎勒

柳花

葉絮

檉柳

水楊枝葉

根皮

白楊

木皮

蕪夷

榆皮

樺木

蘇方木


烏柏木

巴豆

大楓子肉

梓白皮

楸白皮





青桐木 梧桐子 桐油

本時香木能

本草綱目卷之六目錄



南京中醫藥大學圖書館藏

本草彙言卷之九

錢塘

倪朱謨純字甫選集

男倪洙龍冲之氏

木部

喬木類

黃蘗味苦氣寒無毒氣味俱厚沉而降陰也入足太陰爲足太陽引經藥

別錄曰黃蘗出漢中山谷及永昌邵陵山東諸處蘇氏曰今取蜀中皮緊厚色深黃者爲上如永昌邵陵山東者薄而色淺黃者稍次樹高數丈葉似吳茱萸又似紫椿經冬不凋外皮淺黃其裏深黃其根名檀栢結塊如松下茯苓雷氏曰凡使削去粗皮用生蜜水浸半日晒乾用

○黃蘗濟坎降離之藥也稟至陰之氣而得清寒之性益

陰清熱仗此專功凡陰火攻冲骨蒸鬱熱小腹急疾用



此能抑陰中之火。濕熱不清。膝脛疼痛。步履艱難。用此能清濕中之熱。若夫上焦之火。攻發口舌。以致舌腫口破。或齒牙浮動。咽喉腫疼。是皆虛火之上浮也。下焦之火。蓄積大腸。以致下痢赤白。後重迫痛。或小便黃赤。淋瀝渾濁。或癃閉不通。脹滿阻塞。或腳氣攻冲。嘔逆惡心。或五疸壅塞。遍身發黃。是皆濕熱之下侵也。俱用黃蘗可以治之。設或陰分之疼。酒炒方効。骨間之痛。鹽製乃神。至于濕熱不清。酒炒可也。內火燔灼。生用可也。血弱陰虛。童便拌炒可也。此隨證製度。又不可不詳慎也。此藥固能除熱益陰。然陰陽兩虛之人。病兼脾胃虛弱。飲食減少。或宿食不消。傷食泄瀉。或腎虛天明。溲清。此

特痛或陽虛發熱津竭口乾或子宮虛冷血寒不孕或  
陽道衰微精寒不嗣或血虛發熱肌膚枯燥或產後瘀  
血停滯或金瘡將潰發熱或癰疽潰後發熱或血虛不  
眠陰虛煩躁等證法咸忌用。

○集方

陳月按方

治陰火攻沖骨蒸鬱熱用黃栢知母懷熟地地骨

皮麥門冬北沙參白芍藥各二兩茯苓北五味白朮各

一兩分作十劑清水煎服

東垣方

○治濕熱下流膝脛疼痛步

履艱難用黃栢蒼朮石斛茯苓木瓜牛膝烏藥當歸各

一兩俱用鹽水拌炒

方龍潭方

防風白朮各八錢分作十劑清水

煎服

○治火攻上焦

舌腫口破或齒牙浮動咽喉腫疼

並治用黃栢薄荷荆芥連翹半夏陳皮防風桔梗玄參



山豆根各一兩甘草四錢分作十劑清水煎服○治口

小口

疳臭爛用黃栢五錢銅綠三錢共爲末摻之去涎愈○

丹溪心法

治下痢赤白後重急痛晝夜無度用黃栢黃連枳殼厚

樸各一錢五分木通茯苓白芍各一錢甘草大黃各八

分清水煎服○治小便淋瀝不通或成白濁用黃栢車

馬端方

前子白芍藥各二錢甘草澤瀉各一錢瞿麥木通各三

錢水二大碗煎七分加白菓肉三十箇取汁沖入和服

霍氏晚香集

○治腳氣攻冲嘔逆寒熱用黃栢蒼朮厚樸川獨活青

用後方

皮牛膝木瓜柴胡茯苓各一錢清水煎服○治五疸遍

體發黃用黃栢秦艽各二錢茵陳五錢生薑五片水煎

服

厚樸味苦辛。氣溫。性燥。氣味俱厚。陽中之陰。降也。不足

陰。手足陽明經。

陶隱居曰：厚樸出交趾、寬谷及陝西、洛陽、江淮、湖南、蜀川、山谷中。今滑氏抄以建平、宜都及梓州、龍州者爲最。木高三四丈，經一二尺，木皮鱗皴，葉似桐葉，四季不凋。李氏曰：五六月間，細花紅色，結實如冬青子。生青熟赤，有細核，嚼之味甘美。寇氏曰：采樸以肉厚、色紫、多潤者入藥最良。今伊陽縣及商州亦有。肉薄而枯，色淡白，不紫者不堪用。雷氏曰：修治刮去粗皮，每一觔用生薑四兩，搗爛，拌微炒，方可入藥。如不製，則棘人喉舌。

○厚樸寬中化滯，平胃氣之藥也。凡氣滯于中，鬱而不散。

食積于胃，羈而不行，或濕鬱積而不去，濕痰聚而不清。

用厚樸之溫，可以燥濕，辛可以清痰，苦可以下氣也。故

前古主中風傷寒，頭痛寒熱，嘔逆瀉利，蟲積痞積，或肺

氣脹滿，痰涎喘嗽，或胃氣壅滯，水穀不行，用此消食化

痰去濕散脹平土金二藏以致于中和也時人有云厚  
樸益氣厚腸胃者蓋亦指邪氣去正氣自益之謂也  
消腸胃自厚之意耳非消導之外復有補益之功也  
者詳之

繆仲醇先生曰厚樸氣味辛溫性復大燥其功長于泄  
結散滿去濕逐飲溫暖脾胃凡一切飲食停積氣壅暴  
脹與夫冷氣逆氣腸鳴虛吼痰飲吐沫胃冷嘔逆腹痛  
泄瀉及元氣壯實之人偶感風寒寒熱飽脹氣實之人  
悞服參耆致成喘滿以上諸證誠爲要藥然而性專消  
導散而不收畧無補益之功實有消導之勢故凡嘔吐  
不因寒痰冷積而由于胃虛火氣炎上者腹痛因于血



虛脾陰不足而非停滯所致者泄瀉因于火熱暴注而  
非積寒傷冷者腹滿因于中氣不足氣不歸元而非氣  
實壅滯者中風由于陰虛火炎猝致僵仆而非西北真  
中寒邪者傷寒發熱頭疼而無痞塞脹滿之候者小兒  
吐瀉乳食發熱神昏將成慢驚者大人氣虛血槁見發  
膈證者老人脾虛不能運化偶有停積者產後血虛腹  
痛產後氣虛作喘產後吐逆泄瀉者以上諸證法所咸  
忌世人不究其原一槩濫用雖或一時未見其害而清  
純之氣默爲之傷耗矣可不慎哉

沈孔庭先生曰：厚樸辛、苦、溫，燥入脾胃二經，散滯調中。推爲首劑，然配他藥用，則泄。

用則泄



實滿故大柴胡湯用之。與陳皮蒼朮同用。則除濕滿。故平胃散用之。與人參白朮麥蘖同用。則治虛滿。故調中湯用之。又同半夏膽星能燥濕清痰。同甘草白朮能和中健胃。同枳殼萊菔子能下氣寬腸。同紫蘇前胡能發散風寒。同山查枳實能疎氣消食。同吳茱肉桂能行濕燥陰。實有理氣行氣之功。但氣之盛者用無不驗。氣之弱者宜少與之。

○集方治氣滯中焦鬱而不散。或成脹滿痞痛。用厚樸一錢五分。木香一錢。陳皮白朮各二錢。製半夏茯苓各一錢二分。甘草七分。水煎服。○治食積胃脘。羈而不行。致成脹悶痞結。用厚樸一錢五分。草萊仁砂仁各三錢。