


仙傳外科祕方

二



僊傳外科祕方卷之九

造九

僊傳外科祕方卷之十

造十

僊傳外科祕方卷之十一

造十一



南京中醫藥大學圖書館版權所有

劉軒林醫方卷之十一

上海涵芬樓影印正統道藏本

劉軒林醫方卷之六



南京中醫藥大學圖書館版權所有

仙傳外科集驗方卷之九

浚儀原陽子趙宜真集

造丸

發背形證品

癰發于背廣一尺深可一尺雖潰至骨不穿膜不死



此證因餘食而感其毒在脾肚之間急宜



蓮子發

用藥治脾肚中之毒內外夾攻之然脾易
 作臭急服喫藥初發用追疔奪命湯以能
 內消方見未後化毒消腫托裏散內托千金散
 中間敷解毒生肌定痛藥四圍敷拔毒散
 結果用生肌膏藥必定見效

造九



蜂窠發

此證發于右脾中恐其毒奔入心火大要用
喫藥散之敷點藥截住不令攻心如在
通背皆腫不可救之消者可療諸瘡痛痒
皆生於心以心主血而行氣走痛諸瘡皆
有王癰敷散就上可打火針三四針為妙
用前化毒消腫托裏散加 南星 草烏
木鱉 貝母 大蒜 生姜米醋調敷留
口二三日夜即消盡矣長長以醋潤濕

散走流注發

肌定痛散血恐毒氣攻心入膜必難治療
因心火未散故也

此證頭在上發最不宜治乃是反證却要
仔細用藥此名蜂窠發全在喫藥托裏生

造九



此俗諺鰲影之證殊不知醫方即無此說
鰲證生子之說背上不為鰲影之實毒氣
乘風熱而走是也此證因風盛而生熱之
極氣因熱之極氣因熱而走于四散急宜
踈風定熱則氣自然而息此藥用之如用
兵治之流注於手脚腿者必死無疑矣

腎俞發



腎俞雙發及脾癱

此證因受濕并怒氣飲熱酒而得之傷於
 內腎之間流毒在腎俞急宜用藥敷喫解
造九
 散內腎之毒更用生肌藥內外夾攻之若
三
 陰發傷腎膜者則有難治之患切戒怒氣
 行房稍或有犯決不可治慎之慎之



右搭肩發

此證下腎俞雙發因飲熱酒行房事怒氣受濕而得也陽發於外可治痰發陰發傷於腎膜膿稀者為虛難以治之必定死矣脾癰發於左膊之間初發可用燈火點破追疔湯汗之即散



左搭肩發

此證發於右搭肩骨上生者以動之處可
治難安串於左肩者必難治也用藥搽搽
依後左搭肩方



對心發

此證發於左搭肩骨上生者以動之處可
 治難安串於右搭肩者必難治也可用雞
 黃皮及紫焙乾為末濕則乾摻乾則用清
 油調搽之

造丸

四



蜂窠發

此證乃對心發因心火盛而熱氣會生於
此處其毒愈壯盛走之急用踈導心火之
藥解之然後以生肌藥愈矣



此證蜂窠發於曾乳間乃心火熱盛亦只
用依前踈導心火之藥稍治之遲則熱必

攻心必然死矣
頭後蜂窠發



此證發於頭後如是蜂窠者急宜救之若
焮赤腫痛起者好療痠發者必難治矣宜
用藥服敷急療之若或流於兩肩者決不
可療也

背發兩頭



造九

五

此證兩頭小者四邊散攻乃是因飲食之
 所致也而氣食相關合因虛而成之氣虛
 而散所以開口而開急服內消藥亦宜補
 陽也

兩脇癰疽發



兩邊髮際發

此證兩脇下成癰疽因虛而氣虛切不可
服補陽之藥蓋虛中而得決不宜受熱劑
倘受熱劑則虛熱愈盛易於傷骨膜切宜
慎之



腦後發

此證於頸後兩邊左右鬢髮邊發生者急
 宜救之如核發者急宜取去病根如腦心
 發者熱氣上攻于腦四畔邊焮赤腫硬連
 於耳項寒熱疼痛若不急療毒入於血肉
 多腐壞為膿水頭中而出血氣及痰發者
 難治主死矣



造九

六

