

黃帝內經

五

重廣補注黃帝內經素問卷第十三

啓玄子次注林億孫竒高保衡等奉敕校正孫鼎重訂

病能論

竒病論

大竒論

脉解篇

病能論篇第四十六

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰人病胃脘癱者診當何如岐伯對曰診此

者當候胃脉其脉當沈細沈細者氣逆四月者水穀之海其血盛氣壯今反脉

沈細者是逆常平也新校正云按甲乙經沈細作沈澁太素作沈細逆者人迎甚盛甚盛則熱

沈細為寒寒氣格陽故人迎脉盛人迎者陽明人迎者胃脉也胃脉備

之脉故盛則熱也人迎謂結喉傍脉動應手者入缺盆故云人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為

癰也

血氣壯盛而熱內蓄之兩氣合熱故結為癰也

帝曰善人有卧而有所不安者

何也歧伯曰藏有所傷及精有所之寄則安故人不

能懸其病也

五藏有所傷損及之水穀精氣有所之寄扶其下則卧安以傷及於藏故人不能懸其病處於空中也 新校正云

按甲乙經精有所之寄則安作情有所倚則卧不安太素作精有所倚則不安

帝曰人之不得偃卧者何

也

謂不得偃卧也

歧伯曰肺者藏之蓋也

居高布葉曰藏下之故言肺者藏之蓋也

肺

氣盛則脉大脉大則不得偃卧

肺氣盛滿偃卧則氣促喘奔故不得偃卧也

論

在奇恒陰陽中

奇恒陰陽上古經術名世本闕

帝曰有病厥者診右脉沈

而緊左脉浮而遲不然病主安在

不然言不沈也 新校正云按甲乙經不然作不知

歧伯曰冬診之右脉固當沈緊此應四時左脉浮而

遲此逆四時在左當主病在腎頗關在肺當腰痛也

以冬左脉浮而遲浮為肺病故言近關在肺也腰者腎之府故腎受病則腰中痛也帝曰何以言之歧伯曰

少陰脉貫腎絡肺今得肺脉腎為之病故腎為腰痛

之病也左脉浮遲非肺來見以左腎不足而脉不能沈故得肺脉腎為病也帝曰善有病頸癱者

或石治之或鍼灸治之而皆已其真安在言所攻則異所愈則同欲聞真

法何所歧伯曰此同名異等者也言雖同曰頸癱然其皮中別異不等也故下云夫

癱氣之息者宜以鍼開除去之夫氣盛血聚者宜石

而為之此所謂同病異治也息原也死肉也石硬石也可以破大癱出膿今以針鍼代之帝

曰有病怒狂者新校正云按太素怒狂作善怒此病安生歧伯曰生於陽

也帝曰陽何以使人狂怒不慮禍故謂之狂歧伯曰陽氣者因暴

折而難決故善怒也病名曰陽厥言陽氣被折鬱不散也此人多怒亦曾因暴折而心

不疏暢故爾如是者皆陽逆躁極所生故病名陽厥 帝曰何以知之歧伯曰陽明者常

動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也 言頸項之脉皆動不止也

陽明常動者動於結喉之傍是謂人迎氣舍之分位也若少陽之動動於曲頰下是謂天窓天牖之分位也若巨陽之動動於項兩傍大筋前陷者中是謂天柱天容之分位也不應常動而反動其者動當病也 新校正云詳王注

以天窓為少陽之分位天容為太陽之分位按甲乙經天窓乃太陽脉氣所發

天容乃少陽脉氣所發二位交互當以甲乙經為正也 帝曰治之柰何歧伯曰奪其食即

已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已 食少則氣衰故節去其食即病

自止 新校正云按甲乙經奪作衰大素同也 使之服以生鐵洛為飲 新校正云按甲乙經鐵洛作鐵落為

飲作為後飯 夫生鐵洛者下氣疾也 之或為人傳文誤也鐵洛味辛微温平主止下氣方俗或呼為鐵漿

非是生鐵液也 帝曰善有病身熱解墮汗出如浴惡風少氣此

為何病歧伯曰病名曰酒風 飲酒中風者也風論曰飲酒中風則為酒風是亦名漏風也夫極飲

歧伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦

逆故令頭痛齒亦痛夫腦為精主齒是骨餘腦逆反寒骨亦寒入故令頭痛齒亦痛病名曰厥

逆帝曰善全注人先生於腦緣有腦則有骨髓齒者骨之本也帝曰有病口甘者病名

為何何以得之歧伯曰此五氣之溢也名曰脾瘴謂

熱也脾熱則四藏同燥故五氣上溢也生因脾熱故曰脾瘴夫五味入口藏於胃脾為之行

其精氣津液在脾故令人口甘也脾熱內參津液在脾則口甘化餘精氣隨流口潤脾氣

故口甘津液在脾是脾之濕此肥美之所發也如校正云按此人必數食

甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其

氣上溢轉為消渴食肥則腸理密陽氣不得外泄故肥令人內熱甘者性氣和緩而發散逆故甘令人中滿然內熱則

陽氣炎上炎上則欲飲而監乾中滿則陳氣有餘有餘則脾氣上溢故曰其氣上溢轉為消渴也陰陽應象大論曰辛甘發散為陽靈樞經曰甘多食之令人

悶然從中滿以生之新校治之以蘭除陳氣也蘭謂蘭草也神農曰蘭草味辛熱平

正云按甲乙經消渴作消瘴利水道辟不祥留中痰厥也除謂去也陳課父也言蘭除陳又甘肥不化之氣者以辛能發散故也藏氣法時論曰辛者散也新校正云按本草蘭平不言

也熱帝曰有病口苦取陽陵泉口苦者病名為何何以

得之歧伯曰病名曰膽瘅亦謂熱也膽汁味苦故口苦新校正云按全元起本及太素無口苦取陽陵

泉六字詳前後夫肝者中之將也取決於膽咽為之使蘭

松曲論曰肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉肝與膽合氣性相通故諸謀慮取決於膽咽膽相應於咽為使焉新校正云按甲乙經曰膽

者中精之府五藏取決於膽咽為之使疑此文誤此人者數謀慮不決故膽虛氣上

溢而口為之苦治之以膽募俞胃腹曰募背脊曰俞膽募在乳下二肋外期門下同身寸之五

分前在脊第十椎下兩傍相去各同身寸之一寸半治在陰陽十二官相使中言六口法具於

止帝曰有瘥者一日數十溲此不足也身熱如炭頸

身羸瘦無用鏡石也

娠九月筋骨瘦勞力少身重又拒於穀故身形羸瘦不可以鏡石傷也

無益

其有餘者腹中有形而泄之泄之則精出而病獨擅

中故曰疹成也

胎約胞絡腎氣不通因而泄之腎精隨出精液內竭胎則不全胎死腹中著而不去由此獨擅故疹成焉帝

曰病脇下滿氣逆二三歲不已是為何病歧伯曰病

名曰息積此不妨於食不可灸刺積為導引服藥藥

不能獨治也

腹中無形脇下逆滿類歲不愈息且形之氣逆息難故名息積也氣不在胃故不妨於食也火之則火熱內滯氣化

為風刺之則必為其經轉成虛敗故不可灸刺是可積為導引使氣沫行久以藥攻內消痰積則可矣若獨憑其藥而不積為導引則藥亦不能獨治之

也 帝曰人有身體髀股胛皆腫環齊而痛是為何病

歧伯曰病名曰伏梁

以衝脈病故名曰伏梁然衝脈者與足少陰之絡起於腎下出於氣街循陰股內廉斜入膻中

循胛骨內廉並足少陰經下入內踝之後入足下其上行者出齊下同身寸之三寸關元之分俠齊直上循腹各行會於咽喉故身體髀皆腫環齊而痛名曰

伏梁環謂圓繞如環也 此風根也其氣溢於大腸而著於育育之原

在齊下故環齊而痛也 大腸廣腸也經說大腸當言迴腸也何者靈樞經曰迴腸出胃齊台環迴周葉積

而下廣腸附脊以受迴腸左環葉積上下辟大尋此則是迴腸非不可動

二言大腸也然大腸迴腸俱與肺合從合而命故通曰大腸也 之動之為水溺澇之病也 以衝脉起於腎下出於氣衝其上行者起於胸中上出齊下開元之亦故動之

則為水而溺澇也動謂齊其毒潔而擊動之使其大下也 帝曰人有尺脉

數甚筋急而見此為何病 筋急謂掌後尺中兩筋急也脉要精微論曰尺外以候腎尺裏以候腹中今尺

脉數急脉數為熱熱當筋緩反尺中筋急而見腹中筋當急故問為病平靈樞經曰熱即筋緩寒則筋急 歧伯曰此所謂

疹筋是人腹必急白色黑色見則病甚 腹急謂俠齊脈筋俱急以尺裏候腹

中故見尺中筋急則必腹中拘急矣色見謂見於面部也夫相五色者白為寒黑為寒故二色見病彌甚也 帝曰人有病頭

痛以數歲不已此安得之名為何病 頭痛之疾不當踰月數年不愈故怪而問之也

岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦

逆故令頭痛齒亦痛夫腦為髓主齒且骨餘腦此反病名曰厥

逆帝曰善全注人先生於腦緣有腦帝曰有病口甘者病名

為何何以得之岐伯曰此五氣之溢也名曰脾瘴脾

熱也脾熱則四藏同煎故五氣上溢也生因脾熱故曰脾瘴夫五味入口藏於胃脾為之行

其精氣津液在脾故令人口甘也脾熱內滲津液在脾胃故

故口甘津液在脾是脾之濕此肥美之所發也新校正云按太素發作致此人必數食

甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其

氣上溢轉為消渴食肥則膜理密腸氣不得外泄故肥令人內熱甘者性氣和一而發散逆故甘令人中滿然內熱則

湯氣炎上炎上則欲飲而隘乾中滿則陳氣有餘有餘則脾氣上溢故曰其氣上溢轉為消渴也陰陽應象大論曰辛甘發散為陽靈樞經曰甘多食之令人

新校正

悶然從中滿以生之新校治之以蘭除陳氣也蘭謂蘭草也神農

正云按甲乙經消渴作消瘴利水道辟不祥胃中痰癖也除謂去也陳謂久也言蘭除陳久甘肥不化之氣

者以辛能發散故也藏氣法時論曰辛者散也新校正云按本草蘭平不言

也熱帝曰有病口苦取陽陵泉口苦者病名為何何以

得之岐伯曰病名曰膽瘴亦謂熱也膽汁味苦故口苦新校正

泉六字詳前後夫肝者中之將也取決於膽咽為之使靈

女執力疑此為誤相通故諸謀慮取決於膽咽膽相應故咽為使焉新校正云按甲乙經曰膽

者中精之府五藏取決於此人者數謀慮不決故膽虛氣上

溢而口為之苦治之以膽募俞胃腹曰募背脊曰俞膽募在乳

分俞在脊第十椎下兩傍治在陰陽十二官相使中言治法具於

膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也

是陽氣太盛於外陰氣不足故有餘

也新校正云詳此十五字舊作文寫按甲乙經太素並無此文再詳乃是全元起注後人誤書於此今作注書

太陰脉微細

如髮者此不足也其病安在名為何病

瘳小便不得也瘦小便也頸膺如格

言頸與膺膺如格格拒不順應也人迎躁盛謂結喉兩傍脉動盛滿急數非常躁速也胃脉也太陰脉微細如髮者謂手大指後同身寸之一寸骨高脉動處

脉則肺脉也此正手太陰脉氣之所流可以候五藏也

歧伯曰病在太陰其盛在胃頗

在肺病名曰厥死不治

病瘳數瘦身熱如炭頸膺如格息氣逆者皆手太陰脈當洪大而數今太陰脈反微

細如髮者是病與脉相反也何以致之肺氣逆陵於胃而為是上使人迎躁盛也故曰病在太陰其盛在胃也以喘息氣逆故云頗亦在肺也病因氣逆證不相應故病名曰厥死不治也 此所謂得五有餘二不足也帝曰何謂五

有餘二不足歧伯曰所謂五有餘者五病之氣有餘

也二不足者亦病氣之不足也今外得五有餘內得

二不足此其身不表不裏亦正死明矣

外五有餘者一身熱如炭二頭膚如

格三人迎蹠盛四喘息五氣逆也內二不足者一病瘥一日數十渡二太陰脉微細如髮夫如是者謂其病在表則內有二不足謂其病在裏則外得五有餘表裏既不可馮補寫固難為治故曰此其身不表不裏亦正死明矣

帝曰人生而有病巛疾者病

夫白病者皆生於風雨寒暑陰陽喜怒也然始生有形未犯邪氣已有巛疾豈邪氣素傷邪故問之

名曰何安所得之
巛謂上巛則頭首也岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時其

母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為巛

疾也

精氣謂陽之精氣也

帝曰有病瘵然如有水狀切其脉大緊

身無痛者形不瘦不能食食少名為何病

瘵然謂面目浮起而色雜也大

緊謂如弓弦也大即為氣緊即為寒寒氣內薄而反無痛與眾別異常故問之也

岐伯曰病生在腎名為

腎風

脉如弓弦大而且緊勞氣內搖寒復內爭勞氣薄寒故化為風風勝於腎故曰腎風

腎風而不能食善

驚驚已心氣痿者死腎水受風心火痿弱帝曰善

大奇論篇第四十八新校正云按全元起本在第九卷

肝滿腎滿肺滿皆實即為腫滿謂脈氣滿實也腫謂肺之

雍喘而兩肢滿肺藏氣而外主息其脈支別者從肺系橫出腋上故喘而兩肢滿也新校正云詳肺雍肝雍腎雍甲乙經俱

作肝雍兩肢滿則驚不得小便肝之脈循股陰入髀中環陰器抵少腹上貫肝兩布脇肋

故肢滿不得小便也肝主驚駭故則則驚腎雍脚下至少腹滿新校正云按甲乙經脚下

脚下至少腹也脛有大小髀節大跛易偏枯衝脈者經脈之海與少陰之絡俱起於腎下出於氣

街循陰股內廉斜入膕中循脣骨內廉並少陰之經下入內踝之後入心脉足下其上行者出齊下同身寸之三寸故如是若血氣變易為偏枯也

滿大癰瘰筋孿心脉滿大則肝氣下流熱氣內薄筋乾血涸故癰瘰而筋孿肝脉小急癰瘰

筋孿肝養筋內藏血肝氣受寒故肝脉痿暴有所驚駭驚言其

迅急也陽氣內薄故發為驚也 脈不至若瘖不治自已 肝氣若厥厥則脈不通厥不至若瘖不治亦自已 腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓

皆為瘕 小急為寒甚不鼓則血不流血不流而寒薄故血內凝而為瘕也 腎肝并沈為石水 肝

入陰內貫小腹腎脈貫脊中絡膀胱兩藏并藏氣衝脈自腎下絡於胞今水不行化故堅而結然腎主水水冬冰水宗於腎腎象水而沈故氣并而沈名為石水 新校正云詳腎肝並沈至下并小

并浮為風水 脈浮為風下焦名水風薄於下故名 弦欲驚全元起本在厥論中王氏移於此

水并虛為死 腎為五藏之根肝為發生之主二者不足是生主俱微故死 并小絃欲驚 肝腎不足

故腎脈大急沈肝脈大急沈皆為疝 疝者寒氣結聚之所為也夫脈沈為實脈急為痛氣

實寒薄聚故為絛疝為疝 心脈搏滑急為心疝肺脈沈搏為肺疝 皆寒薄於藏故

世 三陽急為瘕三陰急為疝 大陽受寒血凝為瘕太陰受寒氣聚為疝 二陰急為癰

厥二陽急為驚 二陰小陰也二陽陽明也 脾脈 新校正云詳二陽脾脈急為瘕至此全在厥論王氏移於此

外鼓沈為腸澼久自已外鼓謂鼓動於臂外也肝脉小緩為腸澼

易治肝脉小緩為脾乘肝故易治腎脉小搏沈為腸澼下血小為陰氣不足搏為陽氣乘之

熱在下焦故下血也血温身熱者死血温身熱是陰氣喪敗故死心肝澼亦下血肝藏血心養血

故澼皆下血也二藏同病者可治心火肝木木火相生故可治之其脉小沈瀉為腸澼

澼心肝脉小而沈瀉者澼也其身熱者死熱見七日死腸澼下血而身熱者是火氣內絕去心而歸於

外也故死火成數七故七日死胃脉沈鼓瀉胃外鼓大心脉小堅急皆鬲

偏枯外鼓謂不當尺寸而鼓擊於臂外側也男子發左女子發右陽主左陰主右故

曰左右者陰陽之道路此其義也 不啞舌轉可治三十日起偏枯之病瘖不能言腎與胞脉內絕也胞脉繫

於腎腎之脉從腎上貫肝兩入肺中循喉龍俠脊本故氣內絕則瘖不能言也 其從者瘖三歲起從謂男子發左女子

發右也病瘖左右而瘖不能言三歲治之乃能起 年不滿二十者三歲死以其五歲始定血氣方剛藏始定則

易傷氣方剛則甚可二
傷甚貴故三歲死也 脉至而搏血衄身熱者死 血衄為二脉不
應搏今反脉搏

是氣極乃 然故死 脉來懸鉤浮為常脉 以其為血衄者之常脉也 脉至如喘名曰

暴厥 喘謂卒來盛急去而 便衰如人之喘狀也 暴厥者不知與人言 所謂暴厥之候如此 脉至

如數使人暴驚 脉數為熱熱則 內動肝心故驚 三四日自已 數為心脉木被火 干病非肝生不與

邪合故三日後四日自除 所以兩者木生數三也 脉至浮合 如浮與之合後至者凌 前速疾而動無常候也 浮合如

數一息十至以上是經氣予不足也微見九十日死

脉至如火薪然是心精之予奪也草乾而死 薪然之火 淡營幣不

定其形而 便絕也 脉至如散葉是肝氣予虛也木葉落而死 散如

葉之隨風不常其狀 新校 正云按甲乙經散葉作叢棘 脉至如省客省客者脉塞而鼓是

腎氣予不足也懸去棗華而死 脉塞而鼓謂纔見不行旋復去 也懸謂如懸物物動而絕去也