

百代医宗

三



南京中医药大学图书馆版权所有

鼎錄太醫院頒行內外諸科方論百代醫宗卷之三

金谿 省吾 徐紳 著述

太醫院 醫官 繡谷 振吾 張文英 參訂

金陵 少泉 李潮 刻行

風論

中風之疾原因體虛騰理踈漏由是風邪乘之非惟肝木風實亦非外邪獨勝之耳河間曰良由將息失宜心火暴甚腎水衰不能制之則陰虛陽實熱氣怫鬱心喪神失而筋骨不為用卒倒僵仆不知人事也兼有喜怒思悲恐之五者夫五志過極元精虛弱而卒中風疾者所謂非外來風邪槩可明矣有氣虛血虛者有痰盛者有挾火與濕者皆能作暴仆暴瘖歪僻癱瘓等症其皆先傷于內而後感於外邪也外邪既有侵侮之乘未必絕無內傷者也風之為症有四者焉曰偏枯半身不遂曰風痺身無疼痛四肢不收曰風懿奄忽不知人曰風痺風痺也者風寒



濕合而為痺脉浮而緩筋骨痿弱肢體麻痺不仁又有飲酒中風謂之
漏風則身熱怠惰汗出少氣澹所以養陽酒入於胃與谷氣相搏熱盛
于中陽氣俱洩腠理踈豁風邪襲之與中風之症並似風懿脉短而滑
或洪而數內熱外汗法當清解消痰祛風為主及其內風名曰勞風由
房勞虛損真氣內虧風邪從此入病源從此生可不知謹乎金匱論曰
天有八風經有五風八風發邪以為經風觸五臟邪氣發動八風之過
曰偏風腦風目風漏風內風首風腸風泄風此八風者皆中臟腑也其
類中風之狀其身温多痰涎風之中于腑者有表症在焉面顯五色脈
浮而惡風寒拘急不仁中于臟者有裏症在焉大小便秘結唇緩失音
鼻塞耳聾目瞽中血脉者口眼喎斜言語騫澁中氣者謂其身冷氣厥
無痰此因氣之暴逆而致氣復則已不藥可安大抵中腑多着四肢
症易治大臟多滯九竅其症難治中腑宜汗中臟宜下雖有汗下之
亦不可太過猶恐汗多亡陽下多亡陰其所重於外感者先祛邪

補中氣重於內傷者先補中氣後祛外邪或有六脈浮滑虛軟而無脈者中風暈厥之症可指日而作矣兩寸口脈浮大而實者多用瓜蒂散蘆吐之人迎緊盛六脈浮弦者宜小續命湯主之以表之法為確論矣中於肝經人迎與左關脈浮而弦者面目多青惡風自汗左脇偏痛口中於心經人迎與左寸口脈洪而浮者舌赤俱赤翕翕然發熱瘡不能言中於脾經人迎與右關脈浮微而遲者四肢怠惰皮肉潤動身體通黃中於肺經人迎與右寸口脈浮濇而短者面浮色白口燥多喘中於腎經人迎與左尺脈浮而滑者面耳黑色腰脊痛引小腹隱曲不利若中於胃兩關脈並浮而大額上多汗膈塞不通食寒則泄或挾於寒則脈帶浮遲挾於濕則脈帶浮濇各宜精詳而用藥焉又曰中風之人雖五臟六腑俱受其邪惟肺肝二經居多肺為皮毛之合風邪乘虛而入肝主筋東方風木相搏其邪乘虛內客則筋緩而喎斜癱瘓之狀見矣其左癱右瘓者因氣血俱虛而痰火之流注血虛者則痰火流注于左

曰左癱也氣虛者則痰化流注於右名曰右瘕也左癱用補血散痰火之藥兼施右瘕用補氣散痰火之藥兼用此症最宜蚤治恐痰化鬱結于中更難調理如左半身不遂百以四物湯補血之藥爲主大率多痰且左屬瘀血少血加桃仁紅花竹瀝薑汁之類如右半身不遂者以四君子湯補氣之藥爲主大抵有痰有熱及氣虛弱以二陳湯加竹瀝薑汁之類施用如氣血兩虛者以八物湯爲主挾痰加南星半夏枳實薑汁有氣虛卒倒者以參芪補之有遺尿者亦因氣虛用補氣之藥以扶之有痰壅盛者有口眼喎斜者有不能言語者俱用吐法輕者瓜蒂稀涎散等或用鵝翎探而吐之痰吐則已一吐不已再宜吐之重者用藜蘆三分或五分射香少許合而待用其口噤昏迷者用前藥灌入鼻中嚏吐爲驗氣血俱虛者切不可吐况荊竹二瀝是痰中之要藥且肥白之人多濕少加烏頭附子行經二藥俱用童便煮過置地中出火毒庶不傷人瘦人陰虛火動者用四物湯加牛膝竹瀝黃芩黃柏知母以溫

其火及荆竹瀝俱有開經絡行氣血之功。能取效。凡中風之症不可驟用龍腦牛黃射香等藥。恐引風氣深入骨髓。如油入麪不可得。龍腦入腎治骨。牛黃入肝治筋。射香入脾治肉。其出處未可不知。又不可用大戟芫花。其遂以洩大腸之經。故大便過損陰血。而真氣愈虛矣。大要風疾。脈宜浮遲。不宜強大。急數或脾脈緩而無力者。蓋風歸肝水。而水尅脾土。最爲難治。因大便洞洩之故也。又曰。西壯二方風寒大盛之地。直中風之症。蓋有之矣。東南二方氣溫而地多濕。濕土生痰。痰生熱。熱生風。故也。醫家不可不因地而推之。但人之大指。次積有麻木不仁之兆。三年內必有大風至也。不可不審。大抵風之爲病。日淺當順。日久當活血行痰。爲先祛風。爲要治風。良劑小續命湯。爲主排風湯。之然。二湯主風。不主氣。雖用人參順氣散。烏藥順氣散。佐助之。其間氣一流。通風亦踈散矣。其有不治之症。可以外驗。口張手軟。眼合遺尿。沫直視。喉如鼾聲。肉脫筋痛。髮直。槌頭面赤如火。諸如此類。皆不治。

症也學者用心詳察毋得苟求其財以辱仁術幸高明君子諒之

該傳大附子性

夫附子之性稟其雄壯之資有斬關奪將之勢能引人參行於十二經道復其散失之元陽又能引麻黃杏仁發表開腠理祛散其在表之風寒又能引芎歸芍藥入行養血以滋補其虧損之真陰有此數端之功會當玩熟

通關散 治中風邪牙關緊閉昏悶不知人事湯水不下者

細辛一錢

猪牙皂角

去子一錢

右共為細末用少許吹入鼻中嚏噴後認症用藥一方加半夏一錢

稀涎散 治中風昏悶四肢不收氣閉不通槁榻等症

光明淨礬

一兩

猪牙皂角

四箇去淨黑皮及子

右為末每用五分溫水調下服至一錢無害吐痰為驗

破棺散 治中風牙關緊急無門下藥



天南星

五分

射香

少許

右五月五日午時合藥每用少許擦牙令熱自然見開

小續命湯 治中風外有六經之形症以此主之

麻黃

去節

人參

黃芩

白芍

川芎

防已

桂枝

各七分

防風

一錢

大附子

童便煮去脂

杏仁

去皮尖

甘草

炙各七分

右水一鍾半煎至一鍾溫服取微汗加減法於後

其人素肥熱者去附子加白附子或加秦艽五分

筋急拘攣語遲眩者加薏苡仁去黃芩白芍以避中寒服藥后稍輕

再加當歸若煩燥不大便去附桂倍白芍竹瀝如大便三五日不通腹

中不快加枳殼大黃如言語蹇澀手足顫掉加菖蒲竹瀝如發渴去附

子加麥門冬葛根瓜蒌根身體痛加羌活汗多者去麻黃恍惚錯語加

茯神遠志不得睡加酸棗仁虛人無力者去麻黃加人參無汗惡寒水

方倍麻黃杏仁防風其名麻黃續命湯有汗惡風本方倍桂枝芍藥



仁其名桂枝續命湯無汗身熱不惡風本方倍桂枝菴苓再加葛根二兩其名葛根續命湯無汗身涼本方倍附子甘草再加乾薑其名附子續命湯有汗無熱本方倍附子桂枝亦名桂枝續命湯并其加減附子續命湯三化湯 治中風外有六經之形症內有便溺之阻滯先用加減續命湯後用此導之

厚朴 大黃 枳實 羌活 各等 右切一劑微利而已

羌活愈風湯 治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏或瘦一肢偏枯或肥半身不遂內邪除外邪盡當用此藥行道導諸經久服大風悉去未可失於通塞如初覺風動以此主之萬無一失

羌活	甘草	防風	黃芪	人參	蔓荊子
川芎	細辛	枳殼	麻黃	知母	獨活
地骨皮	白芷	杜仲	秦艸	柴胡	半夏
厚朴	防已	熟苳	前胡 <small>各二</small>	白芍	黃芩



白茯苓

各三兩

石膏

生草

蒼朮

各四兩

桂

右切一兩如法煎服一方有薄荷當歸甘菊花枸杞子

大秦羌湯

治中風外無六經形症肉無便溺之阻血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語此藥主之

秦艽一錢

甘草五分

當歸一錢

川芎八分

白芍一錢

細辛

五分

羌活一錢

獨活一錢

防風一錢

黃芩五分

石膏一錢

白芷一錢

白朮一錢

生草八分

熟草八分

白茯苓

八分

右如法切一劑煎服

如心下痞悶加枳實一錢

祛風至寶丹

治中風臆痰涎昏冒及諸風熱等症

防風

白芍

各一兩

石膏

黃芩

桔梗

熟地

天麻

人參

羌活

獨活

川芎

當歸

各二兩

滑石

三兩

甘草

一兩

白朮

二錢

連翹

荆芥

薄荷

麻黃

用根

芒硝



黃連

大黃

黃柏

細辛

全蝎各五

梔子仁六錢

右為細末煉蜜丸如彈子大每用一丸臨臥細嚼溫酒送下

防風通聖散

治諸風熱譫妄驚狂腸胃燥結骨節麻痺卒中僵仆語不

出聲傷寒疫癘腸風痔漏及破傷風腹急痛諸瘡毒等症此方為治熱

燥之藥以苦寒而泄其熱燥之陽

防風

川芎

當歸

白芍

薄荷

大黃

連翹

麻黃

芒硝各五錢

石膏

黃芩

桔梗各一兩

滑石三兩

甘草二兩

荆芥

白朮

梔子仁各三錢

右為末每服三錢或切一劑生薑水煎服 如有涎嗽加半夏五錢

白 防風荆薄荷麻黃稍梔子黃芩大黃硝白朮桔梗甘草滑石藥

加石膏



龍星丹 治諸風熱痰延壅盛以此主之

牛膽南星三錢 片腦另研三字 牛黃另研三字

全蝎

防風

薄荷各一錢 黃芩二錢 黃蓮一錢

青黛另研一錢

硃砂三錢

右為細末煉蜜九如龍眼大每用一九啗化

正舌散 治中風舌本強硬語言不正以此主之

蝎稍去毒二錢五分 茯神二兩 薄荷一兩

右為細末每用一錢或二錢温酒調服

牽正散 治中風口眼歪斜半身不遂以此方主之

白附子 白殭蚕 全蝎去毒生用

右等分為末每用二錢熱酒調不拘時服

換骨丹 治中風癱瘓口眼歪斜半身不遂一切風癩諸風等症

詩曰 我有換骨丹 傳之極幽秘 踈濶病者心 扶起衰翁臂

氣壯即延年 神清目不睡 南山張仙翁 三百八十歲



修合此藥時 味味要精製 夜臥服一九 遍身渾津液

萬病自消除 神仙為伴侶

麻黃煎膏 仙木 槐角子 桑白皮 川芎

白芷 威靈仙 人參 防風 蔓荊子 各五錢

何首烏一 苦參五錢 五味子五錢 檳木香五錢 射香少許

龍腦少許 硃砂不拘多

右為末 桑白皮另搗為細末 用麻黃膏和就杵一萬五千下 每兩分作十九丸 每用擊碎一丸 溫酒浸用物蓋之 不可透風 氣食後臨臥溫酒且化服之 衣蓋密當自汗出為度

麻黃膏法 擇乙卯旺相日 採麻黃一秤 去根 取東流水三石 三斗無油 鍋量大小 盛五七斗者 先煮五沸 掠去渣 逐時添水 盡至三五斗 以去麻黃 淘又盆中澄定 用細羅濾取清者 且熬至一斗 再澄 半為度 只用物杖頻攪動 勿著鍋底 恐焦壞了 澄時必真



勿使塵土相侵任貯無害但熬時每要忌鷄大婦人如膏太稠用

量再熬亦好凡中風卒倒加此藥膏同煎他藥其功尤捷

烏藥順氣散 治一切風注氣攻男子婦人四肢骨節疼痛肢足頑麻

足癱瘓言語蹇澁者先宜用此藥踈通道隨後進以風藥凡氣上升

逆下降為順所以順氣者謂其降氣也其義通

麻黃

去根節

陳皮

去白

烏藥

各二兩

僵蚕

去嘴炒

川芎

枳壳

甘草

白芷

桔梗

各一兩

乾薑

炒五錢

右切一劑薑葱同煎服

化風丹 治一切中風痰厥風癱牙閉緊急不省人事小兒驚風搐搦

弓反張發熱痰喘氣促並宜治之

牛膽南星

天麻

煨

防風

荆芥

羌活

獨活

人參

細辛

川芎

右丸味各一錢其為細末煉蜜艾實大硃砂為衣每用一丸薄荷煎湯



研化送下如氣惱紫蘇湯化下 如牙緊口噤用藥少許擦牙開在片
時矣一方加木香尤効

攝生冊 治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰逆厥氣之類並宜
治之

蒼朮 生用 一錢 南木香 五分 南星 煨 一錢 五分 半夏 製 一錢 五分 細辛 一錢

石菖蒲 一錢 甘草 生用 一錢 以盛者加全蝎二個

右切一劑法煎服

防風至寶冊 治中風痰涎壅盛口眼喎斜四肢癱瘓麻木不知痛癢不
能動履身若無骨者以此治之

當歸 一兩 川芎 四錢 白芍 一兩 防風 一兩 羌活 一兩

天麻 一兩 僵蚕 一兩 白芷 八錢 青皮 八錢 陳皮 一兩

烏藥 一兩 牛膝 一兩 南星 一兩 半夏 一兩 黃連 薑汁炒 一兩

黃芩 酒炒 一兩 梔子 炒 一兩 連翹 一兩 麻黃 五錢 久病者不用 甘草 二

其南星半夏用白礬牙皂生薑煎湯浸三日為度右切一兩五錢

煎服早晚各一服忌葱蒜

七聖散 治風濕流注經絡肢節緩縱不隨脚膝疼痛等証

續斷

獨活

防風

杜仲

草薢

牛膝

酒浸

甘草

右焙乾等分為末每服二錢溫酒調下

搜風定痛丸 治中風左癱右瘓手足顛掉言語蹇澁用此方治之

草烏

炮四兩

川烏

炮四兩

乳香

研一兩

沒藥

研一兩

生烏豆

一斤

斑猫二十一個去頭足同烏豆煮熟去斑猫頭烏豆焙為末入前藥中

用右共為末醋糊丸如梧桐子大每服三十九丸不拘時溫酒下

烏頭湯 治風寒冷濕留痺筋脉拘攣不得轉側並宜此藥治之

大烏頭

細辛

川椒

去目

甘草

秦艽

附子

官桂

白芍

各十分

乾薑

五分

白茯苓

八分



防風 八分

當歸 八分

獨活 七分

右切一劑棗二枚水煎服

全安散 治鷄爪風手足搖動不能舉物宜用此藥

五加皮

海桐皮

川烏 炮

牡丹皮

川芎

赤芍

各五錢

乾薑

肉桂

各五錢

右為末每用三錢用古銅錢一文入清油內浸一宿毋煎藥入此銅錢

同煎不拘時服

追風丹 治白癱風

蒼朮

米泔水泡七日切片炒

何首烏

荆芥穗

苦參

各等分

右為末用皂角去皮弦置磁碗內文火熬膏為丸如梧桐子大每服三五

十九空心茶酒任下每忌動風之物

靈應丹 治癱瘓四肢不舉風痺等症

麻黃膏

葉白皮

白芷

蒼朮

甘松

