

女科萬金方三



摘錄鄭氏家傳女科萬金方卷叁

安胎飲

白朮

茯苓

地榆

甘草

熟地

當歸

川芎

白芍

艾叶

黃芪

阿膠

加生薑三片

朮砂散

治胎漏下血

白朮

砂仁

炒

阿膠

珠蛤粉

各三兩

加條芩

五錢

蒲黃

斟酌

加每服二

錢

艾湯調下

子煩

問妊娠子煩者何藥答曰口乾煩悶不得卧者此名子煩也按經云四月受少陰君火以養精六月受少陽相火以養氣所以此兩月多苦煩悶舍此而煩悶者由母調理失宜七情傷感心驚胆怯所致服麥冬湯或用竹叶湯或紫蘇飲主之

麥冬湯

人參錢五 麥冬去心 防風 白茯苓各一兩

右㕮咀 每服四錢 水鍾半 加生薑五片 淡竹叶十片 溫服 亦用

竹叶湯

白茯苓

防風

麥冬

黃芩

各二錢

加

竹叶

五片

子腫 問妊娠子腫者何藥答曰宜用白朮散或用紫蘇飲

白朮散

白朮一大腹皮

陳皮

茯苓

薑皮各五錢為末米飲下

紫蘇飲見前

問妊娠胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛者何藥答曰此名子懸也亦用

紫蘇飲方見前

子癰 問子癰者何藥答曰砂仁湯又附方

人參 白朮 橘紅 麥冬 甘艸 茯苓 厚朴 竹茹

加生薑煎服

子淋 問子淋者何藥答曰妊娠淋者胞繫于腎腎間虛熱而成淋疾甚者心煩悶亂故名之子淋也以安胎和氣飲或安榮散及內補湯治之

安胎和氣飲

白朮

陳皮

白芍

木香

加薑三片陳米一撮

安榮散

見前論

肉補湯

見上卷月水淋漓條

惡阻

問婦女經停二三月身安似病而脉滑大六部俱勻乃是妊娠候精神如

故惡聞食氣獨嗜一物或嘔吐痰水如何治法答曰此名惡阻切勿作

寒病治宜服保生湯

保生湯

人參

茯苓

白朮

甘草

陳皮

麥冬

厚朴

加薑煎

一方去陳皮麥冬厚朴茯苓加香附烏藥橘紅各五錢惡心嘔

吐加丁香生薑煎服

按產寶方云妊娠惡阻謂之子病由婦人稟受怯弱或有風氣或有痰飲既妊便有瘧是症其狀面色如故脉息和順但覺肢體沉重頭目昏眩惡聞食氣好食酸醎甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水胸膈煩悶恍惚不能支持但痰有輕重耳輕者不服藥亦可重者須以藥療之千金方半夏茯苓湯茯苓丸二方專治惡阻然此藥近來鮮

有服者以半夏有動胎之性蓋胎初結憲其易散不可不謹也

一方治惡阻嘔吐清水甚至害十餘日漿粥不入者用

白朮^{一兩}丁香^{二錢}人參^{五錢}甘艸^{一錢}生薑^{三片}

水腫問妊娘脾虛通身浮腫心腹飽滿腸鳴小便不利者何藥答曰用防己

湯

防已湯

防已半錢桑白皮

赤苓

蘇叶錢各二木香五

煎服

傷寒問姪娘傷寒者何藥答曰天時嚴寒體虛為寒所觸輕者為寒所觸漸

漸惡寒翕翕發熱微欬鼻塞數日乃愈重者頭疼體痛先寒後熱久而

不愈則傷胎凡姪婦傷寒仲景無治法用藥有避忌不可與尋常婦女

一 概治之而鄭氏之方若頭痛身熱無汗脉浮緊者用四物湯加麻黃
細辛治之若過經不愈溫毒發癍如錦紋者四物加升麻連翹防風黃
芩柴胡治之發斑而滿者非人參白虎湯不治若斑不透而隱者元氣
不足故也宜大加人參則復出矣如兩感重者十神五積散皆可輕者

養胃湯

四物湯見前

人參白虎湯

人參知母

石膏

甘草

粳米

五積散見上卷經水過期條

養胃湯

見前

痰癰寒多者可加熟附子

難產問難產橫產逆生累日不下者何法答曰用催生丹及催生如聖散或

八珍湯加童便亦何

催生丹

即兔腦丸

一方內有麝香一分

乳香

一錢另研

母丁香

一錢兔腦

一具臘月者佳

去衣膜同上二味研勻

右為丸如雞頭大陰乾每服一九溫酒送下

催生如聖散

用黃葵子末不拘時送下三錢此催生之聖藥也

問欲產未產者何藥答曰此氣逆也當順其氣自安用來甦散

來甦散

見前十八論內

傷胎 問妊娠跌撲傷損其胎當下安當者何藥答曰當驗舌以投劑只是安

胎為上 又方跌仆損傷瘀仆瘀血胸脇作痛者用之

當歸

川芎

陳皮

紅花

枳殼

破故紙

丹皮

赤芍

甘艸

官桂

加童便酒煎

夫妊婦驚胎者是月其胎將滿神形已具或臨產之時從高墜下傷損

胞絡致血下行胎動遂搶上心胃氣絕不醒其母面赤舌青口無涎出

者兒死母活若唇口俱青涎沫出者母子俱亡面青舌赤涎沫者母死