

金匱啟鑰

準繩云痢不納食。或湯藥入口。隨即吐出。俗名噤口。多因邪留胃氣。

伏而不宣。脾氣滯而不布。故嘔逆而食不得入也。有陽氣不足。胃中。

宿食未消。則噫而食不得下者。張石頑主只寔理中加砂仁。有肝乘。廣皮木香豆蔻山查麴蘖。

脾胃發嘔。飲食不入。縱入亦反出者。石頑戊己丸。加水飲所停。氣急。加木香肉桂。

而嘔。穀不得入者。石頑曰水飲停聚。心下悸。動不寧。五苓散加薑汁。有火炎熾。內格嘔逆而。

不得入者。石頑主黃連解毒去。黃柏加只亮木香。有胃氣虛冷。食入反出者。石頑論。治在後。有。

胃中邪熱。不入食者。石頑曰胃虛挾熱而。嘔逆不食者連理湯。有脾胃虛弱。不欲食者。石頑。

論治。有穢積在下。惡氣薰蒸而嘔逆。食不得入者。石頑主大黃黃連。瀉心湯加木香。

在後。有穢積在下。惡氣薰蒸而嘔逆。食不得入者。石頑主大黃黃連。瀉心湯加木香。

脾胃不弱。頭痛心煩。手足溫熱。未多服涼藥者。此乃毒氣上沖心肺。

所以嘔而不食。

石頑至甘草瀉心湯去大棗易生薑此証胃中有熱不可用溫藥

按張石頑遵正治

準繩而代爲之擬治法。而歸重於胃氣虛冷。脾胃虛弱兩條。曰丹溪

用人參黃連湯法。但石連子真者絕少。乃粵中草寔僞充。大苦大寒。

予嘗以藕汁煮熟。稍加砂糖頻服。兼進多年陳米稀糜。調其胃氣。必

效。卽石連子之意也。古治噤口痢。多有用黃連者。苦而且降。不能開

提。非胃虛所宜。大抵初痢噤口。爲熱瘀在胃口。故宜苦燥。若久痢口

噤。不食。此胃氣告匱。非比初痢噤口。尚有濁氣可破。積沫可驅。惟大

劑參朮。左以茯苓炙甘草。薑木香。畏乾薑之屬。大補胃氣。兼行華液。

緩緩調補兼疏滯氣。方爲合劑。如茯苓之寒。滲木香之耗氣。乾薑之行津。皆當屏除也。朱丹溪用人參黃連糯米薑汁湯。細呷之神效。如吐再作服之。但得一呷下咽便開。按此主治濕熱在胃者也。楊仁齋用參苓白朮散。加石葛蒲。以道地糯米飲乘熱調下。或用人參茯苓石連子肉。入些葛蒲與之。按此主治胃虛者也。戴復菴用治中湯。加木香半錢。或砂仁一錢。此主治胃寒而氣逆者也。準繩云。在下則纏綿。在上則嘔食。當認其寒則溫之。熱則清之。虛則補之。按痢疾不食。當初病時。右脈渾渾浮大。或浮弦。胸膈痞滿。乃濁氣上壅也。宜降。

逆氣只朴陳皮枳櫚之屬。有火兼連芩木香。有食加查麴。有表証者。合香蘇散。及對証發散藥。脈洪大急滑者。火也。清降之。芩連只朴之屬。有痰加半夏生薑汁。脈滑嘔者。痰也。二陳湯加薑汁。虛加人參。寒加乾薑。熱加芩連。右脈浮弱。沉細或緩。胃虛也。異功散加木香。少佐石膏。若脈遲者。胃寒也。理中湯加陳皮。虛而氣逆者。木香異功散。脈沉滑。或右關滯濇。噫不能食者。有宿食也。香砂只寔麴蘗。或大健脾丸。胃虛挾熱不食者。其脈稍急而無力。橘皮竹茹湯。冷熱不調者。連理湯。凡邪在胸膈。必然痞滿。虛亦痞滿。然摠不若寔滿之甚也。周慎齋曰。下痢以胃氣爲本。胃失生長。故惡物而不飲食。無分何物與。

不能食而嘔。其有晝夜不止百度。反脈靜身涼而能食何也。曰痢之邪客於下焦。由橫連竟傳大腸。原無反熱之理。以中焦無病。雖下痢無度。不得飲食。惟邪發於中焦。由橫連入胃。以胃受病。故不欲食也。

証治歌

邪留脾胃氣不通。嘔逆俗名噤口成。宿食未消陽不足。食不得下噫相攻。只是理中。湯加山查神麴。廣皮木香。豆蔻砂仁。肝腎脾胃而發。嘔食入反出。証更凶。戊己丸中加芍藥。肉桂還與木香馨。水停氣急嘔且悸。汁取生薑入五苓。散。火炎內格黃連解。毒湯去。黃柏加只。亮。

木香同。胃虛挾熱嘔不食。連理湯投可見功。更有嘔逆食不入。穢積在下惡氣薰。大黃黃連瀉心妙。加入木香積穢清。脾胃不虛手足熱。心煩頭痛毒上冲。甘草瀉心湯去大棗。生薑宜入任調停。胃氣虛冷脾胃弱。古人論治有明徵。人參黃連傳呬法。所患石連絕少真。不如藕汁煮熟好。加入砂糖法最工。多年陳米稀糜進。胃氣調和效最神。古用黃連治噤口。苦而且降不能升。初起濁氣尚可破。痼久胃虛豈等倫。惟有大劑參朮好。茯苓甘草可爲臣。藿木香與煨乾薑。大補胃氣津液行。胃氣一轉食稍進。獨參湯進莫逡巡。暑加陳皮或香附。製

宜。參黃通。糯米與人參薑汁煎湯。細細呷。如吐服之。效可。憑胃虛。

參苓白朮散。糯米菖蒲。乘熱蒸。或用

人參 茯苓

石連肉。少入菖蒲法。

可遵。胃寒氣逆。治中

湯好 木香

牛小

砂仁

一不

加藥勻。初起胸膈多。

痞滿。浮大浮弦脈。可尋。宜降逆氣。爲長策。藥用陳皮。只朴。枳。

椰食加

山查與神麴。火加木香與連芩。表証須合香蘇散。對証發散。藥分明。

洪大急滑脈。爲火。清降芩連。只朴。從。若兼有痰。仍前藥。半下生薑汁。

可增。脈滑而嘔。有痰証。二陳湯加薑汁。靈熱加芩連。虛參朮。寒加乾。

薑。勿畏辛。胃虛右脈必多緩。或兼浮弱細且沉。異功散內菖蒲佐。加。

入木香。虛自盈。脈遲胃寒。理中

湯

善。加以陳皮。寒可平。虛而氣逆。宜。

何藥。木香異功散不羣。噫不能食。脈沉滑。右關滯。滯宿食凝。香砂只
寔麴蘖並。大健脾丸效亦宏。胃虛挾熱不能食。橘皮竹茹湯可庸。冷
熱不調如何治。湯用連理莫因循。總之痢以胃爲本。惡物不食。胃失
生。胃氣若勝。物隨與。自然全愈。氣回春。不食能食。還須辨。中焦原與
下焦分。痢之邪客下焦者。橫連竟傳大腸中。下痢雖數。偏能食。中焦
無病故無凶。至於邪自中焦發。橫連入胃。不相蒙。下痢雖少。食難入。
胃自受病是原因。

方歌

只寔理中湯即理中丸
芩苓只寔二味增中寒食滯結胸証此
藥服之自安然。

木香異功散

木香異功散獨良。白朮人參甘草木香。茯苓原與陳皮合。虛而
氣逆異功彰。

大健脾丸

大健脾丸人參白朮茯苓當歸青皮白蔻木香川連陳皮山楂

只寔谷芽並管教脾健氣回春。

橘皮竹茹湯

橘皮竹茹湯

治虛熱人參

冬甘草

枇杷葉

薑汁

半下竹茹橘

與赤苓寔去人參功獨捷

香蘇散

治外感風寒內傷飲食宜隨証加減

香蘇飲內紫蘇陳皮

香附甘草加薑蔥邪重羌活

防柴胡乾

葛入消積山楂麴蘖全

黃連解毒湯

理中湯

五苓散

均見六經

異功散

參苓白朮散

均見

治中湯

春必病溫

甘草瀉心湯

傷寒變証

大黃黃連

瀉心湯

見太陽

連理湯

戊己丸

二陳湯

均見痼瀉

發熱

經云下利發熱死。此言滯下証也。仲景云下利手足不逆冷。反發熱者不死。此言傷寒三陰寒証也。寒証嫌於無陽。發熱者真陽未漓。故曰不死。滯下發熱。嫌於陽亢。陰亡。元氣無主。一任邪氣之充斥。必致內外交困。故曰死也。丹溪曰。經言身熱則死。寒則生。亦大概言之。必以兼証詳之。豈無身熱生而身寒死者。按痢初起發熱。多屬外邪。其候頭痛身痛。畏風寒。或熱或熱寒相兼。撤其外邪。其熱自退。人參敗毒散廩湯加減。小柴胡湯加味。桂枝湯葱豉益元散五積散量虛寒。熱加減選用又有濕熱薰蒸發熱者。其狀蒸蒸發熱。亦能頭痛。但不畏風寒。或口渴。或汗多。其脈滑數。不似

外邪之浮數弦緊清其內熱則外熱自微不足深慮也

黃芩芍藥湯改定聶氏方

香連丸等選用

最忌先無熱或散之清之下之其熱以退八九日忽又大熱

多係陰傷陽亢之候

可慮耳然審知腸胃熱盛更宜清下者有之

復感外邪更宜微汗者有之

又有陰虛痢疾熱在午後或夜盛晝輕

其脈細急熱甚者亦顯滑數以養陰清熱之藥調之

湯劑詳陰虛痢疾門

更有

過投苦寒攻伐虛陽外擾發熱者其脈空大無根急用溫補收斂陽

氣以上諸証未定即死但對証投劑而大熱終不退者爲必死也有

外不甚熱自覺煩熱難支欲去衣卧地者此陰陽離絕之候宜八味

地黃湯十全大補湯等不效

滯下發熱非休徵。陽亢陰亡義本明。或謂死生惟審証。莫拘寒熱以
相論。初受外邪。因發熱。頭疼身痛。畏寒風。或兼寒熱。或偏熱。外邪能
撤熱不陵。人參敗毒散。偕倉廩。加減小柴胡加味桂枝湯。薤白益
元散。五積散。虛寔寒熱隨酌斟。濕熱薰蒸而發熱。亦能頭痛熱蒸蒸。
口渴汗多脈滑數。風寒不異異邪氛。清其內熱外自愈。欲選良方苟
葯湯。工黃芩芍葯湯同妙。聶氏香連丸等倫。最忌陰傷陽亢候。熱退
復熱辨宜清。腸胃熱痛宜清下。外邪復感取汗攻。陰虛痢疾午后熱。
夜盛脈多細急形。熱甚脈還顯滑數。葯詳陰虛痢疾門。苦寒攻伐或

大過虛陽外擾脈大空急宜溫補歛陽氣醫師臨証貴經營諸証雖危猶可挽熱終不退定多凶外不甚熱偏煩熱陰陽離絕恐難生入味地黃湯十全大補湯聊表醫師一片心。

方歌

加減小柴胡湯

加減柴胡甘

草半

下人參。

參柴胡更益

卷

活防丰。

不虛去

人參湯

去

下

少佐 花粉

腹痛惟加白芍工

加味桂枝湯

加未
 主支白芍
 方丰
 甘草
 七桂
 夜一
 志舌
 七
 薑
 同

煎散與溫何憂寒熱交相作

慈鼓益元散

慈鼓益元散若何。豆豉。葱白。更調和。甘草。辰砂。偕滑石。夏痢兼邪獲效多。

改定聶氏方

改定聶氏桃仁。紅花。枳。榔。當歸。只。克。白芍。川連。山楂。甘草。木香。

青皮。黃芩。地榆。厚朴。此醫熱痢定無差。

倉廩湯

即人參敗毒散加陳米

人參敗毒散

見春必病溫

五積散

見六經

黃芩芍藥湯

見滯下

十全大補湯

見婦傷寒

香連丸

見滯下

八味地黄湯

即八味腎氣丸見六經