

序

甯遠堂童殿華

內外症雖分二科理實一貫蓋未

有治其標而不先治其本者也蓋

聖謝家橋先生精於外科凡遇險

症十不失一謝氏為翊外家自切即耳

其名而著囊秘本則見也

友人處得其孫翼為



南京中医药大学图书馆版权所有

二十餘頁特于裝背對口書白
製刻在精洋油中謂
約而盡者非於此道中三折肱不
及此是書刊於道光二十年經咸
豐庚申之沒板已燬廢翹恐日久
失傳緣為續刻廣送庶使患是
症者按法治之無不迎刃立解不至

誤於庸醫之手二濟世之一端也用
誌數言附於簡首

同治壬申仲秋月後學劉翊宸謹識



南京中医药大学图书馆版权所有

謝氏發背對口治訣序

發背對口治訣先大父邃喬公所著也先大父性類
悟好讀書常以濟世爲念敦學不怠屢困棘闡及先
伯父香伯公舉於鄉始無意進取惟讀書以自娛暇
則講求岐黃曰士不能得志是亦濟世之一道也通
內外科多所闡發每視病必矜重四方延請雖遠必
至却饋遺貧困者以藥助之嘗爲人治發背對口諸



症以古人之法投之多不效沉思其
之欺我也特未通其變耳夫一症之成
偏重之處審其所偏重而切治則效可立見也自是
凡治此症必辨其位之左右上下色之赤白深淺脉
之浮沉遲速以審其經絡腑臟竅穴之所係與夫陰
陽虛實淫鬱燥濕之所歸而復參之天時相其地宜
以制五行生克之用取古人之法損益變化以通之

於是所治罔不效既余先伯父迎養琴江署舍多暇
年取歷年醫案裁定發背對口治訣幾卷附錄治驗

中
下
月

幾卷及歸而授之先君曰此書未經人道勿輕視之

藝雖小亦足以濟世矣先君東環公暨先叔父東揆

公亦皆以儒術通素理先君久戰北闈未遑展施先

叔父以是道行世善用先大父遺法故

中今先君先叔父相繼逝世矣

爲

記

不

能通一藝先人之書具在徒使置而勿用是先人濟
世之志至^爲等而中絕也楊君子逸夙聞是書勉余
剖梓余欣然從之庶幾先人遺術傳播四方高明之
士鑒而採擇焉未必不有補於世雖未能述先世之
事猶不失先世之志也夫

道光二十年仲春七日孫翼爲謹序

論

毘陵邃喬謝應材著

孫翼爲且魯校

對口發背不拘偏正只論形色色忌晦滯貴淡紅明
潤形忌歪邪平塌要尖圓高突所以高爲陽下爲陰
紅爲陽白爲陰有肌膚受寒毒雖高聳而亦白者須
用柴葛解肌或時當寒甚用淨蘇葉溫解使之重汗
俾邪從汗解若痛在筋骨外不現形肉色如故兩脉
或弦硬細緊沉伏滯滑則爲流注須用蒼陳朴草蘇



南京中醫藥大學圖書館版權所

葉不效再用麻黃姜桂附子以解之麻黃不拘分量
數分起至二錢爲止有乾鶴膝小腿不但不腫脹
其上大肉盡去膝轉看得極大麻黃一服卽用三錢
對口不拘左右以升陽散火爲主右初起柴胡川芎
可稍緩卽用升麻左初起升麻可稍緩且先用柴葛
解肌湯若自左腫至右自右腫至左一服升柴川芎
竝用桔梗不拘左右用錢外至錢半爲止使之載諸

藥而上浮凡耳後腦骨中間軟堂正中必用獨活以
提腎毒對口在頭頭爲諸陽之首雖不高聳亦不以
陰論止重用發散間有時值嚴寒無汗不解用麻黃
三五分炒黑而桂附等藥不用發背亦然發背并不
宜重用發散倘至大膿之後亦清補者多對乳以上
用桔梗對乳以下不用對口右升麻左柴胡乃其君
也若火勢炎甚身熱如炙痛楚非常川芎不用經云



川芎佐清陽而升頭角火炎者宜戒大熱大痛極紅
面老倘升陽散火無效一面重加升麻一面加大黃
一二錢謂之將軍定痛散發背若大痛楚亦用定痛
散毒有遊紅嫩紅散腳紅紅而帶紫如猪肝色重則
用青皮柴胡以疏肝氣輕則用柴胡白蒺藜丹皮以
平之遊紅係絳紅色亦帶紫是血分稍虧陰火上發
輕則用元參二三錢如夜加痛楚發熱則用生地

三錢以滋陰非此不可擅用恐導邪入腎當歸去瘀

生新新會皮和中補胃二味人稱外科勝藥病未退

切不可擅用能導邪入胃乳香沒藥能和氣血亦能

損胃胃弱者亦戒至麻黃姜桂說之已詳大寒如知

栢苓連用亦甚少非身熱不退不用黃芩非干惡神

情煩躁身熱如爐不用黃連非口中大苦舌台焦黃

而作渴不用知母小便短赤眼睛淚熱方用黃栢鹽

水炒脾善唇滋潤肝善身輕便肺善聲音响心善精
神爽腎善水希長是謂五善更有七惡一惡神昏憤
二惡腰身強三惡形消瘦四惡皮膚槁五惡成消渴
六惡身浮腫七惡瘡倒陷外科正宗善惡論

患處板實如同負重形色晦暗歪邪平塌

隱然有黑色在肌肉間是毒藏于胃不治何則胃主
肌肉肺主皮毛且肺屬金胃屬土土爲金母煩燥而

指頭不紅肝病神昏心病口中無味乾弔惡而飲食
不貪脾病肌膚不潤毛髮乾枯而多痰肺病小水短
赤骨節疼痛夜不成眠飲食不消大便不實腎病毒
色如猪肝無膿者死潰而不爛最忌起葡萄文肉腫
毒亦腫者佳肉腫毒不腫者死去腐生新形如石榴
子者佳腐肉已脫而有紅絲係於其上者死新肉如
板片不進食者死又有毒已潰爛根脚尙不清楚膿



勢亦不湧出飲食不貪欲攻而毒已潰爛身軀已弱
欲補而根脚不清膿不湧食不貪肺胃邪不退攻補
兩難經云攻則死補亦亡調和六腑最爲良更有新
肉已滿外口亦閉按之不實如皮袋狀不治凡至根
脚清痛減膿雖未湧不妨少用生芪以佐膿根脚清
毒軟痛止急用炙黃芪山藥合八珍湯扶正却邪有
受寒板痛毒消時不消膿時停膿長肉時停長用柴

葛白芷以解之有重用蘇葉合真人活命飲解之有
受暑而然者用六一散香薷合真人活命飲有房欲
反覆未潰未膿用獨活合柴葛湯與活命飲既潰既
膿用川斷製首烏輕用活命飲有受氣而然者已潰
未潰俱用柴胡青皮玉金香附未潰合活命飲已潰
輕用受風而反覆名爲破傷風不治者頗有已潰用
揀冬二三錢八珍兼活命飲未潰用黃芩柴葛與活

命飲婦人產後不可脫去生化湯胎前帶定黃岑白
朮苧麻根不可擅用甲片有白淋者用石羔腐炒黑
爲引赤淋用鹽溲腐炒黑或用龜板或用烏膏漬後
用川斷台朮大熟地男婦兼血症引加童便一大杯
或男人遺精加蓮鬚芡實漬後用連皮建蓮爲引有
傷魚積青果一枚爲引肉積臘肉骨灰加山查飯積
用麥芽神曲元米積用白酒元酒積用白葛花雞巨