

石室秘錄卷之三 目錄

卷三 射集

王治

飲食難消
內傷諸症

霸治

大渴 大吐 大瀉
大滿 發背癰腫

倒治

肝葉倒轉 狂言見鬼
墮水淹死

縛治

腫癰開刀 欠伸
兩手不能下

肥治

氣虛多痰

瘦治

瘦人多火

摩治

手足疼痛 臟腑癥結
頸項強直 口眼歪斜

浴治

治疥 止手汗
治癩頭

達治

火丹痧疹

發治

疏通肝邪

奪治

水腫腹脹跗腫

深治

病入膏肓
骨髓腦中

淺治

細小疾病

長治

痿症 腰痛 背脊骨痛 兩腿酸痛
努肉 扳睛 瘕病

短治

陽明口渴用石膏湯 四逆湯
湯 附子理中湯 大承氣湯

日治

日間發寒熱

夜治

夜發寒熱

氣治

血治 治血宜順性

臟治 肺脾同治 腎肝同治
心腎同治 肺經獨治

腑治 小便閉塞 大便閉結
治胆怯 腎虛吐嘔

常治 頭痛 目痛

變治 傷寒變結胸 瘧變下痢 反胃變噎膈
中風變狂 中暑變亡陽

初治 傷風初治 傷寒初治 傷暑初治
傷濕初治 燥病初治 火病初治

終治 傷寒調理 中暑調理 中風調理
中濕調理 火症調理 燥症善後

耑治 直中陰寒 中暑

分治 便血與溺血分治 腰痛與頭痛分治 遺精與健
忘分治 吞酸與泄瀉分治 中氣與中痰分治

同治 四物 逍遙 六君 歸脾 以柴胡 參蘇
補中益氣 四君子 諸湯加減法

異治

中濕 中暑
傷寒

勞治

久坐
久臥

逸治

過勞 治氣勞
治血勞

吸治

胞上升 頭痛 腸下
瘡毒初起

引治

虛火沸騰
厥逆

單治

諸痛治肝 吐瀉
各症治胃

雙治

心痛治肝 胃吐治脾
肺嗽治胃

立治

厥症
腰痛

臥治

痛風 風懿 風痹
痰廢 瘕症

饑治

傷寒 虫痛
霍亂

飽治

治上焦火
治脾寒

治上焦痰
治癆虫

消肺痰
治胃寒

石室秘錄卷之三

山陰陳士鐸遠公甫敬習

義烏

金以謀孝芑甫訂定
李祖詠子永甫叅攷

王治法

論飲食難消內傷諸症

天師曰。王治者。不可以伯道治之。而用王道治法爲必全。而尊尙之也。如人病已將愈。不過飲食難消。胸膈不快。或吐酸。或溏泄。或夜臥不寧。或日間潮熱。俱宜王道治之。而不可以偏師取勝。方用人參一錢。茯苓二錢。白朮二錢。甘草五分。陳皮五分。半夏七分。此六君子湯也。最妙者。有熱加黃芩三分。夜不睡加黃連五分。肉桂五分。潮熱加柴胡一錢。地骨皮三錢。丹皮一錢。有食覺胸中少痛。

加枳殼五分。山查十粒。有痰加白芥子一錢。咳嗽加桔梗一錢。下泄水加車前一錢。腹中痛加肉桂五分。白芍一錢。頭暈加蔓荊子一錢。川芎一錢。上吐酸水加白芍三錢。倍加茯苓飽滿加枳殼五分。所謂王道蕩蕩看之平常用之奇妙日計不足歲計有餘何必用參至兩計加桂附以出奇哉此王道之法也。

張公曰。天師用藥多尙霸法。此偏以王道出奇真不可測也。言醫者細心觀之勿以天師皆用霸術而群以霸道鬪奇置王道于不用又非天師之心并失遠公之求矣。華君曰未嘗傳予。

霸治法

論大渴大吐大瀉大滿發背癰腫

天師曰。霸治者不可用王道。不得已而霸者也。如人病至危。安可仍用六君子輩。迂緩從事。以圖速功哉。勢必如宋襄之速亡而已。故一遇大渴大吐大瀉大滿發背癰腫之類。死亡頃刻。若不用大劑去毒去邪之藥。單刀直進。摧蕩逐除。而欲尚補正。則邪自散之。論未有不一敗塗地而不可救者也。故必須大劑與之。為得大吐方。此寒邪直入腎宮。將脾胃之水。挾之盡出。手足厥逆。少腹痛。不可忍。以火熱之物熨之。少快。否則寒冷欲死。方用附子一箇。白朮四兩。肉桂一錢。乾姜三錢。人參三兩。救之下喉。便覺吐定。再進則安然如故。蓋腎水養人。何能尅心以殺人。惟陰寒邪氣直入腎宮。

定吐至神

丹雷公

曰方中失

人參三兩

大吐有火

邪而吐者

飲之水則

呃逆不止

與之茶則

吐食亦不

吐有吐至

二三日不

已者方則

人參一兩

炒梔子三

錢黃連三

錢各為末

米糕水調

服少少服

之若吐再

服少少即

不吐矣此

方名止吐

泄火丹蓋

吐則未有

不胃氣傷

者也以人

參救胃氣

則腎火逃避。而諸邪挾衆逆犯。心君不寧矣。所以必用附子肉桂。

乾薑一派辛辣大熱之物。而又必多人參以定變。使諸藥遍列。

分布。無非春溫之氣。自然寒邪散而吐止。此方之所以霸而奇也。

○大瀉者。乃火挾邪勢。將膀胱脾中水穀。盡驅而出。必欲無留一。

絲而後快。腹必大痛。手不可按。完穀不化。飲食下喉即出。捷如奔。

馬。若稍稍遲延。必死亡頃刻。蓋其病得之夏秋之暑熱。一遇涼風。

便起波濤。乘風拍浪。蕩日掀天。直趨海口而下。若不急用大劑治。

之。而尚王道之遲遲。鮮不敗乃事矣。方當用大黃一兩。人參二兩。

黃連五錢。車前子五錢。甘草一錢。水煎服。此方之奇。全在用大黃。

既已火瀉。何反助其威。不知火瀉之症。乃火留於腸胃之間。若不

因勢利導。則火不去。而水不流。故必用大黃以利之也。然徒用大黃。而不多用人參。有攻無補。反致損傷真氣矣。至方中又加甘草者。恐大黃過於猛迅。用此緩之也。更用車前者。分消其水勢也。水不入於膀胱。則大腸增勢而添流。今得車前。自然引水歸于故道。又何至陸地爲水鄉哉。此又用霸之妙法也。○大滿之症。此邪壅任上焦。而不得散也。方用枳殼三錢。梔子三錢。瓜蒌一箇。天花粉三錢。甘草一錢。陳皮三錢。厚朴一錢。五分。半夏一錢。水煎服。此方之妙。全在用萸。蓋瓜蒌最能去胸膈之食。而消上焦之痰。况又佐之枳殼。天花。同是消中焦之勝藥。又有厚朴。半夏。以逐其胃口之痰。尤妙用甘草。使群藥留中而不速下。則邪氣不能久留。自然分

散而潛消矣。此又用霸之妙法也。○大渴之症前已備載。茲不再談。○發背前已定方立論。俱可通觀。亦不再悉。

張公曰。竒談暢論。霸道之說。無不入神入妙。又何能贊一說。惟大瀉之症。不可不辨。大瀉有火瀉。有寒瀉。天師之言。乃火瀉也。未言寒瀉。予補之。寒瀉之症。以一日或數十行。數百行。腹亦有痛者。以完穀不化。下喉卽出。亦死亡頃刻。亦多在夏秋之間。然則將何以辨之。予辨之。熱與痛耳。火熱者。口必渴。舌必燥。甚則生刺也。胎必黃灰黑色。腹必痛。而手不可按也。若寒瀉者。口不渴。卽渴亦不十分喜飲水。舌胎必白滑而不燥。腹痛喜手按。不按則苦是也。然則治之法。豈可相同哉。法當急用補氣之藥。

以生其胃氣。佐以分消之品。方用人參一兩。白朮三兩。附子一錢。茯苓一兩。澤瀉三錢。豬苓三錢。肉桂二錢。水煎服。此方卽五苓散加人參者也。妙在加參至一兩。有參始能挽回垂絕之地。佐白朮茯苓以去水濕之氣。而又有附子肉桂以補命門之火。使火熱以生脾土。而膀胱氣化。水道可通於故轍。况又有豬苓澤瀉以分消其水勢乎。自然大便實而寒邪去也。此霸治之不可不知者又一也。其餘天師已言之盡矣。不再贅。

華君曰。與子同傳。

大瀉方。借治火痢甚妙。

李子永識

大醫古書火麻其枝
在子來端

華昏日與子同歸

百不吟香又一出其餘
天神口言之盡矣不再楚

點所灼發前其木焚乎自然大野實而與寒遠其

此火然也主報土沉氣報外水並可觀效其

卦白木焚其以先木編之原而又百樹于

焚精賦入參香曲使空賦空至一兩許發

陰亦焚一兩許為三發漸焚三發肉卦一

以主其胃氣卦以各散之品式限人參一兩白大

倒治法

論肝葉倒轉

論狂言見鬼

論墮水淹死

雷公曰如人視正為斜視斜為正亦以此法治之愈

天師曰。倒治者。乃不可順。因而倒轉治之也。如人病傷筋力。將肝葉倒轉。視各物倒置。人又無病。用諸藥罔效。必須將人倒懸之一。人手執木棍。劈頭打去。不必十分用力。輕輕打之。然不可先與之言。必須動其怒氣。使肝葉開張。而後擊之。彼必婉轉相避者數次。則肝葉依然相順矣。更有一法。以黃酒一壺。令病人飲之大醉。以竹籐擡之。故意跌翻。亦必愈也。更有痰結在胃中。不能吐出。狂言如見鬼狀。時發時止。氣塞胸膛。以牛肉五觔。水二斗。煎湯飲之。至不可食而止。以鵝翎探吐。必大吐。必吐至如塊黃色。頑痰而後止。若不吐出。再飲之。必以吐盡而止。前病頓失。後以陳皮。茯苓。甘草。

白朮湯徐徐飲之。平復如故。此倒治之法也。

張公曰。好倒治。無可言。

華君曰。同然。予尚有一法未傳。如人墮水而死。令一人將死人雙足反背在肩。上行二里許。必然口中倒出水來。然後放在灰內。半日任其不動。然後以生半夏丸納鼻孔中。倘冬天則不能救。其夏秋之間。無不活者。必然打嚏而甦。急以人參三錢。茯苓一兩。白朮五錢。薏仁五錢。車前五錢。肉桂一錢。煎湯半盞灌之。無不生全也。

縛治法

論肺癰開刀

論欠伸兩手不能下

天師曰。縛治者。乃肺中生癰。必須開刀。有不可內消者。必其人。不守禁忌。犯色而變者也。毒結成於肺葉之下。吐痰卽痛欲死。手按痛處。亦痛欲死。此等肺癰。必須開刀。將病人用綿絲繩。縛在柱上。必須牢緊妥當。不可使病人知。手執二寸之刀。令一人以凉水急澆其頭面。乘病人驚呼之際。看定痛處。以刀刺入一分。必有膿射出。如注。乃解其縛。任其流膿流血。不可以藥敷之。後以前膏藥貼之。不可遽入生肌散。三日後加之可也。此縛治之法也。問服煎藥否。天師曰。方用金銀花一兩。元參五錢。人參三錢。甘草三錢。足矣。可用四劑。不必再用。肝癰不用刺。

張公曰縛治法妙極亦無可言

藥華君曰同然予尚有一症凡人有伸欠而兩手不能下者將人
抱住縛在柱上又把木棒打去病人自然把手來遮隔而兩手
自下矣下後用當歸一兩川芎五錢紅花五分生地五錢桃仁
五個甘草一錢大黃一錢丹皮二錢水煎服二貼全愈比有婦
人而得此症者亦縛在柱上令一人解其下衣而彼怕羞自然
以兩手下來遮隔亦一時手下亦以前湯與之可愈也

守禁思少而變香少毒諒如飲藥之不吐熱噴氣於手對

天袖曰標宗香八紙中全鐵及更開又自不可內能清必其人

蘇白志

補氣藥開又

補大劑兩手不離不