

本草類目錄

寒溫條辨六卷

渭珍氏訂



本草類辯目錄卷六

補劑類 三十一種

人參

蘆在末條

熟地黃

生乾

甘草

稍

黃耆

白朮

茯苓

皮神

芍藥

赤

當歸

遠志

小草

山藥

杜仲

牛膝

何首烏

山茱萸

胡桃仁

女貞子

枸杞

地骨皮

菟絲子

覆盆子

五味子

五加皮

葫蘆巴

瑣陽

肉蓯蓉

骨碎補

阿膠

龜版膠

版

鹿角膠

茸霜

丹砂

磁石

玉竹



北京中医药大学图书馆版权所有

潤劑類 十二種

天門冬

麥門冬

欵冬花

紫苑

酸棗仁

栢子仁

大麻仁

百合

枰棋子

牛乳

竹瀝

蜂蜜

寒劑類 三十五種

元參

沙参

苦參

黃連

胡黃連

黃芩

黃栌

知母

梔子

連翹

青黛

白頭翁

石連子

川棗子

皮根
牛蒡子

主內書

茵陳蒿

山豆根

防己

石膏



香薷

枯藁實

花

馬兜鈴

精

枇杷葉

金銀花

蒲公英

龍胆草

夏枯草

益母草

子

牡荊皮

桑白皮

葉

代赭石

羚羊角

犀角

童便

熱劑類

七種

附子

烏頭

肉桂

桂枝

乾薑

益智子

破故紙

石硫黃

米酒

燥劑類

七種

白附子

蛇床子

吳茱萸

根

肉豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

草

蒼朮



北京中医药大学图书馆藏

消劑類 十三種

蓮子 藕鬚

芡實子

木瓜

秦皮

川續斷

訶黎勒

罌粟殼

椿樗

皮白

五倍子

地榆

赤石脂

牡蠣

龍骨

商

消劑類 三十九種

縮砂仁

沉香

木香

陳皮

青皮 核葉

枳實

殼

厚樸

藿香

桔梗

檳榔

皮大腹

烏藥

南香附

滑石

猪苓

澤瀉

木通

車前子

葉 燈草

山查

六神翅

使君子



葵腹子葵 白芥子 旋覆花 前胡 半夏

川貝母 胆星南星 鬱金 薑黃 丹參

五靈脂 延胡索 紅花子 澤蘭葉 紫草茸

桃仁花 杏仁 茜根 雄黃

散劑類 二十種

白殭蠶 蟬蛻 淡豆豉 石菖蒲 甘菊花根

威靈仙 絡藤鈎 荆芥穗 蘇薄荷 軟柴胡

川芎 天麻 秦艽 升麻 葛根

白芷 羌活 獨活 細辛 防風



汗劑類 四種

麻黃 根

紫蘇葉

梗子

蒼耳子

水萍

下劑類 八種

大黃

芒硝

巴豆

甘遂

紫大戟

澤漆

芫花

葶藶子

牽牛子

攻劑類 六種

穿山甲

鼈甲

乾漆

京三稜

蓬莪朮

青礞石

吐劑類 六種



瓜蒂

白礬

牙皂刺

常山

藜蘆

人參蘆

蘆卽參苗
一種也

補五種

淫羊藿

在故
紙下

沙苑蒺藜

在續
斷下

辛夷花

在薄
荷下

蔓荊子

在細
辛下

丁香

在乾
薑下

夫藥之爲類多矣治病不要求奇神明存乎其人

右記一百八十八種一種連及者又四十四味分

爲十二劑人參之外非常不用平易之物用須辯

明俗云多不如少少不如好今人趨利苦驚以膺



北京中医药大学图书馆版权所有

物欺人者皆是也。當局者不可不慎。再如苦茶用

五兩水十盞煎三盞分三次連服治茅根蘆根產後腹痛如錐刺並腰脚刺痛者

根艾葉柳葉陰葉栢葉茶葉竹葉竹茹槐花榆皮

大青小薊小鹽化水洗乳巖及療瘰極驗地錦草紫地丁芩實

旱蓮草蒺藜鷄內金高牛地龍膏燭入井水攪清飲之治溫病大熱

狂言大腹黃疸隨宜伏龍肝石灰百草霜黑墨葱用並治腎風脚氣

韭薤蒜生薑大茴花椒紅麴米醋粳米糯米白扁

豆黑豆赤豆茶豆慧苡仁金匱方慧苡仁附子效醬湯治腹癰有膿慧苡

仁五錢附子二錢收醬脂麻草麻子浮麥麥芽穀二錢五分水煎日三服

收醬即苦菜也

茅西瓜甘蔗荸薺荔枝元肉橄欖榧子四物雖非北地土產

亦居家常有之物白果棗梨桑甚烏梅柿乾柿霜柿蒂髮

灰尿鱗人中黃五穀蟲官粉鐵繡銅綠驢瘦馬勃

敗鼓之皮附記七十四味隨地皆有取之甚便察

之甚明用如其證效如響應世多舍近而圖遠舍

易而求難豈非貴耳賤目乎

陳茶芽煎治多年偏正頭風疼

茶芽錢五黑豆粒五十燈心寸五十金銀花錢三元參蔓

荊子防風天麻錢各一川芎辛夷花各五分

外用土茯苓四兩煎湯取三盅煎服滓再取二盅煎

服重者不過二劑

通淋膏

治五淋瀝疼並小便不通

地龍條

蝸牛個

一擣敷臍上即愈

來復丹

旱蓮草二斤

地錦草二斤

煮膿汁去滓入黑豆

四青鹽

四兩

汁沒豆一二指細火攪煮以汁盡為度

曬乾長服滋腎益肝烏鬚明目却病延年 以上

數方至平至易之藥屢試屢驗可見治病全不在

貴且異者



医药大学图书馆

本草類辯卷六

夏邑後學栗山楊璿玉衡訂正 子鼎編次

古宋畏齋先生郭善鄰春山叅較

補劑類

人參

反藜蘆

味甘微苦陽中微陰入手太陰肺升也陽

氣虛竭者回之於暫敗之初陰血崩潰者障之於決

裂之後

獨參湯主之

惟其氣輕而不辛所以能固氣惟其

味甘而純正所以能補血故凡虛而發熱虛而自汗

虛而眩暈虛而困倦虛而短氣虛而驚懼虛而遺泄



北京中醫藥大學圖書館所有

虛而瀉痢虛而頭疼虛而腹痛虛而飲食不運虛而
痰涎壅滯虛而吐血衄血虛而淋瀝便閉虛而嘔逆
煩燥虛而下血失氣等證是皆不可不用者第以氣
血相較則人參氣味頗輕而屬陽者多所以得氣分
者十之八得血分者十之二總之爲氣分之物而血
分亦必不可少未有氣不生而血能自生者也散人
參五分麥冬一錢五味子十粒治夏月火旺燥金暑
溼少氣汗多口渴病危脉絕蓋心生脉肺朝百脉補
肺清心則氣充脉復轉危爲安矣故扁鵲曰損其肺者益其氣須用

人參以益之肺氣既旺他藏之氣皆旺矣凡藏府之

有氣者皆能補之、然其性溫、積溫亦能成熟、雖東垣云參耆爲退火之聖藥、丹溪云虛火可補、參耆之類是也、此皆言虛火也、而虛火二字最有關係、最有分解、若內真寒而外現假熱之象、是爲真正虛火、非放胆用之不可也。參附湯主之、附然有一等元陰虧乏、減半於參是也。而邪火燔燥於表裏、神魂燥動、內外乾枯、真正陰虛一證、誰謂其非虛火如過用人參、實能助熱、若節菴云陽旺則陰愈消、節要云陰虛火動者不用、又云肺熱還傷肺等說、固有此理、不可謂其盡非、而李月池

輩皆極不然之恐亦未必然也夫虛火二字當分實中有虛虛中有實陽中有陰陰中有陽就證論證勿以成心而執偏見斯可矣若龍雷之火原屬虛火如巴蜀有火井投以水則燔投以火則滅是卽假熱之火故補陽卽消矣至於亢旱塵飛赤地千里得非陽旺陰虛而可以補陽生陰乎或曰此正實火也得寒則已余曰不然夫炎暑酷烈熱令大行此爲實火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷流是爲陰虛非水莫濟此實火與陰虛亦自判然可別是以陰虛而火不盛

者自可用參爲君若陰虛而火稍盛者但可用參爲
佐若陰虛而火太盛者則誠有暫避人參而惟甘寒
壯水之劑庶可收功六味地黃湯大劑濃煎或人參
固本丸熟地乾地各二兩天冬
麥冬青蒿枸杞各一兩
人參五錢爲末煉蜜丸蓋天下之理原有至是謂之
曰陰虛必當忌參固不可謂之曰陰虛必當用參亦
不可要在斟酌病原適其可求其當而已言問曰人
參惡皂角
東垣理脾胃瀉陰火人參皂角同用是惡而不惡也
人參畏五靈脂古方療月閉四物湯加人參五靈是
畏而不畏也又吐痰在胸膈人參藜蘆同用而取
其涌越是激其怒性也此非洞達經權者不能知
熟地黃北方純陰土肥
力大懷慶者佳味甘微溫陰中微陽氣薄味

厚降也。本草言手足少陰厥陰經藥大補心血滋培
腎水兼益藏血之經。此論蓋得其大畧而未盡其奧
妙。夫地黃產於中州沃土之鄉得土氣之最厚者其
色黃土之色也。其味甘土之味也得土之氣味與色
而曰非太陰陽明之藥吾不信也。惟是生用性寒脾
胃喜溫固所宜慎。至於熟則性平稟至陰之德氣味
純靜故能補五藏之真陰而於統血多血之藏爲至
要。豈非脾胃經藥耶。仲景八味丸以熟地黃爲君脾
腎兼補也。經云飲食生化而輪
於夫人之所以有生者氣與血耳。氣主陽而動血主