

新刊西學集成

三



(京) 新登字 027 号

责任编辑:徐岩春

图书在版编目(CIP)数据

(新刊) 医学集成/(明)傅滋编撰. - 影印本. - 北京:
中医古籍出版社, 1994. 12

(中医古籍孤本大全/薛清录等选编)

ISBN 7-80013-606-X

I. 医… II. 傅… III. 中医学:临床医学-中国-明代

IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 01572 号

中医古籍孤本大全

(新刊)医学集成

(明) 傅滋撰

中医古籍出版社出版发行

杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九五年十月出版

ISBN 7-80013-606-X/R·602

定价:捌佰玖拾元



新刊醫學集成卷之十二

後學 義烏 傅滋 續編

○產後百九十六

脉法

見前 黑氣起及衄者危發喘者不治血入肺故也

丹溪云產後當大補氣血雖有他證以末治之新產之氣血

尤虛胃亦弱忌食鷄子火蓋及諸肉味生為乾硬

此化之物只與熟菜白粥將理半月之後以石首養

胃如有他病必以補氣血之藥為主治雜病之藥兼

補匿 用人參白朮黃芩歸身尾陳皮川芎炙甘草如

發熱輕則加茯苓淡滲其熱重加乾薑或曰大熟用



乾薑何也曰此熱非有餘之邪乃陰虛生內熱耳乾
薑能於肺分利肺氣入肝分引血藥生血必與補陰
藥同用此造化之妙非天下之至神其孰能與於此
一又云有熱加生薑一片黃芩一錢

。產後發熱惡寒百九十七

丹溪云產後發熱惡寒皆是氣血虛甚左手脈不足多
用補血藥右手脈不足多用補氣藥切不可發表如
腹痛者當去惡血若腹滿者非惡血也雜著云產後
所依發多發熱治法以四物補陰血而以炙乾薑
之苦溫從治散其停滯使邪依於陰然產後脾胃虛
多因過食或食傷而發熱者誤作血虛則不効矣
須審問有無飲食之類如胸膈飽悶噯氣惡食泄瀉

等症只作傷食治之若發熱而飲食自調者方可補
血正治嘗見世俗但遇產後發熱惡寒便作傷寒妄
施汗下因而不救
者多矣良可哀聞

○產後血運百九十八

丹溪云血運因氣血俱虛有痰火泛上又云有瘀血隨氣上冲作

運二陳導痰隨氣血加減朱砂安神丸亦可服臨卧

以麥門冬湯下一法用韭葉細切盛於有紫瓶中以

熱醋沃之急封瓶口以瓶蓋納產婦鼻中又方鹿角

燒灰出火毒為末酒調灌下即醒行血極快或論曰此由瘀

血流入肝經眼見黑花頭目眩暈不省人事謂之血
運其由有三有用心使力過多者有下血多者有下

血少者如血多而運者但昏悶煩亂而已宜補血清
心血少而暈者乃惡血不行上控於心心下瀉急神



腎口燥絕不知人宜破血行血之劑用心使力過多者此氣虛也宜補氣生血之劑治各不同宜詳審焉
一婦面白形長心鬱半夜生產侵晨連服急灸氣海
十五壯而醒後參朮等藥二月而安

附方

川歸湯

治下血過多連煩不省

當歸

等分

右剉每半兩水煎服痛加桂

清魂散

治血運先以漆器於床前燒熏之頻置醋

炭更服此藥

人參

澤蘭葉各一兩荆芥兩

川芎

二兩一方無芎有甘草川歸

為末每服二錢湯下

牡丹散

治血運悶絕

牡丹皮

芒硝

大黃

各一兩

冬瓜子

桃仁

三七五去皮煎

每服五錢水煎

近効九

治血運惡血不盡腹中絞痛

紅花 一兩

為未作二服每服用酒二盞童便二盞煎一半分

一方

治血運

益母草汁

三台

生地黄汁

二童便合

雞子清

三枚

右煎三四沸後入雞清攪分作二服

。產後怔忡百九十九

心虛怔忡不定言語錯亂

附

人參

甘草

山藥

川歸

各一錢

生薑

遠志

茯神

桂

麥門冬

各五分

大棗

水煎服

。產後血塊二百

消血塊

滑石

沒藥

血竭

醋糊丸服

又方

五靈脂為末神曲糊丸白木陳皮湯下

又方

香附君

滑石臣

甘草佐

桃仁佐

薑一片順流水搗細煎滾眼

。產後中風二百一

丹溪云產後中風及口眼歪邪等證不可作風治必大

補氣血然後治療

有敗血迷心氣不語者宜以藥血治之

附愈風湯

治產後中風亦治血運

荆芥穗

為末

豆淋酒下三錢

一方加

血氣湯

治產後諸風痿痺無力

秦元

羌滑

防風

白芷

川芎

芍藥

白朮

當歸

地黃

茯苓

半夏

黃芪

等分

為末一半蜜丸桐子大酒下五七十丸一

半為末酒下

。產後浮腫二百二

浮腫有敗血化水者有血虛氣滯者有胎前宿有冷溫

若茯苓白朮芍藥川歸陳皮鯉魚如法製煎煮

或曰乘苦傳精於五臟循經流入四肢留滯日久深却還不得腐爛如水下可專作水氣治也臨病之際宜審之

小調經散

治敗血化腫脹

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

各一錢

細辛

射香

各五分

為細末每腹半錢七薑湯下或加溫酒送下

。產後腹痛二百三

產後惡露不盡小腹作疼

五露脂香附為末醋糊丸

其者加留煎桃仁

云五露脂為末神曲
丸陳皮白木煎湯下

聖散附治腹脇滿悶嘔逆

半夏

赤芍

陳皮

澤蘭葉

人參

甘草

薑水煎服

血刺痛

用當歸乃是和血之法若因積血而刺痛者

宜桃仁紅花當歸頭

心腹絞痛欲死及兒絞痛

蒲黃

五露脂

為末醋調二錢煮成膏湯化服之



三聖散

治兒驚痛

當歸

桂

延胡索每二錢煎酒或薑便下

產後血塊痛

四物加炒蒲黃

產後涼血

芍藥二錢瞿麥殼

去節煨

作一貼水煎

兒驚痛

蘇合香

烏金石燒紅醋浸七少寒水石存性等

分爲末每二錢水飲下痛即止

產後自利

二百四

以補脾補血藥丁香綠丸

產後泄瀉二百五

用

川芎

白朮

茯苓

黃芩

乾薑



滑石

陳皮

白芍

炙甘草

水煎

因驚恐發寒熱嘔逆吐衄汗出以八物加芪腹痛加桂
。胞損二百六

丹溪云因收生者不謹以致破損而得淋瀝証一婦壯
年得此診其脉虛甚夫難產之人多是氣虛難產之
後血氣尤虛因思肌肉傷在外者且可補完胞雖在
腹恐不可治遂用峻補以參朮膏煎以猪羊胞湯極
飢時與之每劑用一两服一月而安

又方 人參二錢半白朮二錢桃仁陳皮各一錢黃芪
一錢半茯苓一錢炙甘草半錢右作一服水煎又煎

猪羊痢汤入藥同服

。產後汗二百七

汗多不止因陰虛

黃芪二錢

白朮

防風

熟地五錢 牡蛎

白茯苓

麥門

炙甘草各五錢

右剉每錢水煎服

乳汗不通二百附

方

通草七錢

瞿麥

柴胡

天花粉各一

桔梗二錢

青皮

白芷

木通

赤芍藥

連翹

甘草各五錢

作一服水煎食後徐徐服更服乳房

湯泉散

瞿麥

麥門冬

五不留行

龍骨



山甲分尋

為末酒下一錢又宜猪蹄作羹食之

又方

天花粉五錢酒水煎服

下乳汁

宜食猪肉麋羹又以粥飲調益原散四錢

一法

木通斤猪蹄隻同煮食之

消乳二百九

如無子食乳

不消散令人惡寒發熱

麥芽

二刀

為末作四服湯下

一云乳塊加滑石瓜蒌甘草

。陰戶脫二百十

丹溪治

一婦陰戶一物如帕垂下或有角或二岐俗名

產類宜大補氣以升提之以人參白水黃芪各一錢



升麻五分後用川歸芍藥甘草陳皮調之

方 治產戶突出以四物入龍骨末少許煎服

方 當歸 黃芩 牡蛎各二兩 芍藥二兩

方 蝟皮燒存性 半刀 為末米飲或酒下忌登高舉重

方 蟹頭二斤 陰干 葛根一斤 為末酒下方寸匕

方 白礬煎湯浸亦良

方 老鴛鴦煎湯用草坐不開孔終熏一半稍溫下

手洗並效

方 四物湯 蝟皮燒半刀 牡蛎煨 黃芩一兩或加

蛇床子布裹 硫黃 烏賊魚 五倍子 為末搽之



子腸不收

全蝎炒為末 口噤水鼻中搐之立効

又方

蛇床子 韶腦 胡蘆巴 紫梢花等分

為末每一兩水半碗淋洗二三次効

。半產二百一十一附

跌法 浮而墜半產而墮

東垣論半產分娩漏下甚至昏冒眩目無知因血暴亡

心神失養陰血既脫相火無制禁用寒涼之藥本氣

不病是暴去其血宜補而升舉之治以

全生活血湯

紅花三分 蔓荊子 細辛各五分

生地

夏月多加熟地各一 藥末 川芎各一 羌活各一



防風

諸風既隨何以知之血下脫故也

獨滑

甘草

柴胡

歸身

葛根

各二

白芍

升麻

各三

水煎服

半產後血來百藥不止小羊蹄焙黃色為末飲下三錢
乳母但覺小水短少即是病生便須服藥調理蓋兒飲
母乳母安則兒安防慮未形善之善者也

丹墜治一婦產二日產戶下一物如帕有尖約重一斤

予曰此胎前因勞役傷氣成肝癯所致却喜血不盡

虛急與黃芪白水升麻各五分參歸各一錢連與三

貼即收上得汗其粘席凍乾者落一片約五六兩蓋

脂膜也脉濡左畧弦形實與白水芍藥當歸各一錢

