

赤水珠身十六卷目錄

霍亂門

轉筋

中惡客忤

欬逆

嘔米

下氣

漏氣

嘈雜門

眩暈門

瘖門

痘證門

厥門

吐門

出

門

入

門



入

門

門

赤水珠第十六卷

新安生生子孫一奎著輯

霍亂門

霍亂者揮癰撩亂其勢急暴有似鬼祟實非邪也
乃內有所傷外有所感陰陽乖隔而成此前人
格論

內經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重
腹痛筋骨搖併蓋言木乘土而為病也夫霍亂
者揮霍撩亂也其症心腹卒痛嘔吐下痢發熱

增寒頭痛眩運或吐而不瀉或瀉而不吐或吐
瀉並作夫邪在上焦則先心痛而吐邪在中焦
則先腹痛而瀉邪客上中二焦則吐瀉俱作甚
則轉筋入腹則斃蓋陰陽反戾清濁相干陽氣
暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逆治之惟宜
溫煖更詳別三因以調之外因諸風則惡風有
干傷寒則惡寒無汗冒溫則重著傷暑則煩熱
又有內因九氣所致鬱聚痰飲痞滿不通遂致
滿悶隨其勝復必作吐利或諸般良膈灸恣飡

乳聚寒漿旨酒脾胃受傷遂成泄利又有轉筋者蓋脾胃主養宗筋今暴吐下津液頓忘宗筋失養以致牽轉甚則邪縮舌捲為不治之症又有乾霍亂者上不得吐下不得利壅閉正氣閉格陰陽躁擾喘脹命在須臾若濕霍亂則所傷之物因吐瀉而出吐瀉盡則止故猶可治大抵熱勝痰鬱則悶亂濕勝飲鬱則利下其治濕霍亂宜藿香正氣散加生姜不惟可以濕散風濕抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致者亦不

可遽用香薷沉冷之劑合先用橘皮半夏生姜
之類開散結滯次則以香薷五苓溫服散暑解
煩或挾寒而手足厥逆腹中絞痛宜以四逆理
中之類溫之亦不可遽用峻補兜澀之劑則邪
愈滋而變症百出治乾霍亂急以鹽湯灌之令
其大吐庶有可生切不可與穀食恐胃中邪物
吐瀉不盡新穀一入脾不能化轉增危殆慎之
慎之大槩其脉浮洪者易治若脉微遲加以氣
少昏沉不語者皆難治也

丹溪曰內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳
湯加減作吐以提其氣切莫與穀食雖米飲一
呷入口即死必待吐瀉盡過二三時直至飢甚
方可與稀粥其脉多伏欲絕 又曰雖已吐瀉
不徹還用吐提其氣或用樟木煎湯吐之
大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用
五苓散亦可下者 乾霍亂最難治死在須臾
升降不通邪無從出當吐提其氣極是良法世
多用鹽湯為內有食傷外有邪遏故吐之吐中

就有發散之義

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽其乳近
兩邊此千金妙法也 轉筋入腹者死

脉訣舉要曰滑數為嘔代者霍亂微滑者生濡數
凶斷又曰滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉代
勿訝

內經曰脉伏者霍亂脉微而澁 或代而散 或
隱而伏 或大而虛 脉不關滑為霍亂吐瀉
脉結促代皆不可斷以死 脉大者生 脉

洪者為熱 絃者為飲 氣口脉絃滑膈間有

宿食留飲

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉宜沉冷

頻服

草果仁

四兩

烏梅肉

三兩

甘草

炙二兩半

每服五錢姜十片水煎服

藿香正氣散

中濕霍亂吐瀉

蒼朮

陳皮

半夏

藿香

各二錢

甘草

炙一錢

姜五片束二枚水煎服

桂苓甘露飲

中暑霍亂吐瀉發渴引飲

方見中暑

不換金正氣散

霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼

方見

五苓散

方見暑門

藿苓湯

外感風寒內傷飲食霍亂轉筋吐瀉

藿香

厚朴

白朮

茯苓

各一分錢二分

甘草

炙五分

大腹皮

紫蘇

白芷

桔梗

半夏

陳皮

各一錢

肉桂

六分

猪苓

澤瀉

各一錢半

姜五片水煎服

訶子散

霍亂吐利如神又治心脾冷痛

訶子

甘草

厚朴

乾姜

草果仁

陳皮

良姜

茯苓

神曲

麥芽

等分

水煎入鹽服

二香散 暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香 白朮 厚朴 陳皮 茯苓 半夏

白扁豆 紫蘇 桔梗 白芷 香薷 黃連

錢各一 大腹皮 甘草 分多五 姜 片五 葱白 根三 水煎服

加味四君子湯 霍亂轉筋吐瀉腹中痛體重泥脉

而人參 白朮 茯苓 錢各二 甘草 炙芍藥

良姜 錢各一 姜三片 枣二枚 水煎服

通脉四逆湯 霍亂多寒內冷脉絕

吳茱萸 兩炒二 附子 兩炮一 桂心 木通 白芍藥

細辛

甘草

炙各五錢當歸

每服七錢水一鍾

酒半鍾姜七片棗一枚煎七分溫服

七氣湯

七氣鬱五臟之間互相刑克陰陽不和

揮霍變亂吐利交作

半夏

五兩

厚朴

桂心

各三兩

白芍藥

茯苓

各四兩

兩紫蘇葉

橘皮

各二兩

人參

一兩

每七錢水一

盞半酒半盞姜七片棗一枚煎溫服

木瓜湯

霍亂吐瀉轉筋擾悶

牛

酸木瓜

二兩

白香

微炒二錢半

甘草

炙二錢

吳茱萸

炒二錢

每服五六錢姜七片紫蘇十葉水煎服一方無

姜附湯 霍亂轉筋手足厥冷多汗嘔逆方見寒門

加味香薷飲 伏暑吐利不止煩悶多渴

本方加檳榔黃連 每五錢水酒各半煎服

冷香湯 夏秋伏暑引飲過食生冷遂成霍亂

良姜 附子 甘草 檀香各一錢 乾姜炒 草

菓一錢半 丁香三分 二服水煎連瓶沉井內待冷服

人參散 霍亂體痛四肢逆冷服理中四順不効者

人參 白芍 川歸炒 良姜各一兩 附子 陳皮

桂心

白朮

錢各三

每五錢加紅棗三枚水煎服

活命散

霍亂吐瀉不止面色青黑垂死者

防風

羌活

獨活

乾姜

細辛

分各一

草豆

藟

肉豆藟

川芎

錢各五

官桂

分半

吳茱萸

木

瓜

各一兩

每三錢濃煎木瓜湯調服

回生散

霍亂不已吐利不止但有一點胃氣存

無不効者

陳皮

藿香葉

錢各五

水煎或為末

熱酒調服

秘方

霍亂吐利轉筋神効

曰扁豆葉根研取汁一碗入米醋同服立瘥

加減理中湯 霍亂嘔吐

白朮 人參

乾姜

錢各三

甘草

錢一

水煎服

若為寒氣濕氣所干者加附子一錢名附子

理中湯

若霍亂吐瀉加陳皮青皮

錢各一

名

治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少

許頻服俟吐出令透即進此藥 若嘔吐者

加丁香半夏各一錢姜十片同煎

泄瀉者

加橘紅茯苓各一錢名補中湯

溏瀉不已

於補中湯內加附子二錢不喜飲食及米穀
不化再加砂仁一錢 霍亂吐下心腹作痛
手足逆冷于本方內去白朮加熟附子名為
四順湯 傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎
服不效者及諸吐利後胃痞欲絕心膈高起
脹痛手不可近者加枳實茯苓各一錢名枳
實理中湯 若渴者再于枳實理中湯內加
瓜蒌根一錢 霍亂轉筋者理中湯內加火
煨石膏一錢 若臍上築者乃腎間動氣也

去朮加官桂一錢半腎惡燥去朮恐作奔豚也故加桂取辛以潤之 若悸者加茯苓錢一

渴欲飲水者加白朮五分 腹滿者去白朮

加附子一錢 若寒者再加乾姜一錢 飲

酒過多及啖炮炙熱物發為鼻衄者加川芎

一錢 傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰

陽安定血脈只用本方

三因白朮散 中暑嘔吐眩運及大病後調理失

宜勞復及脾胃虛損面色青黃飲食不思口吐