

S 2521

7342

瘡瘍經驗全書



瘡瘍經驗全書目錄

第二卷

肺疽肺癰圖說方四

穿心冷瘻圖說方五

心肝癰圖說方二

蜂窠發胸圖說方一

肚癰圖說方一

臍癰圖說方一

盤腸癰圖說方二

臍癰毒圖說方一

乳癰圖說方一

井疽發圖說方一

胃癰圖說方二

血疳瘡圖說方一

九發圖說

氣毒流注圖說方一

小腸癰圖說方十

發肚毒圖說方二

助肚毒圖說方一

乳發圖說方三



妳癰圖說方二

妳癰圖說方二

乳岩圖說方二

風毒遍身串圖方

火腰帶毒圖方二

內丹圖說方一

肩疽并丫疽圖方二

上下肋癰圖方二

訓疽標疽圖說方十

肘後癰圖說方二

左腋疽圖說方四

右腋疽圖說

筋疽圖說

中發疽丫刺毒天蛇毒圖說方六

肩疽圖說方二

背面毒圖說方二

手心毒圖說方二

手腕毒圖說方二

腕疽圖說方二

螻蛄三串圖說方四

發膊圖說方一

遊丹圖說

火赤瘡圖說

方二

發背圖說

方一

魚脊瘡圖說

方一

散走流注發圖說

方三

背發兩頭圖說

方一

腎俞發圖說

對心發圖說

方二

蜂窠發圖說

方一

經體發圖說

連子發背圖說

方一

上中下三搭手圖說

連珠發圖說

方三

上中下三發背圖說

對臍毒圖

腰疽圖說

痰注如袋形圖說

方四

暑疔圖說

方六

青疔圖說

黃疔圖說

赤疔圖說

白疔圖說

黑疔圖說

芝蔴疔圖說

氣疔圖說

冷疔圖說

方二

魚臍疔圖說

方二



瘡瘍經驗全書卷之二

宋燕山寶漢卿輯著

圖論方

夫都洪瞻巖

桐川陳友恭

全校



此毒因暑熱炎天受其穢氣并伏熱毒之氣故生此疽在皮膚之
間或生遍身形如木鱉子如鷄頭大若不速治毒氣入囊即死
服敗毒散加猪苓澤泄當歸黃芪桔梗天花粉荆芥連翹外用
藥敷之

升麻湯

治肺癰肺疽胸乳間皆痛口吐膿血作臭

升麻

桔梗

薏苡仁

地榆

黃芩

赤芍

牡丹皮

生甘草

黃芪

貝母

水煎服

虛甚加人參白朮

多服護心散

蠟礬丸

牛黃清心丸

肺癰



夫肺者五臟之華蓋也此癰因內外兩感風寒所傷及憂思愁慮
形寒飲冷以傷肺經遂致成癰身發寒熱兩肢麻木口吐膿
臭日夜無度喘嗽胸膈喘滿兼脹睡臥不安已破入風者不治急
服枳木桔梗湯

并升麻湯 十六味消化飲 黃芩丸 各進三五服夜服半黃

清心丸 更有乳香萬應膏貼之

參茸大補湯 節勞戒氣忌酒絕慾已破收斂瘡口合歡皮白

味咬咀每服五錢水煎溫服合歡皮即黃芪皮也

桔梗湯

桔梗 貝母 當歸 枳殼 防風 苡仁

瓜蒌仁 桑皮 蜜炙 黃芪 二兩 杏仁 五錢 百合 甘草節 各五

姜三片煎服

欬花湯 嗽而胸滿振寒脉數咽乾大渴時出濁唾腥臭久吐膿

如粳米粥壯者乃為肺癰

欬花 錢一兩 甘草 一兩 桔梗 二兩 薏苡仁 一兩 右作十劑水煎服

內癰有膿敗血腥穢殊甚遂至臍腹冷痛此乃敗膿所致以此下



膿血

白芷

四兩

白芍

一兩

枯礬

一兩

單葉紅蜀葵根

八分如無以蘇木節代

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十九清米湯空心下其

出生肌

井疽發



此症發于胸者名曰井疽狀如豆大三四日起若不早治必入于腹入腹不療十日當死急服內固清心散可治若內發傷膜

無疑治法與發胸發背同

保內清心散

粉草

升麻

當歸

川芎

苦蕒

芍藥

山梔

乳香

黃芩

黃連

桔梗

天花粉

青皮

白芷

水煎服

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

穿心冷癰



此毒生于心窩初起則心頭如火熱其毒生內潰心胞方出皮膚
令人心神恍惚盜汗多出二日皆紅舌如雞金背裏外俱熱易治
若毒發于外冷氣攻心常嘔吐惡心口吐冷痰惡聞食味然氣臭
者死治方于後

辰砂 茯神 遠志 茯苓 人參 乳香 沉香 丁香



木香 藿香 麝香 酸棗仁

各等分末之人辰砂末二錢金箔五片全研細燈心薄荷湯
內塞散 治穿心冷癰

人參 白朮 白朮 熟地 甘草 芍藥 黃芪 肉桂

當歸 黃芩 酒炒 桔梗 防風

水煎服連服十貼次服黃礬丸護心散常服

試治法

乾姜爲末鷄子清調付如潰爛洗淨瘡口拭乾摻末覺熱如烘生
肌易愈

六合回生丹 有回生之妙

真鉛粉 一兩 輕粉 銀珠 雄黃 乳香 黃上 沒藥 同前各二

一兩一錢
二分五厘

右六味各擇真正好者研為極細末凡治其病先用好苦茶洗
瘡口軟絹拭乾后剖猪腰子片用藥一二分搽腰上却付患
腰子發熱如蒸良久取去自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出膿不
可手擠第二日依前法再付之第三日亦付之惡甚可傳七八九
次瘡小只傳一次可愈猪腰子不發熱勿治矣

治痛心胸前有孔久不愈即漏也胃癰并疽心肝癰心癰之類

鹿茸

去毛酥炙微黃

附子

炮去

鹽花

即好

右三味各等分為末用棗肉去

皮核為丸每服三十丸空心酒下亦治腰疼

胃癰



素問云人病胃脘癰當候胃脉脉沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛則熱人迎者胃脉逆而盛熱聚胃口不行故胃爲癰其發寒熱如瘡身皮甲錯或嗽或嘔或吐膿血熱聚胃脘留結爲癰須要知戒連翹升麻湯

沉香另

乳香另

甘草

青木香各三

連翹

射干

升麻

羌活

桑寄生

木通

各七錢五分

大黃

飯上蒸三兩

射香

二錢

右作十劑每劑以粗藥水煎云查入五香細末溫服

以利為度能折其熱毒之氣

犀角湯

犀角

梔子仁

赤茯苓

赤芍藥

射干


黃芩

大黃

炒熟各二錢

水煎去渣入蜜再煎溫服

心肝癰



心者君主之官神明出焉肝者將軍之官謀慮出焉二官有君臣之分一身之主宰其可傷也此癰受在心心主行血氣血熱傷子經絡此是惡毒之症不可不審也當用定痛敗毒散如不散用內托流氣飲

定痛敗毒散

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

烏藥

茯苓

防風

白芷

香附

白芍

羌活

人參

前胡

姜三片棗一枚燈心甘莖煎服

內托流氣飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

白芍

當歸

防風

烏藥

白芷

川芎

姜三棗一食前服

腹痛加沒藥玄胡索

血疳瘡



夫血疳者臟中虛弱邪氣相侵真氣衰少風毒閉塞腠理發于肌膚初如紫疥破時出血瘡生遍身行處成瘡損傷皮肉痒痛難存治法先服當歸連翹散並服清肌滲濕湯並搽十神散

清肌滲濕湯

歸鬚

洗酒

白芷

甘草

升麻

蒼朮

白朮

炒土

川芎

白芍

酒炒

山梔

酒炒

連翹

黃連

酒炒

木通

青皮

木瓜

澤瀉

茯苓

苦參

酒炒

枳殼

柴胡

黃柏

鹽酒

知母

同上

