

國藥詮證

卷四

國藥詮證 全書四冊

實價每部三元

著作者 寶山王劍賓

發行 王劍賓診所

上海西愛咸斯路七一二號

版權所有 不准翻印

總經售 萬葉書店

上海海寧路咸寧里十一號

國藥詮證卷四

寶山王劍賓著

大黃

性味 苦寒無毒

效用 主下瘀血。血閉寒熱。破癥瘕。積聚。留飲。宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利

水穀。調中。化食。安和五藏。

說明 大黃性味苦寒。本經主治下瘀血。血閉。以苦寒之藥下瘀血。血閉。可知

其因濕熱蘊結而生瘀血。有瘀血而致血閉也。故燥濕清熱。可以下瘀血。而通血閉。濕積於內。則氣滯血阻。而發爲寒熱。凡統治寒熱者。皆爲濕藥。因濕已化熱。故以清熱燥濕主治。濕阻而血積。則爲癥瘕積聚。既有癥瘕積聚。則飲水不化。而有留飲。進食不消。而有宿食。既有宿食留飲。則腸胃失其運化。

之力。水穀停滯而五藏不安矣。故清熱燥濕可以行血利氣。除寒熱癥瘕。化流飲消宿食。蕩滌腸胃。使推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五藏。是以大黃爲清熱燥濕之藥。有下瘀破血之效。無濕熱者不可用大黃。更不能以本經有蕩滌腸胃之說而用以致瀉。蓋寒滯者因大黃性寒而不可用。濕阻而未化熱者。亦以寒能助濕而不可用。如用以清熱下瘀。則中病而可以奏效。若用以蕩滌腸胃。則非協芒硝不行。用以攻下瘀血。非協桃仁無效。因有食積及瘀血者。不一定有濕熱也。本經之意。首尾貫通。若斷章取義。則有誤也。

○大黃黃連瀉心湯

治心下痞按之濡其脉關上浮者

大黃 黃連

○大陷胸湯

治結胸

大黃 芒硝 甘遂

○大承氣湯

治陽明病外欲解大便已鞭者

大黃 厚樸 枳實 芒硝

第一方以大黃黃連清熱燥濕。心下有水濕積滯則痞。按之濡。尙未堅實也。脉關上浮。有熱也。故以清熱燥濕主治。熱退而濕化。則氣行而痞去矣。第二方以大黃清熱燥濕。芒硝蕩積滌滯。甘遂利水。此爲熱結挾濕之證。故以清熱燥濕爲主。而以蕩積利水爲佐。第三方以大黃清熱燥濕。厚樸燥濕。枳實破氣。芒硝蕩積。此方爲外欲解而大便已鞭者設也。攻之可以熱退而身安。傷寒論對於攻下。極爲審慎。故於主用本方時。一則曰大便已鞭。再則曰不鞭者不與之。又曰有燥屎乃可攻之。更曰初頭鞭後必溏。不可攻之。復恐誤攻之故。先少與小承氣湯。湯入腹中轉矢氣者。知有燥屎。然後攻之。可見攻下之須極端審慎也。

半夏

性味 辛平有毒

效用 主傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗

說明 半夏性味辛平。本經主治傷寒寒熱。以辛能散寒而逐濕也。寒濕阻滯則氣不和而心下堅。辛能散寒化濕。故可以治心下堅。胸中有積濕則胸脹欬逆。肝爲濕阻則氣不和而頭眩。咽喉爲濕阻則腫痛。腸中有濕則腸鳴。辛能化寒而散濕。故可以治心下堅。胸脹。欬逆。頭眩。咽痛。腸鳴。散寒逐濕可以利氣。故能下氣。濕盛則汗腺失其收縮之力而汗不止。故散濕可以止汗。凡因濕盛痰多而或咳或嘔者。用以散濕。有止咳止嘔之效。元素和胃氣。燥脾濕。治痰厥頭痛。消腫散結。震亨治眉稜骨痛。好古補肝風虛。時珍除腹脹。目不得瞑。半夏辛而不烈。爲治氣之藥。氣中挾濕。散之有效。或以滑而能潤。鮮者滑。乾者不滑。所謂潤燥者。因濕阻氣不化則燥。故散濕可以化氣而潤燥。

○半夏散 治少陰病咽中痛

半夏 桂枝 甘草

○甘遂半夏湯 治利有留飲而心下堅滿

甘遂 半夏 芍藥 甘草

○小半夏湯 治嘔而不渴心下有支飲

半夏 生薑

第一方以半夏散濕。桂枝行氣散濕。甘草洩熱解毒。咽痛而以辛散爲治者。以濕阻而氣不宣化也。故咽喉乾燥而痛。辛溫可以散寒逐濕。使運化回復。則喉潤而不痛矣。成註傷寒論謂甘草炙。炙則性緩。本方之旨在散。生甘草有散邪解毒之效。故不應炙也。第二方以甘遂逐水。半夏散濕。芍藥燥濕。甘草散結。有積水則利。故本方在消積水而並不治利。積水既消。利可自止也。甘遂爲逐水之猛藥。半夏散濕利氣。芍藥燥濕利氣。均可助之逐水。甘草與甘遂相反。在本方中可相激而發生利水之效也。第三方以半夏散濕。生薑

散寒。嘔而水渴當竭。以不渴。故知有支飲也。支飲之所以停留。由於濕阻氣滯而失其運化之力。故辛以散濕。溫以散寒。使寒濕自化。則支飲得消矣。

連翹

性味 苦平無毒

效用 主寒熱鼠瘻瘰癧腫惡瘡癰瘤結熱蠱毒

說明 連翹性味苦平。本經主治寒熱鼠瘻瘰癧腫惡瘡。此種寒熱。並非普

通之寒熱。係濕化爲熱。血化爲毒而釀成之寒熱。故外發而爲鼠瘻瘰癧。癰

腫惡瘡癰瘤。苦能燥濕。濕去則熱退。而鼠瘻等證。可以獲愈。結熱爲濕毒。結

聚而化熱。故燥濕可以退熱。以兼能殺蟲。故能治蠱毒。李杲曰。十二經瘡藥

中不可無此。好古治瘡瘍癰癭結核有神。足見前人皆用以治濕毒。自李時

珍創兼治手足少陽手陽明三經氣分熱之說。遂誤作清熱之用。乃以燥而

用者自用。連翹盛行而芩連反爲人所屏棄。此種轉變爲害之大。良匪淺鮮。蓋連翹實爲治濕已化毒之專藥。不能治其他熱病。苟一讀本經。當知余言爲不謬也。

○大連翹湯 治小兒濕毒利小便

連翹 瞿麥 車前 木通 滑石 當歸 赤芍 防風 荊芥

紫胡 蟬蛻 黃芩 山梔 甘草

○連翹散 治項上惡核癰腫

連翹 射干 獨活 升麻 木香 沉香 木通 桑寄生

大黃 丁香

第一方以連翹治濕毒。瞿麥車前滑石木通利小便。當歸行氣散濕。赤芍瀉血毒。防風荊芥柴胡蟬蛻散風熱。黃芩山梔清熱。甘草解毒。濕阻氣滯。小便

不利而濕已化毒。故利水以通小便。散濕以解濕毒。驅風以行氣。清熱以制濕。第二方以連翹治濕毒。獨活升麻散風熱。木香沉香丁香射干散結氣。木通利水。桑寄生去風濕。大黃清熱解毒。惡核癰腫。係積濕化毒所致。氣血俱病。故清血解毒。驅風利氣。以通氣阻而清血熱。使已結之毒得以疏散。兩方所用連翹。確合本經主治。用連翹者。當以此爲法也。

桔梗

性味 辛微溫有小毒

效用 主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣

說明 桔梗性味辛溫。本經主治胸脇痛如刀刺。以其能散濕而利氣也。腹滿腸鳴幽幽。爲濕阻氣滯所致。故以散濕利氣爲治。濕阻而化熱則驚。氣滯則悸。故散濕利氣可以治驚恐悸氣。桔梗之效。全在散寒化濕。凡濕之陰發者。

或不紅不腫。或腫而不紅。雖已化毒而並無熱象。雖屬濕阻。因水氣不化而外表則燥。燥之可以化熱而助毒。清之可以益寒而助濕。惟有散以辛溫。可使寒去而濕化。故以桔梗散陰化之濕。最爲有效。若有風熱。誤以桔梗散之。則頭痛經月不愈。故昔人有桔梗性升之說。其實桔梗爲溫散寒濕之藥。因力量微薄。不能用以治氣病或風病。元素所謂利竅除肺部風熱。實係濕阻化熱之證。故用辛溫散濕。可以利竅而洩熱也。諸家未能詳究性味。把握本經。故議論甚多而均難中肯也。

○桔梗湯

治少陰病咽痛

桔梗 甘草

○白散

治寒實結胸

桔梗 巴豆 貝母

○桔梗湯

治咽腫微痛聲破

桔梗 麻黃 甘草 黃芩 殭蠶 馬勃 桂枝 歸身

第一方以桔梗散濕逐寒。甘草解毒。少陰病咽痛。以喉中寒濕積滯而化毒也。故散濕逐寒。則可以消腫而止痛。腫則有毒。故佐以解毒之藥也。第二方以桔梗散濕逐寒。巴豆通閉。貝母開鬱。因寒結。故以溫散主治。巴豆辛熱破結。用治寒實。貝母辛平。用以散濕。此方力大效宏。不可忽視。第三方以桔梗散濕逐寒。麻黃燥濕散寒。甘草解毒。黃芩燥濕清熱。殭蠶散濕。馬勃散血解毒。桂枝行氣散濕。歸身行氣活血。咽腫微痛。寒濕化毒所致也。故以散濕逐寒主治。桔梗殭蠶治陰濕。均有特效。宜注意之。

白頭翁

性味 苦溫無毒

效用 主溫瘧狂獺寒熱癥瘕積聚瀰氣逐血止腹痛療金瘡

說明 白頭翁性味苦溫。本經主治溫瘧狂癡。以寒濕化熱則發爲溫瘧。熱極則狂。故燥濕散寒可以治之。濕阻則發爲寒熱。濕阻而血滯則爲癥瘕積聚。蘊濕流注於頸項而化毒。則爲瘰癧。故燥濕散寒可以治寒熱。除癥瘕積聚。化瘰癧。濕阻則氣滯而血結。故燥濕可以利氣而逐血。氣阻則腹痛。故燥濕可以利氣而止痛。金瘡爲濕所阻則難愈。故燥濕可以療金瘡。諸家以其能治熱利而謂其苦寒。余據本經苦溫之說。用治寒痢亦頗有效。可知白頭翁之治利。其效在燥而不在溫或寒。凡利則腸必挾濕而失其收縮之力。故不問寒熱。凡濕重皆當用燥濕收濕之藥。白頭翁以燥腸濕見長。故爲治利之要藥。寒者可與溫藥同用。熱者可與清藥同用。凡溫性藥之可以兩用者。不乏其例。明乎此則可以免寒溫之惑矣。

○白頭翁湯 治熱利下重

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮

○治中結腸丸 治斷冷滯下赤白青色如魚腦脫肛出積日腹痛經時不斷

赤石脂 吳茱萸 乾薑 附子 當歸 厚樸 白朮 木蘭皮

白頭翁 黃連 黃柏 石榴皮

第一方以白頭翁燥濕散寒。黃連黃柏秦皮清熱燥濕。濕化爲熱而利。溫燥以治未化之濕。清燥治已化之濕。此濕病之所以溫清並用也。第二方以赤石脂石榴皮收瀉。吳茱萸乾薑附子散寒。厚樸白頭翁燥濕散寒。木蘭皮黃連黃柏清熱燥濕。白朮利濕。當歸行氣散濕。本方所治。雖曰冷利。依然寒熱夾雜。故寒溫並用。下赤白青色如魚腦者。係消化後腸中不能吸收而回出者也。故燥濕之外。佐以收瀉。使回復腸之吸收力也。

性味 苦寒有毒

效用 主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道

說明 甘遂性味苦寒。本經主治大腹疝瘕。腹滿。面目浮腫。因濕阻而水積。故以燥濕利水主治。濕盛則水不化而有留飲。食不消而有宿食。氣阻血滯而結爲癥堅積聚。故燥濕清熱可以治留飲。消宿食而破癥堅積聚。癥堅破而積聚散。則水穀道自利矣。甘遂爲除痰逐水之專藥。其性偏激。取效極速。用之不當。流弊亦多。非有積痰積水。不可輕用。以峻銳之氣。直達病所。中病則佳。過度足以傷氣。氣虛而不能化水。必續有所積也。故須確有把握。審慎用之。以期有利而無害。

○十棗湯 治懸飲內痛脅下有水氣脉弦數

芫花 甘遂 大戟 大棗

○神祐丸 治陽水腫脹大小便秘

芫花 甘遂 大戟 大棗 大黃 輕粉 黑牽牛

○控涎丹 治脅下痰積作痛

甘遂 大戟 白芥子

第一方以芫花甘遂大戟逐水。大棗和脾氣。懸飲內痛而脉弦數。已化熱也。故可攻之。本方用大棗十枚。故以十棗名其湯。十棗之用。全在引諸藥入脾。以促起其消水之力。否則利水不盡。而懸飲不消。脉絃數。積水已化熱也。故以苦寒主治。第二方以芫花甘遂大戟利水消腫。大黃輕粉清熱利大腸。以通大便。黑牽牛瀉腎濕通小便。大棗引諸藥入脾利水。本方治陽水腫脹。係濕盛而熱結也。不但水腫而大小便俱祕。故利水之外。更清腸腎之濕。使濕去而通大小便也。第三方以甘遂大戟利水。白芥子散濕利痰。脅下不但痰積。且有流飲。故以化痰逐水主治。

性味 苦溫有大毒

效用 主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道

說明 天南星性味苦溫。本經主治心痛寒熱結氣積聚伏梁。濕阻而氣滯則心痛。濕滯爲寒。濕化爲熱。濕阻則氣結而有積聚。飲食不化則爲伏梁。梁與梁通。言有積食也。故苦以燥濕。溫以散寒。可以治心痛而愈寒熱。散結氣積聚而化伏梁。濕阻則氣滯而傷筋。氣阻而寒滯則成痿。筋爲濕阻而失其張弛作用則或拘或緩。故燥濕散寒可以療傷筋起痿而治拘緩。因濕阻寒滯而水道不利。故燥濕散寒可以利水道。或以天南星爲風藥。因燥濕散寒可收驅風利氣之效也。其治痰病。因寒濕阻滯所致。故燥濕散寒可以除痰而利氣也。

○易簡三生飲 治卒中及痰厥等證

天南星 川烏 生附子 木香