

證治心得卷七目錄

不寐

健忘

驚悸怔忡

癲狂

癇

痙

厥
附
卒
倒

汗

脫

證治心得卷之七

調節
一均

松濤周經樞

嘉善雲峯吳
炳輯著
子
樹人
仁培
參
門人

壽田
仁基

友梅凌文炳
選樓范廷璇

校

不寐

經曰。衛氣者。晝行于陽。夜行于陰。常從足少陰之分。間行于五臟六腑。厥氣客之。則

衛氣獨衛其外。行于陽不得入于陰。行于陽則陽氣盛。陽氣盛則陽蹻滿。不得入于

陰則陰氣虛。故目不瞑。半夏秫米湯主之。

內經不講心惟講和胃而通陰陽故用半夏秫米湯

衛氣行陽則寤行陰則寐此

其常也失其常則不得靜而藏魂目不得瞑也

景岳謂不寐之因。病雖非一。知邪正二字。則盡之矣。蓋寐本

乎陰。神其主也。神安則寐。神不安則不寐。其所以不安者。一由邪氣之擾。一由營氣

之虛耳。凡傷寒溫熱之不寐者。皆外邪深入擾之也。

傷寒論云陽明病不得眠凡有擾

水溼宜利食滯宜消仍當于各門求治之清

有痰火擾亂。心不藏神者。宜清火滌痰。

先用滾痰丸次用安神丸清心散涼膈散之類或痰涎沃膽神不歸舍者宜溫膽湯虛者六君子湯加棗仁

黃芩。膽熱者口苦心煩。用桑葉丹皮止慄等輕清少陽法。或焦煩過度。而離宮內燃。

從補心丹及安神丸法。心事煩冗晝夜不寐乃心火上乘陽分衛氣不得
鬱而耗損心脾。示養心湯及歸脾湯法。心脾二臟不足雖有痰火亦不宜過子攻治。凡病後及婦人產後不得眠者皆血氣虛而
以補養爲君或佐清痰降火藥或精不凝神而龍雷震蕩當壯水之主合靜以制動法或肝血無藏而
桂八味丸附而魂搖神漾有鹹補甘緩法營氣傷極人參人乳並行陽浮不攝七味八味可選桂八味丸餘如因驚宜鎮因怒宜疏飲食痰火爲實新產病後爲虛總之無邪而不寐者營氣不足也營爲血血虛則心無以養心虛則神不得安或寐時驚惕或若有所繫戀或無因而妄想皆心腎不交所致也當養心腎之陰及去靜中之動則得之矣。

選方

半夏秫米湯

經內

硃砂安神丸

入門

黃連一名安神丸一名黃連安神丸當歸

溫膽湯

驗集

半夏竹茹茯苓枳實西牛黃

清心丸

黃連爲丸黃芩黃連爲衣黃芩下

清心散

芒草薄荷竹梔子黃連翹黃芩

養心湯

醫鑑

六君子湯

見風

黃歸耆

天王補心丹

歸脾湯

火見

柏人參仁

涼膈散

八味丸

見熱潮

半甘夏草
麵

肉桂七味丸

見血吐

遠伏志神

肉茯苓

滾痰丸

喘見

五川味芎



南京中医药大学图书馆版权所有



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.er tong book.com

健忘

健忘者。陡然而忘其事。思之不得也。探內經之原。俱責之心腎不交。

于上則亂而善
于下則順而忘

忘也。心不下交于腎。則濁火亂其神明。腎不上交于心。則精氣伏而不靈。火居上則因

而生痰。水居下則因而生躁。躁擾不靜。遂致健忘。故惟補腎而使之時上。養心而使之交下。則

神氣清明。志意常治。自不健忘矣。其爲證可枚舉也。或思慮過度。而病在心脾。歸脾

湯。丹引神歸舍亦可。舍或勤政勞心。讀書刻苦。定志丸。安神或累賦陰魄不足。神志虛擾。宜定志丸及孔聖枕中丹。或

積瘀在上。宜琥珀丹參桃仁丹皮之類。或上虛下熱。宜天王補心丹。或年老神衰。宜加減固本丸。或精神短少。云經

心藏神。腎藏精。卽心腎虛也。宜人參養營湯。心氣不足。四君子去白朮。加菖蒲。遠志。硃砂。蜜丸。心火不降。腎水不升。神明不定而健忘。六味丸。五味遠志健忘

之故。約略盡矣。石頑曰。因病而健忘者。藥力可治。若生平健忘。乃心大竅疏之故。豈藥石所能治哉。

選方

引神歸舍丹

入門

膽星

辰砂

川附

童便

製

安神定志丸

定志丸

金千

人參
麥冬

人參

白朮

仁志

志遠

志骨

遠志

黃芩

牛黃

志石

砂神

菖蒲

茯神

砂蒲

菖蒲

眼

蒲

龍

菖

蜜

遠

九志

導痰湯

六味丸

人參固本丸

火見

辰茯

砂神

遠龍

爲衣

遠志

黃芩

牛黃

志石

砂神

菖蒲

眼

蒲

龍

菖

蜜

遠

九志

歸脾湯

見疽

黃疸

人參養營湯

見瘡

火見

辰茯

砂神

遠龍

爲衣

遠志

黃芩

牛黃

志石

砂神

菖蒲

眼

蒲

龍

菖

蜜

遠

九志

四君子湯

見痘

火見

辰茯

砂神

遠龍

爲衣

遠志

黃芩

牛黃

志石

砂神

菖蒲

眼

蒲

龍

菖

蜜

遠

九志



南京中医药大学图书馆版权所有

驚悸怔忡

人之所主者心。心之所養者血。心血一虛。神氣失守。神去則舍空。此驚悸之肇端也。經云。驚則心無所依。神無所歸。慮無所定。故氣亂也。大凡可畏之事。猝然而至者謂之驚。故驚證大人亦有之。小兒最多。因其神志未堅。膽氣未充。每遇稍異之形聲。或聞大聲。或目見異物。遇險臨危。當其外有所觸。心忽一虛。神即失守。卽陡然而驚矣。驚之所傷。由心猝及乎膽。由膽猝及乎肝。遂致目睛不轉。口不能言。短氣自汗。體倦而坐臥不安。寐多異夢。隨卽驚覺。脉必動如豆粒。急當鎮定。內經所謂驚者平之也。黃連安神丸。平補正心丹。或溫膽湯。加棗仁遠志菖蒲。隨證選用。景岳云。是證宜安養心神。滋培肝膽。葉氏謂經言驚則氣亂者。火氣亂之也。必兼清火治之。若專用補方。則肝膽之火不靜。驚不能定也。若小兒驚證。見證與治法不同。心爲君火。兼肝膽中相火。風木。驟然而起。致搐搦神昏。肢冷厥逆。吐乳身熱。目竄口噤。所患皆心肝膽之見證。而並無外感風邪。此因外受之驚。而動內之木火風也。宜安養心神。鎮驚定怯。甘涼以清內熱。柔潤以熄肝風。或少佐芳香。通其竅絡。舒其結閉。至于剛熱燥濇表散之藥。概不可投。若無驚而但

感外邪者。當按六淫施治。與驚字毫無關涉也。金匱云。寸口脉動而弱。動則爲驚。弱則爲悸。悸而生內石頑曰。悸卽怔忡之謂。怔忡驚悸久而成也。心下惕惕然跳築築然動。怔怔忡。本無所驚。自心動而不寧。其作也無時。卽所謂悸也。或陽氣內虛。宜參耆朮草或陰血內耗。歸龍眼地宜參麥丹或因水飲停于心下。水氣凌心。宜六君去參草加茯神或用控涎丹有急急富貴戚戚貧賤。或事故煩冗。用心太過。甚至一經思慮便動。皆當以養心血。調心氣。清熱豁痰爲主。宜天王補心丹加鎮攝藥若心火內熾者。清心安神。宜辰砂安神丸加氣鬱不宣者。調中散鬱。宜加味四七湯或因驚而成。治宜參入化痰。辰砂遠丹加志。或陰火上冲。怔忡不已。甚至頭暈眼花。耳鳴齒落。宜進滋陰降火。加養心以治之。六味丸加茯神棗仁若久服不愈。有無根失守之火。脉必空豁。宜溫補方中。加附子以佐治。夫悸之證狀不齊。總不外乎心傷而火動。火鬱而生涎也。至虛實之分。氣血之辨。肥人多屬痰飲瘦人多屬血虛與陰火上冲在臨證時詳審之。又有卑憚一證。亦由心血不足。與怔忡病相類。其證胸中痞塞。不欲飲食。心中常有所歉。愛居暗室。見人卽驚避無地。似失志狀。失志由所求不遂或過縱自悔噓嗟夜語。咄咄書空。若有所失。宜人參養榮湯。加遠志以治之。

脉法

沉滑者痰鬱。弦滑有力者痰結。偏弦或皆沉細者停飲。沉結或弦者氣鬱。右脉大而無力者氣虛。左脉微細。或虛大無力者血虛。

選方

平補正心丹

方局

歸身齒

遠志

菖蒲

生棗仁

地

人參

柏子仁

桂

薑

甘草

山藥

赤

茶

柏子仁

桂

五味子

麥冬

子

硃砂

神

加味四七湯

三因

半夏

茯神

遠志

厚朴

菖蒲

紫蘇

生棗

地

人參

柏子仁

桂

薑

甘草

山藥

赤

茶

柏子仁

桂

五味子

麥冬

子

硃砂

神

六君子湯

六味丸

見

中

遠志

厚朴

菖蒲

紫蘇

生棗

地

人參

柏子仁

桂

薑

甘草

山藥

赤

茶

柏子仁

桂

五味子

麥冬

子

硃砂

神

天王補心丹

火

見

人參養榮湯

瘡

控涎丹

飲

痰

黃連安神丸

即硃砂

安神丸

溫膽湯

寐

不



南京中医药大学图书馆版权所有

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.er tong book.com

癲狂

天地一陰陽也。陰陽和則天清地寧。一有偏勝。遂有非常之變。人身亦一陰陽也。陰陽和則神清氣定。一有偏勝。自致不測之疴。故難經曰。重陽者狂。重陰者癲。古人以爲陽併于陰。陰併于陽。此誠不刊之論。王太僕云。多喜爲癲。多怒爲狂。大都鬱抑不得志者恆多癲。證在腑。痰流胞絡也。故時發時止。狂證在臟。痰聚心主也。故發而不止。雖有輕重之分。然皆心神耗散。不能制其痰火而然。癲狂之脉滑實大者易愈。小堅急者不治也。言乎現證。狂則少臥不飢。不欲食故妄走也。妄言罵詈。以陽盛則使人罵詈不避親疏甚至登高而歌。陽盛則四肢實故能登高也。棄衣而走。以熱盛于身故欲棄衣也。其候多躁而常醒。由大驚。大驚而動心火大怒。大怒而動肝火病在心肝膽胃。三陽併而上升。故火熾則痰湧。心竅爲之壅塞。神明不得出入。主宰失其號令。心反爲痰火所役也。當分痰火多少而治。或吐之下之。清之抑之。古人治法先奪其食使不長氣于陽有因上焦實熱者。宜生落飲有因陽明實熱者。湯有熱有結承氣有因失魄狀若神靈所附者。宜丹鎮有因痰血鬱結者。宜滾痰丸牛黃清心湯狂證不外乎是矣。

癲證初發則意不樂。語言有頭無尾。或歌或哭。如醉如癡。甚則不知穢潔。如有所見。

其候多靜而常昏。由積憂積鬱。病在心脾胞絡。三陰蔽而不宣。故氣鬱則痰迷。神志

爲之混淆。痰少降則正性復明。痰復升則又發。治宜養心化痰。一云先以吐劑控涎丹湧去痰涎次進琥珀散安神

之劑治之。有因驚而得者。宜抱膽丸

有心氣不足。神不守舍者。宜歸神丹有痰迷心竅者。宜金箔鎮

丸有痰火俱盛者。宜清心丸有愈而復發。作止無常者。宜斷癰丸至若婦人患癲。或由血

分不調。宜加味逍遙散或心風血迷之故。心風一證。精神恍惚。喜怒不常。言語時或錯亂。有癲之意。不如癲之甚。亦痰氣所爲也。宜星香散加竹瀝蒲人參汁。

癲證之大略如此。凡治癲狂。固無補法。然久病而致氣血大虛。亦宜分而治之。此寧志膏。靈苑方。神應丹。所由設也。

死候

癲發如狂者不治。蓋由心之陽。不勝陰氣之逆。神明散亂。陽氣暴絕。故發如狂。下泄者不治。蓋癲本邪入于陰。陰氣塞于上。則氣亦逆奔而上。今氣下泄。將見腎氣虛脫故也。又神脫目瞪如愚者不治。

脉法

癲狂脉大滑實及浮洪者易治。沉結者病已入骨矣。不治。

選方

生鐵落飲

防風落元參石膏龍齒茯神

鎮心丹

因三

琥珀 猪砂心血和龍丸齒

琥珀散

方類

菖蒲

琥珀

人參

香參

茯神

遠志

抱膽丸

水銀砂

成砂

子砂

各子

次下

二兩

黑鉛

兩半

乳香

乘熱

用柳

木槌

攪研

將鉛

入銚

內鎔

丸空

鎔化

下井

心花

水銀

歸神丹

話曜心仙

人參

金箔

仁

茯神

遠志

斷癇丹

門入

黃蟬

春回

人參

金箔

仁

茯神

遠志

星香散

簡易

木南

香星

黃蟬

春回

人參

金箔

仁

茯神

遠志

寧志膏

良方

人參

蜜丸

薄荷湯

下

辰砂

一兩

朱仁

酒湯

下

神應丹

硃砂不拘多少研細末飛過後猪心血和得湯所下蒸

牛黃丸

見風

中

白虎湯

見暑

黃連瀉心湯

見溼

加味逍遙散

見火

承氣湯

見寒惡

白金丸

見滿瘡

滾痰丸

見喘

控涎丹

見飲痰

清心丸

見不寐

清心散

見不寐



南京中医药大学图书馆版权所有

癇

癇證者。發作無時。卒然仆地作聲。醒吐涎沫。甚則筋脉瘛瘲是也。

癇病方萌耳後高骨間必有青紋紛

如線見之急用爪破須令血出。啼叫尤得通氣更易見效。

後人因其聲之似。分馬牛雞羊豬五癇之名。其候經

時而必止。

肝癇反折上竄。有類羊叫。直視吐沫體直如犬絕類豬叫。犬吠。

王肯堂曰。千金叙六畜癇。無五臟之分。而錢氏始分之。發作似羊

犬等聲者。咽喉爲風痰所梗故也。其理甚明。言六畜者強分之耳。治法不必分五癇也。

癇病之原。有腎虛風動者。有因驚而得者。有氣鬱生痰者。大端不外此三因也。

腎水虛則龍火上升。而肝家雷火亦相從協助也。惟有肝風。故作搐搦。即所謂風癇也。

必先屈手指如數物狀乃發。是由熱盛生風所致。

搐搦則通身之脂液逼迫而上。隨逆氣而吐出于口。斯時

陰陽相薄。氣不得越。故併作諸聲。證狀不一。古人雖分五癇。大要以補腎爲本。豁痰

爲標。或因母腹受驚。或因猝然聞驚而得驚。則傷心。心傷則神出舍空。痰涎乘間而

歸之。以致涎潮上湧。神昏卒仆。卽所謂驚癇也。又宜安神鎮攝。順氣豁痰。石頑云。癇

證之發。往往生于鬱悶之人。鬱則氣滯。滯則生火。氣滯則易生痰飲。火動則鼓其痰。歸之。以致涎潮上湧。神昏卒仆。卽所謂驚癇也。又宜安神鎮攝。順氣豁痰。石頑云。癇

涎。雖不聞驚亦作。又宜開鬱清火滌痰以治之。葉氏云。癇之實者。用五癇丸以鎮攝。
控涎丹以劫痰。龍薈丸以瀉火。虛者當補助氣血。調攝陰陽。養榮湯。河車丸之類主之。
徐靈胎云。是證必用通神明。鎮痰涎之法。其方甚多。非尋常清火通氣之藥可愈。
諸癇發不能言者。蓋咽喉爲氣之道路。風傷其氣。以掩聲音道路之門。抑亦血
滯于心。心竅不通所致耳。南星炮爲末。豬膽汁調和少許。若癇證已愈。防其再發。亦
效。若錢氏五癇丸。以菖蒲湯下。治癇之要藥也。

須峻補氣陰。經年常服爲宜也。

宜十全大補湯。加遠志沉香。若稟氣素虛者。鹿角膠丸。

死候

神脫目瞪者死。病後發癇者死。發時遺尿者死。

脉法

浮滑洪數爲風癇。弦細微緩爲虛癇。浮爲陽癇。沉爲陰癇。虛弦爲驚。沉數爲實熱。
總之弦滑者有神者可治。細緩者雖久劇亦可治。惟急實及虛散者皆不可治也。

選方

五癇丸

錢氏

硃砂

水銀

黑鉛

真珠

雄黃

河車丸

遠志 河車

人參 丹參

蜜 茯苓

茯神

河車丸

<