

涼血養營煎七

治痘瘡血虛血熱地紅熱渴或色燥不起

及便結溺赤凡陽盛陰虛等證悉宜用此

生地黃

當歸

芍藥

生甘草

地骨皮

紫草

黃芩

紅花

水一鍾半煎服量兒大小加減用之○渴加天花粉○肌熱無汗加柴胡○熱毒甚者加牛旁子木通連翹之屬○血熱毒不透者加犀角

柴葛煎

八

治痘疹表裏俱熱散毒養陰及瘟疫等證

柴胡

乾葛

芍藥

黃芩

甘草

連翹

水一鍾半煎服

搜毒煎

九十

解痘疹熱毒熾盛紫黑乾枯煩熱便結純陽等

證

紫草

地骨皮

牛旁子

杵

黃芩

木通

連翹

蟬退

芍藥

等分

水一鍾半煎服○渴者加天花粉麥門冬○陽明熱甚頭面

牙齦腫痛者加石膏知母○大腸乾結實臍腹實脹者加大

黃芩硝○血熱妄行者加犀角童便○小水熱閉者加山梔

車前子○兼表熱者加柴胡

六物煎十二

治痘疹血氣不充隨證加減用之神效不可盡

述并治男婦氣血俱虛等證

炙甘草

當歸

熟地

或用生地

川芎

三四分不宜多

芍藥

俱隨宜加減

人參

或有或無隨虛實用之氣不虛者不必用

右咀用水煎服○如發熱不解或痘未出之先宜加柴胡以

疎表或加防風佐之○如見點後痘不起發或起而不貫或

貫而漿薄均宜單用此湯或加糯米人乳好酒肉桂川芎以

助營氣○如氣虛痒塌不起加川山甲炒用○如紅紫血熱

不起宜加紫草或犀角○如脾氣稍滯者宜加陳皮山楂○
如胃氣虛寒多嘔者加乾薑炒用或加丁香○如腹痛兼滯
者加木香陳皮○表虛氣陷不起或多汗者加黃芪○氣血
俱虛未起未貫而先癢者加肉桂白芷○如元氣大虛寒戰
咬牙泄瀉宜去芍藥加黃芪大附子乾薑肉桂

六氣煎

治痘瘡氣虛癢癍倒陷寒戰咬牙并治男婦陽

氣虛寒等證

黃芪

炙

肉桂

人參

白朮

當歸

炙甘草

右咀水煎服○加減法照前六物煎

九味異功煎二 治痘瘡寒戰咬牙倒陷嘔吐泄瀉腹痛虛

寒等證○用代陳氏十二味異功散等方

人參

二三錢

黃芪

炙一錢

當歸

熟地

各二三錢

炙甘草

七分或一錢

丁香

三伍分或一錢

肉桂

一錢

乾薑

炮一錢

製附子

一二錢

右量兒大小加減用水一鍾半煎七分徐徐與服之○如泄

瀉腹痛加肉豆蔻麪炒一錢或加白朮一二錢

透邪煎

三

凡麻疹初熱未出之時惟恐誤藥故云未出之

先不宜用藥然解利得宜則毒必易散而勢自輕減欲求安當當先用此方為主

當歸

二三錢

芍藥

酒炒一二錢

防風

七八分

荆芥

一錢

炙甘草

七分

升麻

三分

水一鍾半煎服○如熱甚脉洪滑者加柴胡一錢○此外凡有雜證俱可隨宜加減

牛膝煎

二四

截瘡大效凡邪散已透而血氣微虛者宜此主

之

牛膝

二錢

當歸

陳皮

各三錢

右用好酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎至八分溫服

何人飲

二五

截瘧如神凡氣血俱虛久瘧不止或急欲取效

者宜此主之

何首烏

自三錢以至一兩隨輕重用之

當歸

二錢

人參

三五錢或一兩隨宜

陳皮

二三錢大虛者不必用

煨生薑

二片多寒者用三五錢

水二鍾煎八分於發前二三時溫服之○若善飲者以酒一

鍾浸一宿次早加水一鍾煎服亦妙再煎不必用酒

追瘧飲

又二五

截瘧甚佳凡血氣未衰屢散之後而瘧有不止

者用此截之已經屢驗

何首烏一兩

製富歸

甘草

半夏

青皮

陳皮

柴胡各三錢

右用井水河水各一鍾煎一鍾粗亦如之同露一宿次早溫服一鍾飯後食遠再服一鍾

木賊煎二六

凡瘧疾形實氣強多濕多痰者宜此截之大效

半夏

青皮各五錢

木賊

厚朴各三錢

白蒼朮

檳榔各一錢

用陳酒二鍾煎八分露一宿於未發之先二時溫服

牙皂散二七

治胃脘痛劇諸藥不效者服此如神

用牙皂燒存性以烟將盡爲度研末用燒酒調服一錢許卽效

荔枝散二八

治疝氣痛極凡在氣分者最宜用之并治小腹

氣痛等證神效○又心腹久痛方如後

荔枝核炮微焦 大茴香等分炒

右爲末用好酒調服二三錢○如寒甚者加制過吳茱萸減半用之○凡心腹胃脘久痛屢觸屢發者惟婦人多有之用荔枝一錢木香八分爲末每服一錢清湯調服數服除根

豕膏二九

內經曰癰發於隘中名曰猛疽猛疽不治化爲膿

膿不寫塞咽半日死其化爲膿者寫則合豕膏冷食三日已
○此必以猪板油煉淨服之也

又萬氏方○治肺熱暴痞○用猪脂一斤煉過入白蜜一斤
再煉少頃瀘淨冷定不時挑服一匙卽愈○按此方最能潤
肺潤腸凡老人痰嗽不利及大腸秘結者最宜用之

又千金方○治關格閉塞○用猪脂薑汁各二升微火煎至
二升加酒五合和煎分服之

愚意先以當歸半斤濃煎取汁煉過猪脂一斤同煉去其水
氣乃入白蜜一斤再煉少頃瀘淨收貯不時挑服用治老人

之秘結及噎膈閉結等證必無不妙如果陽氣不行者仍加
生薑四兩同當歸煎入或宜酒者以酒送服亦可或氣有不
利者加杏仁二兩去皮尖同煎入皆妙或有滯者當以錫
代蜜更妙是卽內經所謂以辛潤之也

卷傷寒結胸法

三十

凡病傷寒結胸其中有中氣虛弱不堪攻
擊內消者須以此法外卷之則滯行邪散其效如神

葱白頭

生薑

生蘿蔔

此味加倍如無以子代
之

右用葱薑各數兩蘿蔔倍之共搗一處炒熱用手巾或白布
包作大餅卷胸前脹痛處此藥須分二包冷則輪換卷之無

不卽時開通汗出而愈但不宜太熱恐炮烙難受也

又法以大蒜一二十頭搗爛攤厚紙或薄絹上貼於脹處少頃卽散用治一切脹痛無不神妙

連翹金貝煎

治陽分癰毒或在臟腑肺膈胸乳之間者

此方最佳甚者連用數服無有不愈

金銀花

貝母

土者更佳

蒲公英

夏枯草

各三錢

紅藤

七八錢

連翹

一兩或五七錢

用好酒二碗煎一碗服服後煖臥片時○火盛煩渴乳腫者

加天花粉○若陽毒內熱或在頭項之間者用水煎亦可

連翹歸尾煎

三二

治一切無名癰毒丹毒流注等毒有火者

最宜用之

連翹

七八錢

歸尾

三錢

甘草

一錢

金銀花

紅藤

各四錢

用酒煎服如前○如邪熱火盛者加槐蕊二三錢

桔梗杏仁煎

三三

此桔梗湯之變方也○治欬嗽吐膿痰中

帶血或胸膈隱痛將成肺癰者此方為第一

桔梗

杏仁

甘草

各一錢

阿膠

金銀花

麥冬

百合

夏枯草

連翹 各二錢

貝母 三錢

枳殼 錢半

紅藤 三錢

水二鍾煎八分食遠服○如火盛兼渴者加天花粉二錢

當歸 蒺藜 煎 三四

治癰疽瘡疹血氣不足邪毒不化內無實

熱而腫痛淋漓者悉宜用之此與芍藥蒺藜煎相為竒正也

當酌其詳

當歸

熟地

芍藥 酒炒

何首烏 各一錢

炙甘草

防風

川芎

荆芥穗

白芷 各一錢

白蒺藜 炒搗碎三錢或五錢

右或水或酒川二鍾煎服然水不如酒或以水煎服後飲酒

數杯以行藥力亦可○陽虛不能化毒者加桂枝甚者再加
乾薑附子○氣虛不化者加黃芪人參○毒陷不能外達者
加川山甲或玄皂刺

芍藥莢藜煎

三五

治通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡

神效外以蠶蛸粉敷之

龍膽草

梔子

黃芩

木通

澤瀉

各錢半

芍藥

生地

各二錢

白莢藜

連刺槌碎
五錢甚者

一
兩

水二鍾煎八分食遠服○如火不甚者宜去龍膽梔子加當

歸茯苓薏仁之屬○如濕毒甚者加土茯苓五錢或一二兩

降癰散 三六

治癰疽諸毒消腫止痛散毒未成者卽消已成

者歛毒速潰可愈若陽毒熾盛而疼痛勢凶者宜先用此方

其解毒散毒之功神效最速 若堅頑深固者宜用後方

薄荷

辛佳者用葉

野菊花

連根葉各一握

土貝母

半之

茅根

一握

右乾者可爲末鮮者可搗爛同貝母研勻外將茅根煎濃湯

去粗用調前末乘熱敷患處仍畱前刺湯頻煖不時潤於藥

上但不可用冷湯冷則不散不行又能爲痛約敷半日卽宜

換之真妙方也

後方 凡疽毒堅頑深固及結核痰滯宜用此方

腦荷

倍用

生南星

土貝母

朴硝

各等分

石灰

風化者亦倍用
或倍倍用之

右同爲末用鹽鹵調杵稠粘敷患處經宿乾卽易之不必留
頭若膿成者留頭亦可或炒熱攤絹上隔絹貼之亦可或用
麻油調或用熱茅根湯調亦可若欲止痛速效加麝香或米
片少許更妙

百草煎

三七

治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒