

方淋洗如聖散

頑荊子

苦參

玄參

紫參

厚朴

荊芥

沙參

陳皮

麻黃

各一兩

蔓荊子

防風

白芷

威靈仙

各二兩

桃枝

柳枝

各一把

右爲末水五升藥末五錢煎數沸臨臥熱洗之神効。

治大風疾遍身癰疹瘙痒麻木在上以醉仙散。

方醉仙散

枸杞子

胡麻子

蔓荊子

牛蒡子

各五錢已上一處同炒

白蒺藜

苦參

天花粉

防風

各五錢

輕粉

四錢

右爲末每服一錢茶清調下空心日午臨臥各一服服後六

七日先於牙縫內出臭黃涎或惡血渾身疼痛昏悶如醉

以後便利濃血病根乃去在下以通天散取惡物於穀道中出之即愈

方通天散

大黃

獨生皂角

各一兩俱生

右件依法脩合爲細末每服二錢臨臥時以冷酒調下俱量病之大小虛實加減與之症候重而急者視診脉浮緩者易治洪大而數者難愈又云沉實者難愈黑者不治大都未必盡由於風亦有嗜慾勞動氣熾血熱汗泄不避而風冷濕使淫氣與衛氣相干不得施化血聚則肉爛而生蟲食肝眉落食脾鼻崩食肺聲啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴秋秋耳弦生瘡或痒或痛如針刺狀食身則皮痒如蟲行治療大法先以再造散下之以稀粥養半月爲愈

方再造散

大黃

獨生皂角

鬱金

名壹兩俱生

白牽牛

半生半炒取頭末六錢

右件依法製度爲細末每服二錢臨臥冷酒調下

治身上虛痒此血不榮於腠理所致痒也以四物湯加酒黃芩

方見三卷內

煎調紫背浮萍末服痒其加荊芥蟬蛻

方浮萍散

紫背浮萍

三錢

荊芥

川芎

甘草節

白芍藥

麻黃

當歸

各一錢五分

豆豉

一撮

葱白

二枚

右爲末每服二錢或同煎調服

治厲瘋須常服黃精丸生血祛毒

方黃精丸

蒼耳葉

紫背浮萍

大栗子

各生包取汁

烏梢蛇

黃蘗

生地黃

甘草節

黃精

各等分

右件依法製度與前三味生汁和搗細焙乾為末麪糊為丸如梧桐子大每服七十丸溫酒食前送下。

治大瘋血虛以四神丹常餌之

方四神丹

菟活

玄參

熟地黃

當歸

各等分

右件依法製度為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸白湯空心送下。

治癩疾及癬瘡以浮萍散主之服取微汗

方見本卷前

〔病〕眼斷白人鼻梁崩塌皮膚瘡疥手足皴裂睡臥不穩步履艱

辛筋骨疼痛四肢少力兼治紫白癰風以何首烏甘菊花之類

〔方〕首烏甘菊散

何首烏

蔓荊子

石菖蒲

荊芥穗

甘菊花

枸杞子

威靈仙

苦參

各等分

右為細末每服三錢蜜茶不拘時調服

〔病〕大瘋癩面連頸極痒毛已脫榮衛熱附其氣不清故使鼻柱

崩壞皮膚色敗以補氣瀉榮湯

〔方〕補氣瀉榮湯

升麻

連翹

各六分

桔梗

五分

生地黃

黃芩

各四分

蘇木

黃連

黃芪

全蝎

地龍

各三分

人參 二分 當歸 三分

桃仁 二枚 甘草 一分五釐

右作一服。用水二鍾。酒一鍾。同前一鍾去渣。入後項末煎至八分。上午服。

白豆蔻 二分

梧桐淚 一分

水蛭 三枚

蜚蠊 三枚

麝香

少許俱另研為末

〔病〕手足頭面白屑痒瘡。皮膚皴燥。以白花蛇丸治之。

〔方〕白花蛇丸

白花蛇

一條。頭尾各去二寸。無灰好酒浸春三夏一秋。冬四日。慢火炙去皮骨。用肉切碎。曬乾入劑。

防風

一兩

當歸

二兩

川芎

白芍藥

荆芥

黃芩

酒浸各一兩

胡麻子

連翹

何首烏

升麻

羌活

桔梗

生地黃

各一兩

右件各依修製。同為細末。黃蠅酒和水打麵糊為丸。如梧桐

子大每服六七十丸。上體多食後下體多食前。用茶服外。
用摩風膏常搥。

〔方〕摩風膏

瓜蒌實 一枚去外硬皮用穰并仁俱搗碎 白芷 四錢

廣零香 四錢 甘松 二錢 防風 白芩 白欬

赤芍藥 黃芪 各一錢 杏仁 一錢 甘草 一錢

右件剉碎用菜油一斤。或芝蔴油浸二日。慢火炙藥色黃。瀝去渣。另放將好松香四錢。先入鍋內熬鎔。方下藥油再煎一沸。入黃蟬四兩。不住手慢火攪勻。磁器收貯。

〔治〕大瘋之疾。用搜風順氣丸服之。順氣祛毒。

〔方〕搜風順氣丸

車前子 一兩五錢 白檳榔 大麻子 炒去殼另研

郁李仁

兔絲子

牛膝

山藥

一兩

枳殼

防風

獨活

大黃

五錢半
生半熟

右件依法製度為末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服二十丸。用酒茶米湯下。早晨臨臥各一服。

○痔疾

夫痔既有數種之形。症治法豈能拘一也。若肛邊發露肉珠狀。如鼠乳。時時滴潰膿血。名曰牡痔。肛邊生瘡腫突出一枚數日。膿潰即散。名曰牝痔。腸口顆顆發壘。且痛且痒。出血淋瀝。名曰腸痔。腸內結核有血。寒熱往來。登廁脫肛。名曰腸痔。每遇大便。清血隨下而不止。名曰血痔。每遇飲酒發動。瘡痛而流血。名曰酒痔。憂恐鬱怒。適臨乎此。立見腫痛。大便艱難。強力而肛出不收。名曰氣痔。其形有六。如蓮花。鷄冠。核桃。小如牛乳。鷄心。鼠尾。

櫻桃之狀。或藏肛門之內。或突出於外。原其所因。皆由風熱乘
食飽不通氣。逼大腸而作。或醉飽行房。忍泄前因之氣。歸於大
腸。木乘火勢而侮燥金。故火就燥也。大腸閉澀。必作大痛。蓋熱
則血傷。血傷則經滯。經滯則氣逆。行血俱滯。乘虛而墜入大腸。
此所以爲痔也。經曰。因而飽食。筋脉橫解。腸澀爲痔。故受病者
燥氣也。爲病者胃熱也。胃刑大便。則化燥火。以成燥熱之實勝。
風附熱而來。是濕熱風燥。四氣相合。故大腸頭成塊者。濕也。作
大痛者。熱也。大便燥結者。主病兼受火邪熱也。當去此四者。其
西方金主諸氣。其體收下。亦助病爲邪。須當以順氣藥兼之也。
其疾甚者。當以苦寒瀉火。解其熱毒。以辛溫。和血潤燥。疎風止
痛。是其治也。殊不知毒深其狀大。毒淺其形小。或流膿水。或出
鮮血。行坐之間。病者深爲之苦。久而不愈。血氣衰弱。必致穿穴。

成漏又有無痔肛門左右別有一竅流出膿血名曰草漏俱當戒酒遠色少勞茹淡以勿沉痼之苦豈不妙哉。

○脉症備詳

脉小實者易治。浮洪軟者難治。

痔病因風熱燥三者歸於大腸而成必須清熱涼血為本當以槐花條芩黃連等清熱歸地涼血枳殼疎大腸之滯升麻清累提氣。

如成漏必須先以大劑參芪歸朮為主以補之外以附子為末津吐捏餅子如錢厚以艾炷灸之令微熱勿使痛乾則易之或用十全大補湯濃煎成膏貼之亦效。

〔病〕痔漏有膿血六便結硬而作疼痛以麤朮白朮丸主之。

〔方〕麤朮白朮丸

秦艽

桃仁

另研

皂角仁

燒存性各一面

當歸鬚

澤瀉

枳實

白木

各五錢

地榆

三錢

右件依法製度為末麪糊為丸如芡實大令藥光滑焙乾每服五六十丸白湯空心送下服待少時以美物壓之

痔漏每大便時發痛疼如無疼痛者非痔漏也以主荒防風之類

方秦艽防風湯

秦艽

防風

當歸身

白木

各一錢五分

甘草

炙

澤瀉

各六分

黃蘗

五分

大黃

煨

橘皮

各三分

柴胡

升麻

各二分

桃仁

三十枚

紅花

少許

右咬咀水煎熟空心服

治痔漏疼痛大便燥硬以秦艽蒼木湯

方秦艽蒼木湯

秦艽 一錢五分

蒼朮

防風 各一錢

當歸 八分

澤瀉

大黃 各五分

檳榔

桃仁 另研一錢

黃蘗

酒炒八分

皂角仁

燒存性為末一錢

右咬咀先用水二盞煎至一盞入檳榔皂角仁桃仁再煎至

八分空心服待少時以美物壓之不犯胃也。

如有白膿加白葵花。

五朶去心細煎

青皮

五分

木香

五分

依前皂角仁同入。

〔病〕痔漏成塊下垂不任其癢以秦艽薤活湯

〔方〕秦艽薤活湯

薤活

一錢二分

秦艽

黃芪

各一錢

防風

七分

升麻

甘草

炙麻黃

柴胡

各五分

藁本

三分

細辛

二分

紅花

一分

右改咀水煎熟空心服。

〔方〕痔漏大便硬難出大腸頭下血苦痛不能忍以當歸郁李仁湯王之。

〔方〕當歸郁李仁湯

郁李仁

秦艽

麻仁

枳實

大黃

澤瀉

生地黃

蒼朮

當歸鬚

皂角仁

另為末

右改咀水煎熟調皂角仁末空心服

〔方〕痔漏經年不愈以紅花桃仁湯

〔方〕紅花桃仁湯

紅花

少許

桃仁

十枚

澤瀉

八分

蒼朮

六分

當歸鬚

防已

防風梢

猪苓

各五分

麻黃

二分

生地黃

一錢

黃蘗

一錢五分

右咬咀水煎熟食煎服

〔治〕痔漏大便結硬疼痛以秦艽當歸湯

〔方〕秦艽當歸湯

秦艽

大黃

煨量人虛實用

枳實

各一錢

當歸梢

澤瀉

皂角仁

白朮

各五分

紅花

少許

桃仁

二十枚

右咬咀水煎熟溫服

〔病〕痔腫疼痛大便下紫血迫促以犀角地黃湯主之加人參黃

芩地榆當歸

方見三卷內

〔治〕痔疾疼痛以洗痔湯熏洗或以鯨魚汁熏洗尤好或冬瓜皮

煎湯常洗。

〔方〕洗痔湯

枳殼

五錢

朴硝

三錢五分

薄荷

五錢

乾蓮房

荆芥 各一兩

右咬咀煎湯乘熱熏溫淋洗痔處

或加槐花 五錢 黃芩 三錢 艾葉 五錢

治腸風下血痔漏疼痛以槐角為主之 方見七卷內

病痔腫疼痛大便燥結以涼血寬腸湯

方涼血寬腸湯

當歸 生地黄 黃芩 各一錢 黃柏 七分 枳殼 八分

荆芥 甘草 各五分 防風 六分 桃仁 七枚

大黃 五分看虛實用

右咬咀水煎熟空心溫服。

病濕熱內甚因而飽食腸癖為痔久而成瘻以香殼黃連為主之。

方香殼黃連丸

木香

荊芥穗

黃蘗

各三斤

枳殼

厚朴

各五斤

黃連

一兩

蝟皮

一介燒灰

當歸

四錢

右件依法製度爲末。麪糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。熱水食前送下。一日三服。

病肛。如鼠乳。時時潰。膿血流出。或生肉如鼠乳。在孔中頗出在外。妨於更衣。此名牡痔。以蠶甲主之。腫痛生瘡。或從孔中起外腫。五六日自潰。流出膿血。此名牡痔。以蝟皮主之。肛边有瘡。痛或更衣出清血。此名脉痔。以蜂房主之。肛边核種發。寒熱或更挺出。久乃縮上。此名腸痔。以母猪左足懸蹄甲主之。大便清血。隨大便汚衣。此名血痔。及遇氣寒。溫勞濕。卽發。疼腫者。並以蛇蛻皮主之。五藥皆下篩等分。

隨其病倍其主藥但以井花水服半方寸。七病甚者日暮亦可四五服即瘥。

病痔疾疼痛其人氣血虛者以涼血益氣之劑。

方涼血益氣湯

人參

黃芪

各一錢

生地黄

川芎

各八分

升麻

條黃芩

枳殼

槐角

各五分

當歸

八分

黃連

三分

右以咀水煎熟空心服。

治諸痔熱甚大便閉結者以清涼飲主之。

方清涼飲子

當歸

赤芍藥

甘草

炙

大黃

蒸各等分

右件依法製度為末每服二錢新汲水調下。