

清咽利膈湯 治心脾蘊熱或咽喉腮舌腫痛

玄參

升麻

桔梗炒

甘草炒

茯苓

黃連炒

黃芩炒

牛蒡子炒

防風

芍藥炒各等分

右每服一二錢水煎

本事方治小兒毒氣攻腮赤腫可畏者

皂角

去核貳兩

天南星

生用貳錢

糯米壹合

右為細末薑汁調塗立効

臂癰

薛臂癰之證當分經絡所屬受證之因而治之

上廉屬手陽明經下廉屬手太陽經外廉屬手少陽

經內廉屬手厥陰經內之上廉屬手太陰經內之下廉屬手少陰經或經絡熱鬱風邪外干氣血有垂卽生癰毒若因心經有熱者導赤散加黃連心包絡有熱者柴胡梔子散肺經有熱者瀉白散大腸經有熱者大連翹飲喉腫作痛者氣血凝結也用仙方活命飲腫痛不消者欲作膿也用托裏消毒散膿熟不出者氣血虛也用托裏消毒散膿出反痛者氣血虛甚也肌肉不生者脾胃氣虛也用五味異功散不可外傳生肌散恐反助其邪而肌肉難長也

白芷升麻湯 治手陽明經分臂上生瘡

白芷

升麻

桔梗

各壹錢

黃芪

炒

黃芩

酒炒各貳錢

生黃芩

伍分

紅花

甘草

各伍分

右水酒半鍾煎食後溫服

大連翹飲

即大連翹湯

治肺熱生瘡

連翹

藎麥

荊芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬殼

甘草

炒

山梔子

黃芩

各等分

右為末每服二錢加紫草水煎服

大便不通量

加大黃

痃腫

薛腋癰屬足少陽手少陰手厥陰三經小兒患

之多稟賦肝火所致初起先用活命飲次用柴胡梔子散五七日間作膿焮腫作痛者亦用活命飲殺其大勢雖潰亦輕而易斂若膿已成用托裏消毒散已出用托裏散如有變證當隨證治之

脇癰

薛脇肋者足厥陰少陽之經相火之司也乃木

之主肝膽之氣不平則風火內搏榮逆血鬱熱聚爲膿而癰腫之所由生也亦有稟賦母氣肝膽之熱恚怒之火而致然初患焮腫作痛者宜用柴胡梔子散未消者用仙方活命飲其熱既殺而腫不消者則必

膿也乃用托裏消毒散其膿既成以代針膏決之
仍用托裏散自愈若膿出而痛止腫消則不必用藥
也

加味歸脾湯 治小兒因乳母憂思鬱怒胸脇作痛
或肝脾經分患瘡瘍之證或寒熱驚悸無寐或便
血盜汗瘡口不斂等證

人參

黃芪 炒

茯神 去木

甘草 炒

白朮 炒各壹錢

木香 伍分

遠志 去心

酸棗仁

龍眼肉

當歸

牡丹皮

山梔 炒各壹錢

右水煎乳母服兒亦服之

小柴胡湯 治肝膽經分一切瘡瘍發熱潮熱或飲

食少思加山梔牡丹皮名加味小柴胡湯 方見發熱

柴胡清肝散 治肝經風熱或乳母怒火患一切瘡

瘍 見肝熱

梔子清肝散 一名梔子 柴胡散 治三焦及足少陽經風熱生

瘡或發熱耳內生瘡作痒或出水疼痛 見腎熱

腹癰 薛腹癰者患於臍下或傷二寸許屬脾經近脇

屬膽經蓋因脾經陰虛氣滯血凝或因脾虛飲食積

熱所患若焮腫作痛者瀉黃散堅硬腫痛者清胃散

腫痛便秘者清涼飲如此而仍痛者瘀血凝滯也活
命飲既用此藥而不消則內欲作膿也用托裏消毒
散若膿出而痛不減者毒未解也亦用前藥若膿出
而反加痛及膿水清稀者氣血虛也用參芪托裏散
若食少體倦者脾氣虛也用五味異功散加當歸柴
胡升麻補熱內熱者脾血虛也用四君當歸丹皮如
有他證當隨證治之

薛 腎癰屬膀胱經溼熱或稟賦陰虛若腫硬作
痛用內托羌活湯微腫微痛用托裏消毒散若初起
大痛或五日之間似消不消似潰不潰者先用仙方

活命飲後用托裏消毒散若已潰食少體倦瘡不生
肌脾胃虛弱者用五味異功散加柴胡升麻稟賦陰
虛小便數而不斂者加減八味丸氣虛久不生肌收
口用豆豉餅及補中益氣湯培養元氣若用解熱攻
毒及敷圍寒涼之劑則氣血受傷必成敗證矣
內托羌活湯 治尻腎生癰堅硬腫痛

羌活

黃檗

酒製各壹錢

防風

藁本

當歸尾

各伍分

肉桂

連翹

甘草

炙

蒼朮

陳皮

各叁分

黃芪

捌分

右作二劑水一鍾入酒一杯煎空心服

腿癰

薛腿癰之證所主之經不同而所治之法亦異

發於內側者屬肝脾二經發於外側者屬膽胃二經
漫腫堅硬者元氣虛弱也用內補黃芪湯腫勢高熇
者元氣未虛也用內托柴胡黃芪湯外竝用隔蒜熨
法若瘀血凝滯而不消或不作膿者用活命飲血氣
虛弱而不能潰及不生肌肉者用托裏散此其梗槩
云爾 一小兒腿內側前膝患毒潰後腫硬色黯膿
清不斂面色青黃此脾虛肝旺兼寒邪襲於患處也
當壯元氣爲主先用異功散加柴胡升麻及蔥熨法

脾氣漸復患處漸愈佐以八珍湯豆豉餅而愈一

小兒腿外側痛腫肉色如故用托裏消毒散二劑而腫始赤又四劑而腫赤亦退又六劑潰而膿出清稀食少體倦用異功散加芎歸仍用托裏散補其元氣而愈 一小兒漫腫堅硬肉色不變此陽氣虛而不能成膿也用托裏散如聖餅腫起色赤用托裏消毒散而膿成針之用八珍湯加肉桂漸愈因傷食吐瀉患處天白飲食少思先用六君乾薑次用八珍湯及葱熨法而愈 一小兒患此久不愈膿水清稀面色

痿黃腹大青筋此脾氣虛爲肝所侮也朝用補中益

氣湯夕用五味異功散元氣稍復乃佐以四味肥兒丸及蔥熨之法兩月餘而愈 一小兒腿外膝腫一

塊服消毒之藥其腫益甚肢體羸瘦飲食少思更加作痛余曰先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也當補接陽氣不信仍投疎泄之藥後果歿機要云榮衛之氣充滿抑遏不能行故閉塞氣血腐而爲癰者當泄之以奪盛熱之氣若人飲食踈精神衰氣血弱肌肉消薄故榮衛之氣短促而滯滯故寒搏腠理閉鬱而爲癰者當補之以接虛怯之氣信矣

癰疽齊氏云肺癰肺痿因脾肺氣虛腠理不密外邪

所乘或母食辛辣厚味遺熱於兒或兒有病過於汗下內亡津液虛火燍肺或服剋伐之藥虧損脾胃不能生肺金其證惡風咳嗽鼻塞項強呼吸不利甚則四肢微腫咳唾膿血若吐臭穢胸中隱痛脉數而實者爲肺癰咳唾涎沫脉數而虛者爲肺痿惡寒喘嗽者寒邪內蘊也小青龍湯咳唾膿穢者肺癰內潰也桔梗湯竊謂前證若喘咳短氣者脾肺氣虛也五味異功散咳唾膿痰左尺脉數而無力者腎氣虛也六味地黄丸咳唾膿痰右關脉數而無力者脾氣虛也七味白朮散若發熱喘嗽唾膿不食者脾肺虛甚也

難治大要補脾肺滋腎水為善仍審五臟相勝此母七情後證倣此

小青龍湯 治傷風冒寒咳嗽喘急肺脹胸滿鼻塞

流涕或乾嘔熱咳或作渴或作噎或小便不利或

小腹痛滿此仲景之法審有是證用之及時殊有良驗

麻黃去節 赤芍藥 半夏各柒錢

細辛 乾薑炮 甘草炙

桂枝各三錢 五味子半兩杵 附子貳錢麻浮不用

右每服二錢水煎

桔梗湯 治咳嗽膿血腥穢已成癰證

桔梗炒 貝母去心 知母炒

桑白皮

炒

枳殼

各壹錢

地骨皮

瓜蒌仁

薏苡仁

杏仁

杵各伍分

當歸

黃芪

炒各壹錢

五味子

杵炒

百合

炒各壹錢五分

防已

壹錢

甜葶藶

炒五分

右每服二三錢水煎服

升麻湯

治肺癰膿血穢臭胸乳皆痛

升麻

桔梗

炒

薏苡仁

地榆

條芩

炒

牡丹皮

芍藥

炒

甘草

各等分

右每服二三錢水煎

排膿散

治肺癰此方排膿補肺

黃芪

鹽水拌炒

白芷

人參

五味子

炒研各等分

右為末每服一二錢蜜湯調下

射干湯

治胃脘癰吐膿血

射干

去毛

梔子仁

赤茯苓

升麻

赤芍藥

壹兩叁錢

白朮

伍錢

右每服三五錢水煎入地黃汁少許再煎服

人參平肺散

治心火剋肺金傳為肺癰咳嗽喘嘔

痰涎壅盛胸膈痞滿咽噎不利

人參

陳皮

甘草

地骨皮

茯苓

各壹錢

知母

炒柒分

五味子

炒

青皮

天門冬去心肆分

桑白皮炒壹錢

右每服二三錢

參芪補脾湯 治肺癰脾氣虧損咳吐膿涎或中滿

不食必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參 白朮各貳錢 黃芪炒貳錢伍分 茯苓

陳皮 當歸各壹錢 升麻叁分 麥門冬柒分

桔梗炒陸分 甘草炙伍分 五味子杵肆分

右作三服薑棗水煎

人參補肺湯 治肺證咳喘短氣或腎水不足虛火

上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱小便短澀

人參

黃芪炒

白朮

茯苓

陳皮

當歸

各壹錢

山茱萸

乾山藥

五味子

杵

麥門冬

去心

甘草

炙

熟地黃

自製

牡丹皮

各伍分

右每服五錢水煎服

腸癰

張仲景云腸癰之證因飲食積熱或母食辛熱

之物所致小腹按之則痛小便數似淋腹急惡寒身皮甲錯或自汗惡寒若脉遲緊未有膿者用仙方活命飲以解其毒脉洪數已有膿者服太乙膏以下其膿小腹疼痛小便不利者膿壅滯也牡丹皮散主之竊謂經云腸癰為病不可驚驚則腸斷而死故坐臥