

女科要旨卷三

閩長樂陳念祖脩園著

男蔚古愚參訂
元犀靈石韻註

孫男心典徽菴
心蘭芝亭全校字

產後

門人問曰產後症諸家議論不一治法互異而吾閩歷久相傳俱宗朱丹溪所云產後有病先固氣血故產後以大補氣血爲主雖有雜病以

未治之薛立齋汪石山極贊其妙而陳良甫單
養賢諸論皆不出其範圍虞天民葉以潛又以
去瘀血爲主二說互參可以得攻補兩大法究
竟當從與否曰此皆庸俗之見亦且一偏之言
不足聽也今節錄內經一條金匱產後全冊以
註之各家之說一概置之弗言所謂羣言淆亂
哀於聖是也

內經云乳子之而患時而寒病熱脈止懸小不宜實
大小產

後新虛故也。

手足溫則生

若脈雖懸小。而見手足俱寒。

是脾氣衰。緒陰氣暴

起則死。

內經又云。乳子中風。而身熱。以爲大熱。以喘鳴息肩者。爲風。
執逆於陽位也。其脉必至。實大。之中。而和。是
不能懸小。而實大。但須緩。脾
胃之氣尚急。則生。設見急。則絕必死。
見往來。胃氣已死。

此二節以脾胃爲主可知。內經所獨重。彼諸家互相辨駁。終不足言也。昔人云。片語會心。非是少卽讀書得間之謂也。

門人問曰金匱較傷寒論更爲難讀夫子於產後獨主之曷故曰醫儒者事也先其事之所難東魯明訓而因陋就簡直市醫耳且隨症條分名目臚列方治不得其頭緒如治絲而棼之也今舉金匱爲主若得其一知半解便足活人故全錄於左嘗論歷代未立考試醫生之制其夫業之輩混充之以爲餬口之術所以日流日下而女科其尤甚者若明理之人遇醫輩先詢之

曰岐黃後若仲景可稱上醫否不知者曰我不
知爲何人也其知之者曰漢代之醫聖相去久
遠而難從耳夫時有古今之異豈天之五運六
氣人之五臟六腑亦有顛倒變遷之異乎知與
不知不過以五十步笑百步耳設有明理者楷
錄此冊第一節第二節原文令時行之醫每句
淺淺講得下則是上好名醫卽一時講不下肯
執所錄原文携回查對各本舊註畧能敷衍講

得去便知渠家亦藏有正書必不至有大支離處亦是好醫或携其原文轉向心服之醫友處東摸西捉約畧於皮毛上說得來便知渠門尙有一二讀書好友亦不至有大荒唐處亦是好醫余欲求此數種人不能旦暮遇之實爲憾事且習聞其自文曰彼是仲景派我是劉張朱李前四大家派我是王肯堂薛立齋張景岳喻嘉言後四大家派我是王肯堂薛立齋張景岳喻嘉言

薑渣泡淡附子。地黃炭泡淡吳萸漂淡白术及
一切藥炭。海中各種乾殼皆無氣無味之類。其
治法開口便云五行三合雙山顛倒化合之妙。
皆渺茫無據之說。虛病則云以人補人多仗紫
河車熬膏此物大穢大毒大動火。每見百服百
死。病人宜存好心作好事切勿聽此忍心害理
之言。久病則云八絡以老絲瓜鮮竹茹當歸鬚
忍冬藤刺蒺藜之類爲祕藥又以西瓜翠皮鮮

荷梗海參淡菜肉之類爲新奇不能於指南中擇其善而從之而惟集其所短天土有知當必斥之譴之而竟張大其說曰我是葉天士一派斯言也彼妄言之我妄聽之其如斯道何哉所望行道諸君子速进去相沿之病從事於聖經賢訓亦不失爲善改過之君子矣

金匱云問曰新產婦人有三病一曰病癰二曰病鬱冒三曰大便難何謂也師曰新產之婦畏其無汗

若無汗則榮衛不和而爲發熱無汗等症似乎
傷寒之表病但舌無白胎及無頭痛項強之可
辨也然雖欲血虛氣熱熱則有汗又恐其血虛腠理開而多汗出汗出則腠理愈開而

喜中風

血不養筋而風又動火

故令病瘡

新產之婦畏血不行若不行則

血瘀於內而爲發熱腹痛等症似乎傷寒之裏

病但舌無黃胎及無大煩躁大狂渴之可辨也

然雖欲血下

亡血

血亡其氣無

又恐過多而

耦而外洩則

則寒自內生

而寒多

血爲陰陰亡失守

故令

頭眩目瞀或

冒

新產之婦雖欲其汗出血行

又恐汗與血過多以致

不省人事而

大便難

三者不同其爲亡

血傷津則一也

此爲產後提出三病以爲綱非謂產後止此三病也。

上言新產之病其提綱有三然症病有竹葉湯
治法另詳於後試先言鬱冒與大便難相兼
之產婦鬱冒與大便難二病皆因症。產婦鬱冒亡血傷津所致故其脉俱微弱

惟嘔而

不能食大便反堅

是爲大便難綱中之兼症一身無汗

但

頭上汗出

爲鬱冒綱中之專症

所以然者血虛

則陰竭于下

而

爲厥

下厥則孤陽

而必冒

推而言之凡素患鬱

下厥

上越

而

冒家欲解必

令大汗出

而始解

以血虛

爲

下厥

觀冒家欲解必

令大汗出

而始解

以血虛

爲

下厥

下厥孤陽無依而上出故頭汗出。此頭汗出爲鬱
胃病綱中之大

則眼目所以產婦頭汗既喜其通而出又汗出者以亡陰也。

血虛陽氣獨盛故當損陽就陰陽乃

損陽

陰則

陰陽乃

平復蓋陰陽之樞操自少陽非小柴胡湯大便

不能轉其樞而使之平

至於產後大便

大便

難之綱中其症堅由于血行過多則陽明之血

便燥結而且

堅海乾枯而血不濡于下不濡于上而爲

大便

于下則反逆區失和于上而爲不能食陽明屬胃爲血

中而爲

海血不自生生

於所納之水穀人但知消導爲平胃轉胃降逆

順氣爲安胃甘寒柔潤爲補胃而不知小柴胡

湯爲和胃深一層治法傷寒論小柴胡湯方後

云上焦得通津液得下胃氣因和三句移來此

六十五

卷之三

此頭汗出爲鬱胃病綱中之大

益陰陽之樞操自少陽非小柴胡湯大便

節堪爲此症之鐵板註
脚也故以上二症統以

小柴胡湯主之

此爲鬱冒與大便難之相兼者詳其病因而
出其方治也

鬱冒病旣解而能食至七八日更發熱者然發
之不惡寒便知其不在表而在裏矣因能食熟而
而更發熱便知其非虛病而爲食復矣此爲

胃實宜大承氣湯主之

此言大虛之後有實症卽當以實治之也若
畏承氣之峻而不敢用恐因循致虛病變百

出甚矣哉庸庸者不堪以共事也若畏承氣之峻而用穀芽麥芽山楂神麴之類消耗胃氣亦爲害事

產後屬虛客寒阻滯氣血則腹中疔痛以當歸生薑羊肉

湯主之併治腹中寒疝虛勞不足

叅各家說疔痛者緩緩痛也概屬客寒相阻故以當歸通血分之滯生薑行氣分之寒然胎前責實故當歸白芍散內加茯苓澤瀉瀉

其水濕此屬產後大概責虛故以當歸養血而行血滯生薑散寒而行氣滯又主以羊肉味厚氣溫補氣而生血俾氣血得溫則邪自散而痛止矣此方攻補兼施故併治寒疝虛損或疑羊肉太補而不知孫真人謂羊肉止痛利產婦古訓鑒鑒可據又奚疑哉

然痛亦有不屬於產後腹痛若不煩不滿爲中虛者不可不知產後腹痛虛而寒動也今則火上煩氣壅滿胃不得卧此熱下鬱而逆而滯和而不得卧碍上也以枳實

芍藥散主之

此爲腹痛而煩滿不得卧者出其方治也。方
意是調和氣血之滯所謂通則不痛之輕劑
也。下以大麥粥者兼和其肝氣而養心脾故
癰膿亦主之。

師曰。產婦腹痛當以枳實芍藥散假令不愈者。
此爲熱灼。腹中有乾血。痛着。於臍下。非枳實芍
藥所能治也。宜下瘀血湯主之亦主經水不利。

此爲痛着臍下出其方治也意者病去則虛自回不必疑其過峻。

然亦有不可專下其瘀者不可不知。產後七八日無頭痛發熱惡寒之太

陽症少腹堅痛此惡露不盡治者不過下其不

瘀血而已然其不

大便煩躁發熱切脉微實

是胃家之實也陽明旺於申酉戌日晡是

陽明向旺更倍發熱至

日晡時煩躁者又胃熱之時其

食入於胃長氣於陽若

不食則熱爲

食入則助胃之譫語又

熱之驗也然又有最確之辨晝陽也夜

陰也若病果在陰宜晝輕而夜重今

至夜應

聞

陽明氣衰卽稍愈。其爲胃家之實之時而

主之

蓋此湯熱與結熱更無疑也。兼祛以陽明之熱在裏之

少腹結在膀胱也。

宜大承氣湯

此言血雖結於少腹。若胃有實熱。當以大承氣湯爲主。若但治其血。而遺其胃。則血雖去。而熱不除。卽血亦未必能去也。

此條至夜則愈四字。爲辨症大眼目。益晝爲陽。而主氣。暮爲陰。而主血。觀上節。婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則譫語。如見鬼