

下

傅青主女科



生化編

目錄

新產治法

生化總論

血暈

厥證

血崩

氣短似喘

寒熱

中風

傷寒疫癘

類傷寒證

類中風

附瘧

類瘧

汗

盜汗

口渴兼小便不利

妄言妄見



傷食

傷氣

咳嗽

嘔吐

霍亂

水腫

流注

中滿

怔忡驚悸

心痛

腹痛

腰痛

脇痛

徧身痛

小腹痛

瀉

目完穀不化

痢

生外論



生化編

陽曲傅山青主原本

元和陸懋修九芝校訂

新產治法

凡病起於血氣之衰脾胃之虛而產後尤甚是以丹溪論產後必大補氣血爲先雖有他證以未治之斯言盡治產之大旨非眞置他證於不問只是調和氣血爲本而他證第從其末耳夫產後憂驚勞倦氣血暴虛諸證乘虛易入如有氣毋專耗散有食毋專消導熱不可用芩連寒不可用桂附寒則敗血停滯熱則新血崩流至若中虛外感見太陽表證之多



似可汗也在產後而用麻黃則重竭其陽見陽明府證之多  
似可下也在產後而用承氣則重亡陰血耳聾脇痛乃腎虛  
惡露之停休用柴胡譫語出汗乃元弱似邪之證非同胃實  
厥由陽氣之衰無分寒熱非大補不能救逆而回陽瘕因陰  
血之虧不論剛柔非滋榮不能舒筋而活絡乍寒乍熱發作  
無期證似瘧也若以瘧治遷延難愈言語無倫神不守舍病  
似邪也若以邪治危亡可待去血過多而大便燥結肉蕪蓉  
加於生化非潤腸承氣能通去汗過多而小便短澀生化湯  
佐用參芪必助液生津是賴加參生化湯頻服救欲絕之陽  
長生活命丹屢用進垂危之穀癩疝脫肛多是氣虛下陷補

中益氣之方口噤拳攣乃因血燥類風加參生化之劑怔忡  
驚悸生化湯加以定志似邪恍惚安神丸助以歸脾因氣而  
悶滿虛煩生化湯加木香爲佐因食而噯酸惡食六君子加  
麥麩爲良至若蘇木蓬莪青皮枳殼一應耗氣破血之劑汗  
吐宣下之法止可施諸壯人非所宜於產婦大抵新產之後  
先問惡露如何塊痛未除不可遽加參朮腹中痛止補中卽  
可無疑至若亡陽脫汗氣虛喘促頻服加參生化是從權也  
又如亡陰火熱血崩厥暈速煎生化原方是救急也王太僕  
曰治下補下治有緩急緩則道路達而力微急則氣味厚而  
力重故治產當遵丹溪而固本服法宜效太僕以頻加凡付

生死之重寄須著意於極危欲求俯仰之無虧必存心於愛物此雖未盡產證之詳然所開各證皆接近鄉治驗爲據亦未必無小補云

生化總論

吾見夫世之治產者矣血塊未消則用生地紅花以行之蘇木牛膝以攻之其或虛脹則用烏藥香附以順之枳殼厚朴以舒之甚且青枳蓬稜以下氣定喘芩連梔蘖以退熱除煩至於血結之甚用承氣湯下之而愈結汗多便瀉用五苓散通之而愈祕者比比然矣生化湯新產之主劑而血塊之聖藥也凡當新產塊痛未除或有他病總以生化湯爲主隨證

加減不可拘於貼數一晝一夜必連服三四劑服至病退方止其在產後一二日間血塊未消而氣血虛脫或暈或厥甚且汗出如珠口氣漸冷煩渴喘急則并無論塊痛與否便須從權急救於本方中加入人參三四錢及其病勢稍退仍須減參而多服原方若其塊痛已消而見如上諸證更當任用加參生化不可疑參爲補而畏之也此方處置得宜必無一失天曰大生亦曰大化以此名方直無之而不可耳錢氏原方本有熟地世人又每用四物湯治產但地黃性寒滯血芍藥酸寒無補伐傷生氣殊非萬全得此以代四物并去原方之熟地藥至平穩效可立取夫豈有治病礙產治產礙病之



疑哉

生化湯

當歸 八錢

川芎 三錢

桃仁 十四粒去皮尖研

黑薑 五分

炙草 五分

用黃酒童便各半煎服而不可耳

加參生化湯

人參 三錢有倍加至五錢者

川芎 二錢

當歸 五錢

炙草 四分

桃仁 十粒 炮薑 四分

大棗水煎服

如血塊痛甚加肉桂七分渴加麥冬一錢五味十粒汗多

加麻黃根一錢如血塊不痛加炙黃芪一錢以止汗傷飯

食麩食加炒神麩一錢麥芽五分炒傷肉食加山查五箇



砂仁四分炒

血暈

分娩後眼見黑花頭眩昏暈不省人事者非因勞倦甚而氣竭神昏即因大脫血而氣微欲絕此所以神不守舍而為暈也當急服生化湯不拘貼數以施挽救若因其有血塊未消而偏信古方認為惡血搶心輕用無補耗散之劑認為痰火沖上輒用無補消降之方鮮有不誤者

加味生化湯 治產後三等血暈證

川芎 三錢 當歸 六錢 黑薑 四分 桃仁 十粒 炙草 五分

荆芥 四分 炒黑 大棗水煎服



凡勞倦之甚而暈及血脫氣脫汗脫而暈者並宜連進此湯并加人參三四錢決不可疑參爲補而畏之若痰火乘虛泛上而暈於方內加橘紅四分虛甚者亦須加人參總不可用枳朴破氣蓬稜破血等藥卽山查性緩亦能害命不可擅用其或血塊痛甚兼送益母丸或鹿角灰或元胡散或獨勝散凡用消血塊方中病卽止不可過劑從權急救而已

厥證

產後用力過多勞倦傷脾逆冷而厥氣上胸滿氣短似喘呼吸止息違其常度人猶謂是惡露之未淨而敗血爲患也亦

知其為形脫脈去乎此則并非錢數內之芎歸五六分之乾薑所能回陽而復神者必用加參生化湯倍其分兩連進三劑則氣血旺而神自生厥自止矣若服藥而反渴者另用生脈散獨參湯代茶飲之以救臟之燥即四肢逆冷且兼泄痢類傷寒陰證而又難用四逆湯者亦惟倍參生化湯加附子一片以行參歸之力可以止逆亦可以回陽矣立二方於左分先後而施之

加參生化湯 治產後發厥若塊痛未止不可加芩朮

滋榮益氣復神湯 治產後發厥塊痛已除者

人參 三錢  
黃芪 一錢  
白朮 一錢  
當歸 三錢  
炙草 四分

傳教書之斗  
卷下 生化編  
五



陳皮

四分

五味

十粒

川芎

一錢

熟地

一錢

麥芽

一錢

棗一枚水煎服

手足冷加附子五分汗多加麻黃根一錢熟棗仁一錢

妄見加益智柏子仁龍眼肉大便實加肉苁蓉二錢大

抵產後暈厥一證相類但暈在臨盆其證似急於厥而厥

由病變其證實重於暈要知暈有塊痛芪朮不可加厥無

塊痛卽并用地黃可無疑也

血崩

產後血大來審血色之紅紫視形色之虛實如血紫有塊乃當去之敗血也塊盡自止不可論崩若血色鮮紅則是驚傷



心不能生血怒傷肝不能藏血勞傷脾不能統血血不歸經  
當以崩治生化湯行中有補輕則第用原方可耳若汗多氣  
促甚至形脫宜服倍參生化湯以益氣如產後半月外崩  
宜升舉大補湯治之此證虛極而藥取平穩未能速效須二  
十帖後諸證乃可除也豈櫻灰榆炭之微能為力邪

生血止崩湯 治產後血崩

川芎 錢 當歸 四錢 黑薑 四分 炙草 五分 桃仁 十粒

荆芥 五分 烏梅 五分 蒲黃 五分 棗水煎忌薑椒熱物生

冷

升舉大補湯 滋榮益氣如有塊痛只服前方



黃芪 白朮 陳皮 各四分 人參 二錢 炙草 升麻 各

四分 當歸 熟地 各二錢 麥冬 一錢 川芎 一錢 白芷 四分

黃連 三分 荆芥穗 四分 炒黑

汗多加麻黃根一錢浮麥炒一小撮大便不通加肉苁蓉

一錢禁用大黃有氣磨木香三分痰加貝母六分竹瀝薑

汁少許寒嗽加杏仁十粒桔梗五分知母一錢驚加棗仁

柏子仁各一錢傷飯加神麩麥芽各一錢然麥芽有回乳

之害用者慎之傷肉食加山查砂仁各八分俱加棗水煎

氣短似喘

此因血脫勞甚氣無所歸呼吸止息違其常度不可認為痰

火反用散氣化痰之方當以大補血爲主如無塊卽當於注  
化湯參用參芪白朮并去桃仁而加熟地足冷加熟附子一  
錢更接補氣養榮湯治之

加參生化湯 治分娩下卽患氣短者 引加棗一枚遠

進二三帖後再用後方

補氣養榮湯 治產後氣短促血塊不痛宜服此

黃芪 一錢 白朮 一錢 當歸 四錢 人參 三錢 陳皮 四分

炙草 四分 熟地 二錢 川芎 二錢 黑薑 四分

手足冷加熟附子一錢汗多加麻黃根一錢浮麥一小撮  
渴加麥冬一錢五味子十粒大便不通加肉蓯蓉一錢麻





傷微者女科 卷一  
仁一撮傷麩飯傷肉食加法如前

### 寒熱

凡新產後榮衛俱虛易發寒熱當於生化湯中稍佐辛甘發散之藥產後脾胃俱虛易於停滯當於生化湯中少加扶脾化食之品世人一見身熱便指爲外邪而任意表散一見氣滯便指爲食積而妄行消導者皆非也大抵產後治法先宜行血和血次則補血補氣其大較也至於治熱輕則用茯苓之淡滲重則加乾薑之甘溫或云大熱而招薑何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛內生熱耳乾薑能入肺分利肺氣又能入肝分引眾藥生血然必與陰藥同用之其熱自除若偏補