

陳脩園醫書廿一種

亥21
46(2)415

中醫 11



張仲景傷寒論原文淺注卷四

閩長樂陳念祖修園集註男蔚古愚元犀靈石同參校

辨陽明病脈證

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥氣主之本太陽不解太陽之標熱合陽明之

燥熱併於太陰脾土之中脾之津液為其所爍而窮約所謂脾約是也正陽陽明者蓋以燥氣者陽明之本也天有此燥氣人亦有胃

家實是也少陽陽明者蓋以少陽之上相火發其汗誤利其小便則水穀之津液耗竭而少胃中燥火熾則

煩而實實則大便難是也此一節言陽明有太少正之分也

何謂正陽陽明之為病燥氣為陽明之本氣燥氣盛於上則胃家實於內一言以蔽之曰胃家實也此復申明正陽陽明之為病也按沈堯

封云此是陽明證之提綱後稱陽明證三字俱有胃家實在內胃家實言以手按胃中實硬也如大陷


胸證按之石硬即名實熱梔子豉證按之心下濡即名虛煩夫心下俱以濡硬分虛實何獨胃中不以

濡硬分虛實乎此說與柯韻伯之論相表裏雖非正解亦可存參

問曰何緣得太陽陽明病答曰太陽之津液從胃府水穀而生患太陽病若發汗若下若利小便此胃中亡津液胃中無

液乾燥其太陽未解之邪熱因轉屬於陽明其不更衣為內之實腸內既大便必難通而者此名陽明也太陽轉屬之

易寒論淺注卷四陽明篇



此一節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家實之旨是陽明病總綱

問曰有諸中者胃熱之外見者肌肉之中陽明病外證云何答曰蒸蒸然熱達於外名曰身熱與太陽之表熱不同也熱氣汗自

出與太陽之自汗不同也表寒已解故不惡寒裏熱已盛故反惡熱也只因有胃家實之病根即見熱盛汗出之病證不

節補出陽明外證合上節為一內一外之總綱

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也答曰陽明主金氣金氣微寒也邪初入

化從熱雖得之一日不待解惡寒將自罷燥氣內出即自汗出而惡熱也此陽明之候也 此承上文不惡寒反惡熱

而言也但上文言陽明自內達外之表證此言風寒外入之表證

問曰陽明病未惡寒何故自罷答曰陽明與他經不居中土也中土萬物所歸故凡表寒裏熱之邪無所

而為實無所復傳於太陽其始雖頗惡寒而二日為陽明主氣之期正傳而邪亦傳正自止此胃家實

為陽明病之根也 此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗本太陽病初得病時發其汗汗先出不徹其太陽標熱之氣不能

混為一家因而轉屬陽明也此外更有傷寒發熱無汗其時即伏胃嘔不能食不因而反汗出濺濺然者水液外泄

乾是轉屬之外又有一轉屬陽明之證也 上文歷言陽明本經之自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗



亡津液外又有此汗出不徹而轉屬不因發汗而轉屬合常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病固宜乘其氣而樞轉外出矣今傷寒三日現陽明證而脈大為邪歸中土無所復傳是不能從少陽之樞而解也(述)自此以上六節

論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高士宗所謂讀論者因證而識正氣

之出入因治而知經脈之循行則取之有本用之無窮矣

陽明與太陰正氣相為表裏邪氣亦交相為繫傷寒陽明脈大浮而緩陽明身手足自溫是為病不在繫在太陰太陰者濕土也濕

身當發黃若小便自利者濕熱得以下泄故不能發黃至七日日已八日值陽明主氣之期遂移其所大便無有硬

者此為陽明也 此節合下節明陽明與太陰相表裏之義也

傷寒由太陰轉繫陽明者其人不特大便硬而且澼然微汗出也 此承上節而補言陽明之汗出即上章所云外

證俱在其中矣

陽明不特與太陰表裏而且與太陽少陽相合陽明中風不涉於本氣之燥化而口苦咽乾復涉於太陰腹滿微喘又涉於太陽

發熱惡寒陽明脈本浮大以脈象浮中而不見浮緊之脈宜誤下之陽邪內陷中土不腹增少

之三焦不能決瀆復增出小便難之新也(述)此言陽明之氣不特與太陰為表裏抑且中合於少陽外合於太陽也

陽明本經自病未曾久留太陽經而化熱者風若能食名中風以風能鼓動不能食名中寒以寒能閉拒

陽明患之自為風寒自為寒可於食辨之陽明之氣也

然此特初病則然久則為實滿等
證雖能食者亦歸於不能食矣
此一節以食而辨風寒之氣即以食而驗陽明之胃氣因正而辨邪

因邪而識正善讀者能會心於文字之外則得矣

試論中寒陽明病若中寒
陰寒過甚不得本氣燥熱之化則穀不消而
不能食而小便不利
水不化而
四肢為諸陽之本胃手足澀然汗出

此欲作而仍不固泄而仍不瘥
大便固欲作大瘥燥氣必大便初硬寒氣用後即溇所以然者以胃中冷水穀不能別故也

此言陽明中寒也

試論中風陽明之病
胃為陽土風為陽邪欲食即此可以定其為中風矣然病在陽明小便當利大便當硬今
小便反不利大便反自調是

液尚還入於胃中但不得少陰之癸水以相
合也少陰主骨節而不能上合於陽明故
其人骨節疼且骨節合於翕翕如有熱狀
似此陽不遇陰病難自解乃
奄

然煩躁發狂澀然汗出而解者此
少陰水之陰不勝陽穀神之氣而兩相合遂與作汗而共并汗解之

義脈若轉遲緊則愈
蓋以緊則為陰陰氣復而陽氣平戊癸合矣
此言陽明中風也

陽明病欲解時從申至戌上
蓋陽明旺於申酉病氣得天時之助也然此言陽明之表證從微汗而解若胃家實之證值旺時更見發狂譫語矣
此言陽明欲解

之時作一小結也

陽明病雖以胃家實為大綱而
治者當刻刻於虛寒上著眼
陽明病能食今不能食
可以知其胃氣之虛矣醫者反攻其熱則虛不受攻寒必噦所

以然者胃中虛冷故也
此胃氣存亡之關頭
以其人胃本虛故攻其熱必噦
此一節言陽明中氣虛寒



之為病也

胃氣虛則不能宜大遲陽明病脈是經脈不能稟氣於胃也內經云食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣淫精於經脈而反遲流經可知食氣散於各經之中自不厭其飽若不能散達止留滯於胃

故食難用飽飽則濁氣歸心不淫於脈流於經所以微煩不但此也且不能循經上行而頭眩不能循必見小便難上下不行則留此欲

作穀疸黃瘧雖已下之而腹滿如故所以然者淫精於經脈脈遲故也以胃虛不能淫精於經脈此一節言食氣入胃胃虛不能

淫精於經脈也

胃氣虛則不能輸精於皮毛陽明病法當多汗今反無汗其身癢如蟲行皮中狀者此以胃氣久虛不能輸精於皮毛故也內經

精皮毛毛脈合精行氣於府可知內而經脈外而皮毛皆稟氣於胃胃虛皮毛經脈俱無所稟矣此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也

陽明居中土主灌漑於上下內外四旁也茲先言中寒氣逆於上陽明病法當多汗而反覺無汗而小便利寒氣中於裏而二日主氣之三日

不拘日即內經所謂邪中於手足厥者胃陽虛寒其氣不能敷布於四肢也內經云陽明之數但覺嘔而欬膈則下陽明是也脈循髮際至頭顱陽明寒氣牽連正氣而上逆故必苦

頭痛若不欬不嘔手足不厥者為寒氣已除而陽明正氣既能四布即不上逆故頭不痛此節言陽明之氣合寒氣而上逆於

頭不能灌漑於四旁也凡言邪即以言正言正即以言邪為讀仲師書第一要法余於數節必重申之

不厭於複也述此章凡四節論陽明居中土主灌於上下內外四旁也

再言中風其證不一然但頭眩此證不在陽明提綱之內且有陽氣逆於上陽明病他證無論但頭眩有陰有寒有熱從何處辨起惟不惡寒知病屬陽明而不屬陰經矣前云陽明病

傷寒論淺註 卷四 陽明篇 三

若能食吾即能食知為陽明胃熱而非陽明胃寒而發效效其人必咽痛若熱不上干不效者咽亦不名中風故於其能食矣由是熱氣上衝肺受火燔而發極

痛 此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通於下也 程扶生云陰邪下利故無汗而小便

利風邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則咽痛是風寒入胃之辨也按

雖本章之意不重在此而亦不可不知 欬出於肺當云喉嚨痛今胃熱甚則咽痛二者相連氣必相

侵

更有鬱於其氣不能外無汗不下輸於小便不利心中懊懣者中土鬱而成熱熱氣為身必發黃中土之證陽明病達於皮毛則勝膀胱則小便不利中懊懣者中土鬱而成熱熱氣為身必發黃煩也鬱於中即現於外

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輸也

鬱於中土若誤火更益其熱陽明病醫者不知所以無汗之被火周身之氣燥極而熱額上而微汗出又不得下小便

不利者濕熱相搏亦必發黃 此節即上節所言發黃之證借被火以言其更甚也凡誤服羌獨荆防及薑桂

烏附之類皆以被火概之 陽明之脈起於鼻行髮際至額顛

陽明原主病今診脈浮而緊者仍見太陽表實無汗之脈陽明被太陽之必乘其所旺潮熱如潮發作有

定時若脈浮而不者是見太陽表虛自汗之脈陽明被太陽之風邪外換必為浮盜去汗出 述此三節

言陽明主裏復外合於表氣內通於經脈復還於胃中也



陽明之脈起於鼻交頰中還出挾口今陽明燥熱病其口無不燥若熱止在乾於經其人但欲以漱水濟其經熱漱畢吐去而不欲嘔下者熱不在胃故也

陽明氣血俱多經中熱甚則逼血妄行因此必發此言陽明之津液通於經脈而為衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗之外熱病已差而尚微煩不了了者此大便必硬故也津液為以發亡其津

液胃中乾燥故令大便硬今姑不問其大便當問其小便日幾行若出本日小便日三四行今於微日正再行故

知大便不久自出蓋以大小便皆胃府津液之所施也今為小便數少以津液當復還入胃中故知不久必大便也此胃府實大便

硬亦有不必下者醫人不可不知也 此言陽明之津液復還於胃中也

陽明證既知有不必下者更當知有不可下者傷寒嘔多為陽明胃氣之虛胃氣既虛雖有陽明之燥熱證切不可攻之 此一節言胃氣虛者

不可下也 (述)陽明有胃氣有悍氣有燥氣胃氣者柔和之氣也悍氣者慄悍滑利別走陽明者也

燥氣者燥金之氣也病在悍氣者可攻病在燥氣者可攻病在胃氣者不可攻病在燥氣而胃氣虛者

亦不可攻故此三節俱言不可攻也 按師言其不可非坐視而不救也必有所以可者在正面反面

對面皆可以悟其治法若常器之補亡論必處處補出方治無論其搔不著癢也即有偶合之處反令

鳶飛魚躍水流花放活潑文章俱成糟粕長洲汪苓友多宗其說何其陋歟

陽明病外有身熱自汗出不惡寒反惡熱之證便知其內為胃家實之證心下硬滿者止在心下尚未及腹止是硬滿而不

陽明病但胃家實只指不下利而言務宜活看亦知其實處即是虛處若



兼痛此陽明水穀空虛

不可攻之

若誤攻之則穀氣盡而胃氣敗

利遂不止者死

若利自止者

是其人胃氣尚在穢愈腐去而邪亦不留故愈

此一節言虛而假實者不可下也

受業薛步雲按心下為陽明之膈膈實者腹必虛氣從虛閉是陽

明假實證攻之是為重虛

內經云中於面則下陽明以陽明之脈上循於面故也

陽明病通面令見赤色

為陽氣拂鬱於表

不可攻之

若誤攻之

胃氣從虛津液大必復耗熱不得越故

發熱者亦變為色黃

內經云三焦膀胱者腠理毫毛共應以三焦主腠理膀胱應皮毛今鬱熱在表三焦失其決瀆之官膀胱失其氣化之職

小便不利

為發黃也

此一節言外實內虛者不可下也

不可攻者既明而可攻者更不可以不講

陽明病不吐不下

可知其胃氣不虛也

心煩者

以胃絡上通於心陽明之燥火與少陰之君火相合故也胃氣雖曰不虛却是不和

可與

調胃承氣湯之

此一節言陽明胃府不和宜與調胃承氣也述此三節皆言可攻之證而又以明三

承氣之各有其主也

陽明病脈遲

為陽邪入於裏陰然止言脈猶不足憑也必以汗出知陽熱之內蒸然止言汗亦不足憑也

雖汗出

為陽熱之內蒸而表未罷者亦恆多汗出之證必以

不惡寒者

定其表證之已罷然表證已罷尤當再驗其裏證陽明主肌肉邪在表陽則身輕易以轉側若入於裏陰則

其身必重

邪結於中必礙呼吸而

短氣腹滿難以下通而為勢必上逆

喘此已屬大承氣證矣然猶必身熱變為潮熱

有潮熱者此外欲解可攻裏也

又必通身熱蒸之汗變為手足濇然之汗熱與汗俱

斂止露出胃所主之四肢為本

手足濇然而汗出者此大便已硬也

以大承氣湯主之

若人汗雖多微發

熱惡寒者外未解也不可攻裏卽其熱不潮爲胃未全實未可與大承氣湯若其腹大滿大便不通者凡不見潮熱之證也

可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

大承氣湯方

大黃四兩酒洗

厚朴半斤炙去皮

枳實五枚炙

芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去

滓納大黃煮取二升去滓納芒硝更上火微煮一兩沸分溫再服得下餘勿服 武陵陳氏方云名承

氣殆卽亢則害承乃制之義乎亢極反兼勝已之化承者以下承上也夫天地一理萬物一氣故寒極

生熱熱極生寒物窮則變未有亢極而不變者傷寒邪熱入胃津液耗真陰虛陽勝陰病所謂陽盛陰

虛汗之則死下之則愈急以苦寒勝熱之劑救將絕之陰瀉亢甚之陽承氣所以有輓回造化之功也

然不言承亢而言承氣何哉夫寒熱流轉不過一氣之變遷而已用藥制方彼氣機之不可變者力難

矯之亦第就氣機之必變者而一承之耳設其氣有陽無陰一亢而不可復則爲脈澀直視喘滿者死

何則以其氣機已絕更無可承之氣也由是言之聖人雖盡人工之妙止合乎天運之常耳不云承氣

而云何 按陳氏此註必須熟讀

小承氣湯方



大黃 四兩

厚朴 二兩炙

枳實 三枚大者炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服

服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

胃合海水無病之人亦日日有潮但不覺耳病則氣隨潮而發現於外故凡陽明病必有潮熱又大便微硬者方可與大承氣湯若大不硬者

即不可與之切勿概以潮熱為可攻也若其不大便已六七日未敢必其果有燥屎欲知之法少與小

承氣湯入腹中下轉而失氣者此有燥屎乃可以大承氣攻之若不轉失氣者為胃氣之虛此但初頭硬後必漉

不可攻之攻之則胃氣愈虛必脹滿不能食也試觀胃虛之人渴欲飲水者與水則噦水且不宜於胃而況攻下乎推

其後復發潮熱者必大便復硬但澹者既去則而甚少也止須以小承氣湯和之然亦必須轉失氣不轉

失氣者并小承氣且難再投慎不可氣以妄攻也此言大承氣行便硬小承氣行燥屎各有所主而胃氣虛者

慎不可攻也

陽明譫語其中有虛實之不知夫陽明實則語皆狂亂名曰譫語虛則聆其所語如鄭國之聲而正輕微重複名曰鄭聲鄭聲即重語也

蓋譫語原非死證而邪氣入直視而譫語則危矣喘滿者脾肺不交血死及下利者脾腎不固而亦主死藏以致精氣不榮於目至直視而譫語更加喘滿者氣脫於上主死下利者氣脫於下亦主死

此章統論譫語各證之治法也譫語之時聆其聲有不正之聲輕微重複之語即是鄭聲註家分而為

兩皆相沿之誤也故止首節提出鄭聲而後無鄭聲之證

有亡陽而譫語者汗為心液心為陽中之太陽發汗多則心液虛矣若重發汗者心液為陰陰虛於內則心主亡其陽則神氣譫語脈

脈脈短者氣絕故死若脈而且自和者病雖劇亦不死此言亡陽譫語也

有亡陰而傷寒若吐若下後不解其陰液亡矣不大便五六日至十餘日陽明旺於申酉日晡所發隨旺發潮熱且全顯出本來不惡寒且熱甚神昏無獨語無所如見鬼狀若劇者神識不識人奔

於外而循衣摸牀陰孤於內而無所依故心惕而不安陽脫於微喘精不榮於目故直視此陽熱甚而陰液亡其生死只在一

脈弦者為陰氣未絕可生瀦則無瀦者為陰血已竭必死勢尚微者無以上但見發熱譫語者以大承氣湯主之若一

服利即止後服蓋以大承氣用之得當可以養陰不當亦所以亡陰也可不慎歟此言亡陰譫語也按柯氏云吐下後不解病有微

劇之分微者是邪氣實當以下解劇者邪正交爭當以脈斷其死生弦者是氣實不失為下證故生瀦

者是正氣虛不可更下故死生死二字從治病者看出又是一解却是正解

有亡津液燥熱之陽明燥熱之病其人多汗以津液外出致胃中乾燥大便必硬硬則胃氣不和譫語以小承氣湯

主之若一服譫語止更莫復服此言亡津液而譫語也

然其中虛實之辨當專辨其脈實若發潮熱脈滑而疾者此陽明裏實也以小承氣湯主之然服之因其證為多寡亦進退先

與承氣湯一升後腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之設明日不大便脈反變滑為微澀者微則

傷寒論淺註 卷四 陽明篇 六



氣衰澀則裏虛也邪盛正衰法為難治熱邪雖盛亦不可更與承氣湯也 此以脈而辨譫語之虛實前欲與大承

氣以小承氣為法今欲與小承氣即以小承氣先與為試法可見古人之謹慎如此按柯氏云勢若

不得不通者可用蜜導虛甚者與四逆湯陰得陽則解矣愚以救逆當臨時審其所急不可預有成見

且有在胃在腸亦須分別內經陽明病若譫語有潮熱反不能食者胃滿也胃中必有燥屎五六枚也若

云胃病則腸虛腸滿則胃虛譫語潮熱而能食者胃無燥屎故但大便硬爾俱宜大承氣湯下之〔述〕此以能食不能食以驗譫語有燥

屎便硬之不同而又以明腸胃更虛更滿之義也 胃主納穀胃滿則不能容穀故不能食腸主變化

腸滿則難於變化故但硬然腸雖滿而胃則虛故又能食

間有熱入血室而譫語者以衝任二脈為血室皆起於胞中與陽明合故陽明病熱逼於下血者神也下血而即譫語者血脫神昏也此為熱入血室何以

室男女皆有之在男絡唇口而但頭汗出而別處者血下奪則無汗熱上擾則刺肝為鬢鬢在女月事以時下是也汗蒸也肝統諸經之血刺之期門隨其實而瀉之

俛熱從血室而外出於皮膚澹然汗出則愈此言下血譫語也

間有因風致燥而譫語者奈何夫汗出不見其多而亦譫語者以有燥屎在胃中此為風也謂風木之邪干於中汗多亡液以致胃燥譫語固也今風性煥動善行數變內傷神氣其語言必亂以盡入

燥實須議下之然亦過經俛有餘不盡之風邪乃可下之若早風性煥動善行數變內傷神氣其語言必亂以盡入

於裏邪盛則實此為表虛裏實故也蓋風燥症俛過經宜下下早以下之則愈統其方曰宜大承氣湯 此言風木之邪

燥其津液而為譫語也

攻裏太早致裏實而譫語者言之詳矣而攻傷寒四日為太陰五日為少陰主氣之期邪隨經氣而內入則脈沈之氣不相

生而為喘滿沈為在裏而反發其表汗則胃之津液越出大便結燥為難致其表虛大便難裏實其虛靈

天君因邪實而失久則譫語此承上節表虛裏實而補出尋常裏實之因以備互證也

譫語亦有三陽合病三陽合而為病腹滿陽明經熱身重太陽經熱難以轉側而一身之前後左右俱熱氣

者太陽陽明少陽熱合少陽譫語熱合陽明遺尿熱合太陽之府也三證見而身內之上中下俱熱氣

內故不可發汗以發汗則譫語陽浮於外則陰孤於內故不可下之則額上生汗手足逆冷醫者審其

兼治太陽少陽若自汗出者從陽明而得大白虎湯主之亦非自汗出恐表邪抑塞此言三陽合病


而為譫語也

譫語亦有二陽併病二陽併病太陽病氣俱已歸併於陽明無太陽證罷但有發潮熱手足熱汗出大便

難而譫語者皆陽明結邪下之則愈宜大承氣湯此言二陽併病而為譫語也

陽明表證少而裏證多下法之外發汗尚宜詳慎陽明病在表脈則浮而涉於裏緊咽連胃脘脾開竅於

裏邪氣咽燥口苦手太陰肺主天足太陰脾主地氣不升天氣不降故腹滿而喘此病陽明發熱汗出不惡寒反惡熱已詳本篇



陽明之表也土氣不和則為身重此陽明之表裏俱病也可轉其機為兩解之法若誤發其汗則傷腎傷心而憤憤陰液既傷則陽反增氣不和則為

語若誤加燒鍼則經脈必見恍惕水交則為煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣而動膈又從膈而上乘虛動膈

心中懊憹舌為心苗舌上有胎者熱甚而為邪氣所鬱之象也宜梔子豉湯導火熱以下降引主之此言陽明病乘裏

非汗下溫鍼所能治也

然梔子豉湯止為熱邪乘心之劑前證外也恐不能兼清陽明經氣之燥熱若更加渴欲飲水口乾舌燥者為陽明經氣之燥熱也又宜白虎加人參湯主之

此承梔子豉湯而進一步言也

白虎加人參湯止清陽明經氣之燥熱若脈浮發熱渴欲飲水如前證外更加小便不利一者為陽明累及太陰脾氣不能散精歸證肺通調水道下輸膀胱所致也第運

脾調肺以導水又必以清熱滋陰為本方不失為陽明之治法以豬苓湯主之 此承白虎加人參湯又進一步言也

豬苓湯方

豬苓去皮 茯苓 阿膠 滑石碎 澤瀉各一兩 右五味以水四升先煮

四味取二升去滓納下阿膠烱消溫服七合日三服

豬苓湯助脾氣之轉輸肺氣之通調利小便甚為得法矣若陽明病汗出過多而渴者為津液外越以致中乾作渴非不可與豬苓湯

以汗多胃中燥恐豬苓湯復利其小便更走其津液故也 自陽明病脈浮而緊至此看似四節實是一節細



玩其段段相承上下聯絡以見傷寒不可執定一法用藥當如轉環也

且陽明中有寒冷燥熱之分不可脈浮而寒則遲今陽明戊土不能下合少表熱少陰癸水不能上合陽不辨試先言下焦之虛寒夫虛則脈浮而寒則遲陰癸水而獨主乎外則表熱明戊土而獨主乎內則

裏寒戊癸不合而下焦下利清穀而不能止者以四逆湯主之〔述〕此節言陽明下焦虛寒也本章凡三節

以上中下三焦論陽明有寒冷燥熱之病也

再言中焦若胃中虛冷視下焦之生陽不啓者彼為火虛此為土虛其土虛亦本不能食者若復之虛冷於火虛虛極則寒寒則失其消穀之用每由食少而至於不能食者令其飲水則

兩寒相得而為噦 此論陽明中焦虛冷也

再言上焦經脈之脈浮發熱熱循經脈而口乾鼻燥其能食者熱在經脈不傷中焦則發衄 此言陽明燥熱熱在經脈故脈浮發熱乘於上焦故口乾鼻燥其能食者之胃氣也經脈熱甚則發衄 此言陽明

上焦經脈燥熱也

陽明主闔若終闔而無開機則死矣所以言之不厭於複也茲先以陽明之氣不得交通於上下言之陽明病外證未下之其外有熱而手足溫熱在於不

結胸胃絡不能上心中懊憹下後胃飢不能食陽明之津液主灌溉於上下今陽明氣虛但頭汗出而餘汗者宜交通其能開陽明之闔須記之 此言陽明之氣不得交通上下而為梔子豉湯

證也〔述〕合下五節論陽明主闔貴得樞轉以出若闔於心胸腹胃之間無開轉之機則死矣

其或闔於胸陽明病發潮熱則大便應硬小大便溇而小便自可知其氣不涉於大小二便胸脇滿而不

脇之間者便應利矣今大便溇而小便自可止逆於胸脇之間也至胸脇滿而不

傷寒論卷四陽明篇



能去者宜從樞脇而達之於外以小柴胡湯主之。此言陽明之氣闔於胸脇之間宜樞轉而出也。

然而小柴胡之用不止此也。夫陽明之氣由下而上由內而外出入於心胸游行於腹胃靡不藉少陽之樞。今陽明病脇下硬滿不得由樞以出也不得由樞以出遂致三焦相混內外不通矣。

下焦不通津中焦不治而為嘔上焦不通火舌上必現白胎者可與小柴胡湯調和三焦上焦得液不下而為不大便胃氣不和而嘔止三焦通身濺然而汗出解也。此言小柴胡湯不特達陽明之

通而白而大便胃氣因和而嘔止三焦通身濺然而汗出解也。此言小柴胡湯不特達陽明之

氣於外更能調和上下之氣流通內外之津液也

今從主闔之理藉樞開之所以然者而深論之。陽明中風少陽脈浮陽明脈大陽明兼見三脈宜可以相藉而樞而短氣夫不能開矣乃其氣主闔又不能得樞開而短氣能繼

開而出闔腹都滿闔於脇下及心痛以久按之病處氣不通以久按之則闔而復闔也。陽明之內

津液不得鼻乾不得汗陽明隨衛氣嗜臥土內鬱而一身及面目悉黃脾不能為胃小便難陽明之氣旺

隨旺時有潮熱於上故時時噦三陽之脈循繞耳之耳前後腫醫者取足陽明之經刺之少差然樞外

轉而不解病過十日又當三陰脈續浮者知其不涉於陰仍欲從與小柴胡湯以轉其脈但浮別無餘證

者是病機欲從太陽與麻黃湯以助若不尿腹滿加噦者是不從太陽之開少陽之樞逆於三陰也夫不

於十日前之腹部滿時時噦不治之證述此節言陽明主闔必藉少陽之樞太陽之開若闔而不能

開轉則一息不運鍼機窮矣故經曰太陽為開陽明為闔少陽為樞三經者不得相失也

