

傷寒懸解卷四

昌邑黃元御御製

太陽經中篇 五十六章

太陽壞病

太陽風寒有正治之法桂枝麻黃是也陽偏盛者恐異日之入陽明則有大青龍白虎湯早清其燥熱陰偏盛者恐異日之入三陰則有小青龍五苓散預去其濕寒處治不差病在太陽一經自當應藥而解不成壞病醫不知此實其實而虛其虛若汗若吐若下若溫鍼補瀉異施遂成壞病非復太陽本色矣壞病者即後日之陽明與三陰也陽盛而泄其陰則入陽明陰盛而亡其陽則入三陰桂枝麻黃之證變為亢陽孤陰矣是以曰壞至於陽明俟其府熱內實一下而愈猶為逆中之順然而府邪傷陰失於急下亦伏死機則順中之逆正自不少夫三陰陰盛陽自動搖危亡則逆居強半而順不十三仲景於是救急之法隨證處治轉逆為從元通微妙良工心苦矣

太陽壞病候綱一 太陽五十四

桂枝麻黃太陽風寒主方也若至三日之久正將入陽明太陰之期業經汗下溫鍼而病仍不解則事當大壞未必猶在太陽即太陽未罷而亦未必尚屬太陽桂枝之證是宜審觀脈證另立新法故總立壞病之綱

詳開救急之門也

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之太陽病治之得法

當解於本經不至入府傳藏而成壞病若至三日之久已經發汗吐下溫鍼諸治而病不解則不在太陽定緣誤治入別經而成壞病當觀其脈證治其所犯何逆隨證治之曰壞病者非太陽之本病故也

壞病候綱二 太陽五十五

本發汗而復下之此為逆也若先發汗治不為逆先本下之而復汗之為逆若先下之治不為逆

申明上章逆字之義風寒外閉宜辛溫發散而不宜下燥熱內結宜苦寒攻下而不宜汗若表邪未解裏邪復盛則宜先汗而後下若裏邪急迫表邪輕微則宜先下而後汗錯則成逆矣若治法得宜先後不失不為逆也

太陽壞病入陽明去路 十五章

陽明從燥金化氣陽旺之人表鬱則燥動然不經誤治津液未耗燥氣之作何至遽盛及其汗下溫鍼傷津亡液燥氣大發經府合邪乃成下證雖不如三陰之險然陰虧陽亢亦伏危機未可率然也

太陽壞病入陽明桂枝證一 太陽五十六

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈



傷寒懸解卷四

昌邑黃元御御製

太陽經中篇 五十六章

太陽壞病

太陽風寒有正治之法桂枝麻黃是也陽偏盛者恐異日之入陽明則有大青龍白虎湯早清其燥熱陰偏盛者恐異日之入三陰則有小青龍五苓散預去其濕寒處治不差病在太陽一經自當應藥而解不成壞病醫不知此實其實而虛其虛若汗若吐若下若溫鍼補瀉異施遂成壞病非復太陽本色矣壞病者即後日之陽明與三陰也陽盛而泄其陰則入陽明陰盛而亡其陽則入三陰桂枝麻黃之證變為亢陽孤陰矣是以曰壞至於陽明俟其府熱內實一下而愈猶為逆中之順然而府邪傷陰失於急下亦伏死機則順中之逆正自不少夫三陰陰盛陽自動搖危亡則逆居強半而順不十三仲景於是救急之法隨證處治轉逆為從元通微妙良工心苦矣

太陽壞病候綱一 太陽五十四

桂枝麻黃太陽風寒主方也若至三日之久正將入陽明太陰之期業經汗下溫鍼而病仍不解則事當大壞未必猶在太陽即太陽未罷而亦未必尚屬太陽桂枝之證是宜審觀脈證另立新法故總立壞病之綱

詳開救急之門也

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之太陽病治之得法

當解於本經不至入府傳藏而成壞病若至三日之久已經發汗吐下溫鍼諸治而病不解則不在太陽定緣誤治入別經而成壞病當觀其脈證治其所犯何逆隨證治之曰壞病者非太陽之本病故也

壞病候綱二 太陽五十五

本發汗而復下之此為逆也若先發汗治不為逆先本下之而復汗之為逆若先下之治不為逆

申明上章逆字之義風寒外閉宜辛溫發散而不宜下燥熱內結宜苦寒攻下而不宜汗若表邪未解裏邪復盛則宜先汗而後下若裏邪急迫表邪輕微則宜先下而後汗錯則成逆矣若治法得宜先後不失不為逆也

太陽壞病入陽明去路 十五章

陽明從燥金化氣陽旺之人表鬱則燥動然不經誤治津液未耗燥氣之作何至遽盛及其汗下溫鍼傷津亡液燥氣大發經府合邪乃成下證雖不如三陰之險然陰虧陽亢亦伏危機未可率然也

太陽壞病入陽明桂枝證一 太陽五十六

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈



浮改知在外當須解外則愈桂枝湯主之方在太陽五

太陽病先發汗不解而復下之設內有府熱則下之當愈若使脈浮則表邪未解必不能愈以浮為邪在表遺其外邪而反下之故令不愈當須解外則愈宜主桂枝也 此太陽表證未罷而內有府熱固當下也然必外解而後可下若發汗未解而反下之設脈猶見浮則外必不愈故仍以桂枝解外

發汗亡津證二太陽五十七 大下之後復遽汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣土濕金鬱氣不化水土濕木鬱不能行水皆令小便不利小者龍五苓散證之小便不利悉緣土濕而水停則小便之不利必因濕旺若汗下之後而見小便之不利是津液亡泄燥而非濕也然別無熱渴之證則其燥未甚勿用治之俟其津液續復得小便一利必自愈也汗下之後小便不利陽虛之人則陽亡而為濕陰虛之人則陰亡而為燥燥此不見陽亡濕動之證故知是亡津傷燥也此亦人參白虎證而燥熱未作則病勢最輕故不須治之

麻杏石甘證三太陽五十六 發汗後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻杏石甘湯杏仁甘草石膏湯主之

汗後表寒未解鬱其肺氣熱蒸皮毛竅開而不能透泄故汗出而喘表得汗泄故外無大熱麻杏發表杏仁降逆石膏清金甘草培土則表裏俱解矣此亦大青龍證之輕者以在汗後故不用青龍汗後不可行桂枝亦大概言之他如發汗已解半日許復煩可更發汗宜桂枝湯未嘗必禁桂枝也

麻黃杏仁甘草石膏湯十七 右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥者取二升去滓溫服一升

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃兩店仁五十 甘草二兩 石膏半斤 汗後作喘證四太陽五十九 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

服桂枝湯後汗出表解而津液亡泄裏熱則增是宜白虎清裏而大汗之後大作煩渴而脉又洪大是亡津而氣亦泄也津由氣化靈樞決氣上焦開發宜五穀味薰膚充身澤毛若露露之溉是為氣此當益氣以生津故加人參養胃評熱論脉燥疾不為汗衰者死以精氣消亡無以糝灌其枯燥也白虎而加人參使清氣降澆化而為露滋潤枯涸降洗煩燥暑善於此矣

人參白虎證太陽六十二

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

方在太陽

吐下之後氣奪津傷七八日不解燥熱內盛而自裏達表表裏俱熱熱蒸竅泄時時惡風舌上乾燥而心內焦煩欲飲水數升之多主以人參白虎清金而泄熱化氣而生津也

表裏俱虛證太陽六十三

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致胃胃家汗出則自愈所以然者汗

出故也得裏未和然後下之

太陽病先下之而不愈傷其陰液因復發汗傷其陽津表陽裏陰以此俱虛表陽虛則陰氣外束裏陰虛則陽氣內鬱陽氣內鬱而不外達其人因致昏胃胃家汗出則自愈所以然者汗出則衛氣外達經脉和暢陰退而陽宣也表和之後得裏未和然後下之

調胃承氣證九 太陽六十四

發汗後惡寒者虛故也不惡寒反惡熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯方在陽

陽虛之人汗則亡陽陰虛之人汗則亡陰汗後惡寒者氣泄而陽虛故也故防入少陰不惡寒反惡熱者津傷而陽寔故也是已入陽明將成大承氣證宜早以調胃承氣和其胃氣預奪其實也

陰陽俱虛證十 太陽六十五

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相薰灼其身發黃陽盛則欲

臥陰虛則小便難陰陽俱虛身軀則枯燥但頭汗出刺頭而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治

太陽中風以火劫發汗邪風一被火熱血氣流溢而失其常度外劫之火與內鬱之陽兩相薰灼其身發黃上之陽盛則欲

臥下之陰虛則小便難陰液陽津俱至虛竭身體則枯燥不潤陽氣上燭但頭汗出刺頭而還裏氣積鬱而為脹滿肺氣壅阻而為微喘火炎於上口乾而咽爛其時或不大便久則衛鬱莫泄濁氣薰心而為譫語甚者胃氣衝逆而為嘔噦或手足躁擾捻衣摸牀凡此諸證總以表裏壅遏熱無泄路故鬱悶懷煩亂如是宜以辛涼之藥雙泄表裏若小便利者其陰氣

未絕其人可治也 此證濕熱鬱蒸宜以麻黃石膏泄其表熱大黃芒硝泄其裏熱半見生薑降其逆痞芩滑石滲其濕表裏雙清則神氣慧矣

火熱入胃證十一 太陽六十六 太陽病二日反躁反熨其背而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者此為欲解也故其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞭小便當數而反不數及大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也

太陽病皮毛被感表鬱為熱內尚無熱候其表熱傳胃日久失清乃見煩躁今二日之內方入陽明不應躁而反躁其胃陽素盛可知乃不用清涼反熨其背而大汗出火就燥邪熱入胃胃中水竭乃生煩躁燥熱薰心必發譫語若十餘日後微陰內復忽振慄而自下利則胃熱下泄此為欲解也方其熨背取汗火熱蒸騰上雖熱而下則寒故從腰下絕無汗意外寒勝其內熱故膀胱開澀欲小便而不得陽氣升泄不根於水膀胱無約時欲失溲如此則小便當數而反不數者津液枯也水枯則大便乾鞭便乾腸結胃熱不得下達故氣逆作嘔火熱上逆故足下逆冷而惡風寒及振慄下利大便已行則穀氣宣暢四達頭痛而火從上散足熱而陽從下達胃中燥熱解散無餘緣穀氣以便通自下流故也使通而頭痛者如爐底壅塞火熾不升一通則火即上炎也

火邪圍血證十二 太陽六十七 太陽病以火薰之不得汗其人必躁到經不解必清血名為火邪清與太陽病當以汗解乃以火薰之入不得汗內熱愈增其人必躁到經盡之期當解而不解熱傷血分必當圍此名火邪也

火逆助邪證十三 太陽六十八 脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而感病從腰以下必重而痺名火逆也

脈浮宜以汗解乃以火灸之邪無從出因火而更感病從腰以下必重濁而痺塞此名火逆

火逆吐血證十四 太陽六十九 脈浮熱甚反灸之此為實實以虛治因火而動故咽燥吐血

脈浮熱甚當汗之以泄其熱反灸之此為實症實症而用灸是實以虛治也內之實熱因外火而大動必傷陰氣故咽燥而吐血

火邪內攻證十五 太陽七十 微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

微數之脈慎不可灸誤灸而因火為邪則為煩躁而氣逆陰氣之已虛逐陽火之原實逆因令血散脉中耗亡失

微數之脈榮血虛虧慎不可灸誤灸而因火為邪則為煩躁而氣逆陰氣之已虛逐陽火之原實逆因令血散脉中耗亡失

守一灸之火雖微而其煎熱內攻則甚有力焦骨傷筋日就枯槁榮血消鑠終難復舊也

太陽壞病入太陰去路 二十一章

太陰以濕土主令感陰之人病在太陽表鬱則濕動然不經誤治則胃陽未虧濕氣之作猶俟漸成及夫汗下過盛陽亡陰旺濕邪勃興土敗水侮危證疊出防微杜漸之法不可不亟講也

太陽壞病入太陰五苓散證一 太陽七十一

太陽病發汗後大汗出胃中乾燥煩不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣和

則愈此太陽入陽明若若脈浮小便不利熱微消渴者五苓散主之
此太陽入陽明若若脈浮小便不利熱微消渴者五苓散主之

發汗後陽盛之人陰亡土燥則入陽明而成白虎證陰盛之人陽亡土濕則入太陰而成五苓散如汗後胃中乾燥煩不得

眠欲得飲水此將來之人參白虎證也宜少少與飲以在大汗之後陽氣新虛也設燥熱已甚少水不救盛大則用白虎若

燥熱未甚得少水和胃則煩渴自愈無事白虎也若汗後脈浮小便不利熱微消渴則太陰之象已見端倪宜以五苓散主

而水蓋陽格於外表證未解是以脈浮濕動於內木氣不達是以小便不利木鬱風動耗傷肺津是以消渴此之消渴消

少水而頻飲不能大消以其濕盛而熱微也

五苓散證二 太陽七十二 發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

發汗已熱隨汗散乃脈見浮數而證見煩渴是汗出陽虛主濕而火升也蓋火秘陽整全恃乎土陽亡濕動肺胃不降君火

升炎故脈證如此宜以五苓燥土泄濕若未汗而見浮數煩之脈證則宜大青龍而不宜五苓矣

甘草乾薑證三 太陽七十三 傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣及煩桂枝湯欲攻其表此誤也得之使厥咽中

乾燥煩吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與

調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗裏熱外泄也小便數則大便必艱心煩者胃熱之薰衝也陽明病雖得之一日惡寒解自罷即自汗出而惡熱微

惡寒者表未全解自汗雖出而未能遽發亦是調胃承氣證陽明證上太陽病若吐下者發汗微煩小便數大便硬與

即此證以脈浮自汗病在太陽中風證反與桂枝湯加附子而增桂枝以攻其表此大誤也得之汗多陽亡使手足厥冷咽

喉乾燥陽氣離根而生煩躁胃氣上逆而作吐嘔作甘草乾薑湯與之甘草培土而補中乾薑溫胃而降逆陽回脈暖是以

厥愈足溫其腳之變急緣其木燥而筋縮也更作芍藥甘草湯與之甘草舒而緩急芍藥清風而潤燥其脚自伸若胃氣不

和土燥譫語少與調胃承氣調和矣桂枝發汗是為一逆若不以薑甘回陽而重發其汗或復加燒鍼以大亡其陽

是為再逆當速用四逆回陽薑甘加附子水土雙溫也

甘草乾薑湯十八
甘草四兩 乾薑二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

芍藥甘草湯十九

芍藥四兩 甘草四兩

右咬咀以水三升煮取升半去滓分溫再服

甘草乾薑證四

太陽七十四

問曰證象陽旦按治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而譫語師言夜半手足當溫兩足當伸

法後如師言何以知之答曰寸口脈浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脰攣病證象桂枝因附子參其間
增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩亂更欲甘草乾薑湯夜半陽氣達兩足當溫脰尚微
拘急重與甘草芍藥湯兩脰乃伸以承氣湯微瀉則止其譫語故知病可愈

此復述上章證為問答證象陽旦即證象桂枝之互文金此虛後中風數十日不解頭痛惡寒時時有微熱汗出而喘
以法治之即上章以桂枝攻其表及此章因加附子增桂令汗出也寸口脈浮而大浮則為風大則為虛載在脈法

而大則為虛載在脈法而大則為虛載在脈法所為風則浮虛也法風則生其微熱虛則兩脰攣急病與桂枝湯證形象符合而熱微足

寧入似陽虛因增桂枝而加附子以發其表附子溫經汗多亡陽是以厥逆咽乾而生煩躁汗出津枯胃府燥結是以譫語

煩亂不知寸口脈浮大是陽明之裏實陽明為大便硬者脈浮而緩為陽明病而非太陽之表虛誤以桂附發汗重亡其

陽裏實變而為裏虛更欲甘草乾薑湯回足溫重與芍藥甘草湯即仲少與調胃承氣變結糞為微瀉止其譫語藥良法

精應手愈矣何不可知之有有桂枝加桂湯不問陽旦陰旦之名虛實證誤所謂不知而妄作也

汗後吐逆證五太陽七十五發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止

汗出陽泄土敗胃逆水藥不得入口是謂逆治若更發汗陽敗土崩太陰吐利之證必將俱作無有止期矣

汗後吐逆證六太陽七十六病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不

能消穀以胃中虛冷故吐也

陰陽互根陽虛脫根升浮於上是以脈數數為客熱升浮不能消化水穀故作嘔吐緣其陽亡而胃中虛冷也

吐後生煩證七太陽七十七太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也

太陽病傷寒中風表邪外開榮衛不達當見惡寒吐傷胃氣裏陽上逆外達皮毛故反不惡寒而欲去衣被此為吐之令陽



火離根而內煩故也

吐後作吐證八太陽七十八

太陽病惡寒發熱今身自汗出不惡寒發熱關上脉細數者以醫吐之過也一二月吐之者腹

中肌口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆

吐傷胃陽虛浮無根故關脉細數一二日胃病尚淺吐則傷輕胃中虛故故饑而胃氣上升故不能食三四日胃病深吐

則傷重陽火虛浮故不喜糜粥欲食冷食而胃中虛冷不能化穀故朝食暮吐此過吐傷胃是謂小逆遲則傷陽陽虛逆氣

乃下也汗吐下溫鍼諸逆之中惟吐為輕凡胸腹之內腐敗壅塞膈真陽微鬱悶憤憤頭痛心煩吐之清氣通暢即則輕安

最妙之法也即吐之過當虛中煩亦無汗下亡陽諸禍一溫中氣虛煩立止最易治療故曰小逆也

身痛下利證九太陽七十九

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏

宜四逆湯陽三救表宜桂枝湯陽五

傷寒表病下之敗其裏陽續得下利清穀不止已成太陰自利而身體疼痛表證未解是表裏皆病然急當救裏不暇及表

也救裏之後利止便調然後表之身疼痛者急當救之蓋表邪不解恐裏陰復鬱而生寒故救之宜急救裏宜四逆以溫中

救表宜桂枝以解外傷寒而不用麻黃者裏陽既虛不敢過汗也此與太陰下利腹脹滿宜桂枝

新加湯證十太陽八十

發汗後身疼痛脉沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之

汗泄血中溫氣陽虛肝陽故脉沉遲經脉凝滯風木鬱遏故身疼痛新加湯甘草補其脾精桂枝達其肝氣芍藥清風木之

燥生薑行經絡之瘀人參補肝脾之陽以溫榮血而充經脉也

新加湯二十

桂枝甘草二兩大棗十二芍藥四生薑四

於桂枝湯內加芍藥生薑各一兩人參三兩餘依前法

太陽病桂枝證有表邪而無裏邪醫反下之敗其中氣利遂不止此當溫裏若脉促者是表未解也蓋病在經絡不解表而

攻裏表陽乘裏虛而內陷為裏陰所拒不得下達表裏未迫故見促象脈來數時止若喘而汗出者是胃氣上逆肺阻而為

喘肺鬱生熱氣蒸而為汗也雖內有四逆證外有桂枝證而熱在胸膈二方俱不能受宜葛根連芩湯主之葛根連陽明之

鬱芩連清君相之火胸膈肅清然後中下之寒徐可議溫也 桂枝證解表而用葛根以喘而汗出胸膈鬱蒸宜葛根之辛

涼不宜桂枝之辛溫也

葛根黃連黃芩湯 二十一

葛根^{半斤}黃連^{三兩}黃芩^{二兩}甘草^{二兩}

桂枝去芍藥證十二 太陽八十二

右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥 取二升去滓分溫再服
太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之
下後脈促表邪未解是宜桂枝而益以胸滿則陽衰胃逆濁氣衝寒去芍藥之酸寒以解表邪若微惡寒者則不止脾陽之
虛而腎陽亦敗加附子之辛溫以驅裏寒也

桂枝去芍藥湯 二十二

桂枝^{三兩}甘草^{二兩}生薑^{三兩}大棗^{十二枚}

桂枝去芍藥加附子湯 二十三

桂枝^{三兩}甘草^{二兩}大棗^{十二枚}附子^{一枚}

桂枝厚朴杏子證十三 太陽八十三

於桂枝湯方內去芍藥餘依前法
於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚去皮破八片餘依前法
太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯主之
表病而攻其裏裏陰上逆而表邪未解肺氣鬱阻是以發喘桂枝加厚朴杏子降衝逆而破壅塞也

桂枝加厚朴杏子湯 二十四

桂枝^{三兩}芍藥^{三兩}甘草^{二兩}大棗^{十二枚}厚朴^{二兩}杏仁^{五十枚}

桂枝厚朴杏子證十四 太陽八十四

於桂枝湯方內加厚朴二杏仁五十枚餘依前法
喘家作桂枝湯加厚朴杏子仁
平素喘家胃逆肺阻作桂枝湯解表宜加朴杏降逆而破壅也

桂枝去桂加茯苓白朮證十五 太陽八十五

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝
去桂加茯苓白朮湯主之

服桂枝湯後或又下之仍復頭項強痛發熱無汗甚似表證未解而加以心下滿痛小便不利是非風邪之外未實緣濕邪
之內動也蓋土虛濕旺脾臨而肝鬱不能泄水故小便不利胃逆而膽鬱不能降濁故心下滿痛濁氣衝塞頭痛發熱桂枝
去桂枝之解表加茯苓白朮泄濕而燥土也

桂枝去桂加茯苓白朮湯 二十五

桂枝^{三兩}芍藥^{三兩}甘草^{二兩}茯苓^{四兩}白朮^{三兩}

芍藥^{三兩}甘草^{二兩}大棗^{十二枚}生薑^{三兩}茯苓^{三兩}白朮^{三兩}

厚朴^{半斤}夏麥甘證十六 太陽八十六

於桂枝湯內去桂枝加茯苓白朮各三兩餘依前法煎服小便利則愈
發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之



北京中醫藥大學圖書館藏

胃不偏燥脾不偏濕脾升胃降中氣轉運胸腹冲和故不脹滿汗泄中氣陽虛濕旺樞軸不運脾陷胃逆則生脹滿腹中生薑甘草半夏人參湯人參甘草補中而扶陽升夏生薑降濁而行鬱也

厚朴生薑甘草半夏人參湯 二十六

厚朴一片生薑半片甘草二兩半夏半片人參兩 右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

厚朴去皮生薑半片甘草二兩半夏半片人參兩 傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之

下傷中氣樞軸不運是以腹滿陽明上逆濁陰不降腐則壅塞宮城不清是以心煩煩極則卧起不安梔子厚朴湯厚朴枳實泄滿而降逆梔子吐濁痰而除煩也

梔子厚朴湯 二十七

梔子十四厚朴四兩枳實四枚枳殼一枚 以上三味以水二升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子乾薑證十八太陽八十八 傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

大下敗其中氣濁陰上逆瘀生腐敗阻格君火不得下行故身熱而心煩梔子乾薑湯乾薑降逆而溫中梔子吐痰而除煩也

梔子乾薑湯 二十八

梔子十四乾薑二兩 右二味以水三升半煮取升半去滓分三服溫進一服得吐者止後服

梔子香豉證十九太陽八十九 發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

汗下敗其中氣胃土上逆濁氣填瘀君火不得下行故心宮煩熱胸中窒塞梔子豉湯香豉調中氣而開窒塞梔子吐濁痰而除煩熱也

梔子豉湯 二十九

梔子十四香豉四兩 右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子香豉證二十太陽九十 發汗吐下後虛煩不得眠若劇者及胃脘倒心中懊憹者梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草

豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之

發汗吐下土敗胃逆君火不降故虛煩不得卧眠劇則陳宛填塞濁氣薰心故反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯吐其痰濁則

陽降而煩止矣若少氣者加甘草以益氣若嘔者加生薑以止逆也

梔子甘草豉湯 三十



梔子十四香豉四兩甘草二兩於梔子豉湯內加甘草二兩餘依前法得吐者止後服

梔子生薑豉湯三十一

梔子十四香豉四兩生薑五兩於梔子豉湯加入生薑五兩餘依前法得吐止後服

忌梔子證二十一太陽九十一凡用梔子湯病人舊微瀉者不可與服之

梔子苦寒之性泄脾胃而滑大腸凡用梔子諸湯設病人舊日脾陽素虛大便微瀉者不可與服也

太陽壞病入少陰去路十七章

少陰以寒水而犯君火平人水火交則腎水溫陰盛之人水旺火衰腎氣原寒病在太陽表陽外鬱內寒已動十有汗下溫

鍼之逆陽亡上敗寒水無制水邪泛溢氣不旋踵扶陽明而抑少陰良工當思患而預防也

太陰壞病入少陰桂枝附子證一太陽九十二太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附

子湯主之

衛陽汗泄皮毛失斂是以汗漏不止表虛是以惡風汗亡血中溫氣木鬱不能行水是以小便難陽亡土敗不能溫養四肢

是以四肢微急難以屈伸腎主五液入心為汗腎氣者諸陽之本汗漏不止則腎中陽根泄而不藏桂枝加附子湯桂枝達

肝木之鬱陷芍藥斂風氣之疏泄薑甘大棗補脾精而和中氣附子煖腎水以益陽根也

桂枝加附子湯三十二

桂枝兩芍藥兩甘草二兩附子一枚破八片生薑兩於桂枝湯內加附子一枚破八片餘依前法

芍藥甘草附子證二太陽九十三發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

汗泄血中溫氣木鬱陽陷故表病不解而反加惡寒芍藥甘草附子湯芍藥清風而斂榮血甘草培土而榮木氣附子煖水

以補溫氣也

芍藥甘草附子湯三十三

芍藥三兩甘草三兩附子一枚破八片以上三味以水五升煮取一升五合去滓溫服

內外俱虛證三太陽九十四下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

申明上章惡寒之義汗下亡陽必身軀振寒而經脈細微所以然者以下傷其內汗泄其外內外之陽俱虛故也

發桂朮甘證四太陽九十五傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂



枝白朮甘草湯主之

吐傷胃陽則病上逆濁氣衝塞故心通滿陽氣浮升而無根故起則頭眩下泄脾陽則病下臨風木抑鬱故脈沉緊木鬱鬱則愈升升發太過而不得平故氣上衝胸又復發汗以亡經中之陽溫氣脫泄木枯風動於是身體振搖勢如轉側此緣於水旺土濕而風木鬱動也苓桂朮甘草湯苓朮泄水桂枝疏木而甘草補中也

茯苓白朮桂枝甘草湯三十四

茯苓兩四甘草兩三兩桂枝兩三兩白朮兩二

真武湯證五太陽九十六

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身動振振欲墜地者真武湯主之

陽虛之人發汗過多主敗陽飛則頭目眩暈風木搖動則心悸肉瞤蓋木生於水而長於土水寒土濕木鬱風生是以悸動根本搖撼則悸在膺間枝葉振搖則悸在心下振振欲墜地者風動神搖欲穴地以自安也木鬱風動原於土濕而水寒真武湯生薑降濁而止嘔茯苓泄水而燥土芍藥清風而安振振附子溫腎水以培陽根也

桂枝甘草湯發汗過多其人又手自冒心

汗亡心液火泄神虛故又手自冒其心也汗多陽亡溫氣泄脫風木不寧而土敗胃逆濁氣填塞風木上行升路鬱阻故心下動悸欲得手按以寧神字桂枝甘草湯桂枝疏木而安動搖甘草補土以培根本也

桂枝甘草湯三十五

桂枝兩四甘草兩二兩

右二味以水二升煮取一升去滓頓服

陽虛耳聾證七太陽九十八

未持脈時病人又手自冒心師因教試令欬而不欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

汗虛故如此

五藏陰也陰中有陽清陽升發開竅五官濁陰下降七竅空靈故能聞見汗傷中氣肝脾不升肺胃不降清陽下臨濁陰上逆濁氣埋塞聽官障蔽是以耳聾也

身重心悸證八太陽九十九

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗若自汗出解所以然者尺中脈微此

裏虛乃須表裏實津液自和便自汗出愈

浮數之脈當以汗解設在下後而見身重心悸之證雖有浮數之脈不可發汗當使其汗自出乃愈蓋水旺土濕則身體重濁木鬱風生則心下悸動以其傷肝脾之陽故也所以然者寸口雖見浮數而尺中則脈微弱寸口主表尺中主裏寸口浮



數雖為表實而尺脈微弱則為裏虛頃裏氣漸復表裏俱實則裏氣內拒表氣外發邪無內陷之慮便自汗出而愈醫家於此貴有實裏解表之法雖汗出而無虛虛之嫌則以人巧而代天工矣

桂苓甘棗證九 太陽一百 發汗後其人臍下悸者欲作奔豚桂苓甘草大棗湯主之

汗亡血中溫氣風木鬱動是以振悸枝葉不寧則悸在心下根本不安則悸在臍間臍下振悸根本撼搖則奔豚欲作矣奔

豚者風木奔騰狀如驚豚上衝胸膈及乎咽喉腹脇心背諸病皆作喘呼閉塞之竅火生病勢凶惡莫此為劇仲景為龍以為腎邪也為龍難經腎之積曰奔豚其實純是肝氣蓋木氣奔衝原於陽亡而水寒也苓桂甘棗湯茯苓桂枝泄水而疏

乙木甘草大棗補脾精而滋肝血也

茯苓桂枝甘草大棗湯 三十六

茯苓半斤桂枝四兩甘草二兩大棗十二枚 右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

又作甘瀾水法取水二升置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

桂枝加桂證十 太陽一百一 燒鐵令其汗鐵處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝

加桂湯更加桂二兩

汗後陽虛脾隘木氣不舒一被外寒閉其鐵孔風木鬱動必發奔豚若氣復少腹上衝心胸便是奔豚發作宜先灸其核上

各一壯散其外寒即以桂枝加桂湯更加桂枝以疏風木而降奔豚也桂枝加桂者於桂枝湯內更加桂枝也

桂枝加桂湯 三十七

桂枝五兩芍藥三兩甘草二兩大棗十二枚生薑三兩 於桂枝湯內更加桂枝二兩共五兩餘依前法

桂枝加桂證十一 太陽一百二 太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯用前法若不上衝者不可與之

下後其氣上衝是奔豚發作也可與桂枝湯用如前法疏風木而降奔衝若不上衝者奔豚未作不可與前湯也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣證十二 太陽一百三 傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝湯去芍藥加

蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之

汗多亡陽若火飛騰神魂失歸是以驚生濁氣上逆化生敗腐迷失心宮是以狂作桂枝加蜀漆龍骨牡蠣湯桂枝甘草疏

木而培中生薑大棗補脾而降逆蜀漆吐腐瘀而療狂龍骨牡蠣斂神魂而止驚也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 三十八



桂枝三兩甘草二兩大棗十二生薑兩蜀漆三兩洗龍骨兩牡蠣五兩

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮

取三升去滓溫服一升

溫鍼亡陽證十三 太陽一百四 太陽傷寒者加溫鍼必驚也

溫鍼發汗亡陽土敗胃逆神魂無歸必生驚悸也

桂枝甘草龍骨牡蠣證十四 太陽一百五 火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

火劫發汗是為火逆火逆之證下之亡其裏陽又復燒鍼發汗亡其表陽神氣離根因而煩躁不安桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯三十九 桂枝甘草龍骨牡蠣湯三十九 桂枝甘草龍骨牡蠣湯三十九

桂枝兩甘草兩龍骨兩牡蠣兩

右為末以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

茯苓四逆證十五 太陽一百六 發汗若下之病仍不解煩煩者茯苓四逆湯主之

汗下亡陽土敗水侮陽氣拔根擾亂無歸故生煩躁茯苓四逆湯茯苓麥甘泄水而補土乾薑附子溫脾而煖腎也

茯苓四逆湯四十

茯苓兩八參兩甘草二兩乾薑兩附子一枚 右五味以水五升煮取二升去滓溫服七合日三服

乾薑附子證十六 太陽一百七 下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈微沉身無大熱者乾薑附

子湯主之

汗下亡陽土敗水侮微陽拔根不得下秘故晝日煩躁不得眠夜而陽氣歸根是以安靜溫氣脫泄乙木鬱陷故脈象沉微

而身無大熱乾薑附子湯乾薑溫中以回脾胃之陽附子溫下以復肝腎之陽也

乾薑附子湯四十一

乾薑兩附子一枚生用去 右二味以水三升煮取一升去滓頓服

禹餘糧證十七 太陽一百八 汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰痛與禹餘糧丸力關

素汗家液亡神虛重發其汗陽亡神敗必恍惚心亂濕動木鬱小便後陰痛以木鬱於水疏泄不暢使後滯氣凝澀故承孔

作痛禹餘糧散陽神於陰精蟄君火而達風木也

太陽壞病入厥陰去路一章



厥陰以風木主令陰盛之人病在太陽木鬱將發一有汗下溫鍼之通陽散水寒乙木失溫生氣不達厥陰之病相繼作矣
太陽壞病入厥陰胃冷吐蚘證一太陽一百九病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘

藏府素有積寒復發汗以亡胃陽胃冷不能安蚘必吐蚘蟲因木化厥陰木鬱則生蚘蟲素問厥陰者陰之純陽厥陰於至陰之藏寒極吐蚘則水脹而火不能復中伏死機是以內外感傷諸病一見吐蚘便屬險證陽絕則死陽復則生惟溫病吐蚘是熱非寒與餘證不同也

傷寒懸解卷五

太陽經下篇二十五章

太陽壞病結胸痞證

太陽之病不解於太陽而入陽明之府太陰之藏寒熱之偏勝危機伏藏是皆太陽之壞病也然愆忽失治離表傳裏後其入於陽明而用承氣入於太陰而用四逆猶有救壞之方至於未成陽明下早而為結胸將成太陰誤下而為痞則陽明不成為陽明太陰不成為太陰承氣四逆方俱不可用是為壞中之壞莫可救挽者也仲景於此變承氣四逆而為陷胸瀉心法挽逆為順至德神功無以加矣

太陽壞病結胸痞證提綱一太陽一百十

病發於陽者多入陽明而為熱病發於陰者多入太陰而為寒病發於陽後其表

證已解內熱既實而用下乃不為早下早則表陽陷而為結胸此陽明之壞病也病發於陰始終不可用下誤下則裏陰升而為痞此太陰之壞病也病發於陽而反下之熱入因作結胸發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也

承病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也此太陽病發於陽風傷衛也風傷衛氣遏遏滯血而生內熱藏陰衰者多傳於陽明當其經熱方盛法宜解表俟至表熱傳胃乃可攻下邪之內傳府熱未成胸熱先作以陽盛於上也熱未入

府下之若早中氣受傷升降倒置胃土上逆膽木不得下行君相合邪刑剋肺金肺熱愈隆而皮毛不泄經絡之熱遂入入胸膈經府之氣兩相拒格硬滿作痛是為結胸病發於陰寒傷榮也寒傷榮血束閉衛氣而生外寒府陽弱者多傳於太陰

誤下則脾陽下陷陰邪上填堵塞心下是謂痞證未下之前經熱非盛故下後原無熱入但痞滿不消久而鬱甚則生熱耳

內傷脾虛之證往往心下痞滿誤投寒涼其痞愈甚即此病也結胸上熱下寒而下寒不甚故用陷胸湯泄上焦之濕熱痞

證亦上熱下寒而下寒較重故用瀉心湯清上而溫下結胸證惟陽明少陽有之以陽旺而生上熱也陽明上逆則少陽不證亦上熱下寒而下寒較重故用瀉心湯清上而溫下結胸證惟陽明少陽有之以陽旺而生上熱也陽明上逆則少陽不

故經熱內入痞證惟太陰有之以陰旺而生下寒也結胸因於下早痞證因於誤下大不同也結胸病證因陽氣不舒

甲木上逆但有陰陽之分



太陽壞病結胸證十二章

結胸者異日之陽明今日下早而成者也胃府燥熱汗亡其陰則成陽明胸膈滿熱下陷其陽則成結胸若遲延數日濕熱燥奪表寒已解府熱既實一下而愈何至於此故太陽而見陽明之證宜遲遲而用承氣勿忽忽而用陷胸蓋結胸乃陽明之壞病也陽明之病在腹結胸之病在胸承氣泄下焦之燥熱陷胸泄上焦之濕熱高下不同燥濕亦異也

太陽壞病結胸大陷胸證一太陽百十一 太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊憹陽氣內陷心下因硬則

為結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘處無汗則頭而達小使不利者身必發黃也

太陽病脈浮而兼動數浮則為表中之風數則為榮鬱發熱動則為經氣受泄勢迫而生疼痛數從浮見尚非內實是故曰虛其證頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表邪未解故也醫不解表而反下之動數之脈變而為遲則胃氣敗矣陽敗胃逆

破膽木降路逆衝胸膈膈胃相拒則膈內疼痛甲木下行化相火而歸榮水相火在水是為下焦三氣今陽敗胃虛甲木逆行以下焦主氣客居膈上衝動不已此拒痛所由來也心肺之脈以下降為順胃膈逆阻心肺蓋降相火上炎助君火而刑

平金則煩躁懊憹氣短胸盈膈熱鬱發皮毛不開經中陽氣亦遂內陷經府之熱彼此壅塞心中堅凝是為結胸肺金鬱遏霧氣淫蒸津液凝濁化生痰涎大陷胸湯硝黃清其鬱熱甘遂決其痰飲胸中邪熱推蕩無餘至若不成結胸但頭上汗出

餘處無汗則頭而達下見小便不利者是苦寒泄其脾陽濕氣內鬱而無降路身必發黃表熱傳胃則為陽明證陽明有陽而無陰故病燥熱表熱入膈則為結胸證結胸上陽而下陰故病濕熱藏氣發舒則津液流溫藏氣埋塞則痰涎凝結無二

理也

按大陷胸證表陽即陷而經邪未解是宜內清胸膈之熱外解皮毛之邪使上鬱之裏熱固自裏散內陷之表陽遂從表出仲景用大陷胸湯但泄上焦濕熱而不用表藥是救急之法此處尚可變通惡意用石膏甘遂枳實麻黃雙解表裏得仲景法外之意矣程氏曰結胸證用枳實理中丸甚效欲破其結而軟其堅則黃芩苦葶藶為佳

大陷胸湯四十二

大黃兩芒硝半甘遂一錢 右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一二沸內甘遂末溫服一升得快利後服

大陷胸證二太陽百十二 傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石數者大陷胸湯主之

傷寒六七日後結胸而脈熱內實心下滿痛按之如石之硬者是真大陷胸證也結胸之脈寸浮而關沉後重寸脈浮關脈

沉名曰結胸是也脉沉而緊指關上言抵當湯證脉微而沉反不結胸蓋結胸之脉關上必沉也後章小結胸病正在心下脉浮滑者太陽病下之脉浮者必結胸也皆指寸脉言

大陷胸證三

太陽百十三

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡有潮熱從心下至少腹硬滿而痛不

可進者大陷胸湯主之

結胸證攻下後下寒逆熱在上病但在胸不至少腹此從心下至於少腹硬滿而痛是結胸而兼陽明府病也

渴日晡潮熱全是胃府燥熱但小有潮熱府邪尚輕故用陷胸而不用承氣也

大陷胸丸證四

太陽百十四

結胸者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胸丸

胸膈痞塞濕熱衝衛則甚痛故項常反折狀如柔痙大陷胸丸硝黃

病連項頸恐湯之速下也

大陷胸丸

大黃

芒硝

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂合散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕

白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法

結胸忌下證五

結胸證其脉浮大者不可下下之則死

結胸之脉寸浮關沉寸浮則上熱關沉則中寒上熱甚而中寒不甚則浮多而沉少是以可下若其脉大絕無沉意意是非

無中寒也乃中寒之極陽氣全格於上是以但見浮大而不見其沉下之中氣敗竭必死無疑也結胸可以下愈者下焦之

陽未至絕根故推盪其上鬱之陽使之通達於下以接下焦之根是以愈也其脉浮大則陽已絕根於下是中虛外寒之診

下之所以速其死也

結胸煩躁證六

結胸證意具煩躁者亦死

遷延日久結胸證無一不具若見煩躁則熱極矣上極熱者下寒必極如是者雖不下而亦死非死於上熱非死於下寒乃

死於中氣之敗也

小結胸證七

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之

小結胸病正在心下位與大結胸同但按之則痛非如大結胸之不按亦痛也脉則浮滑亦不如大結胸之寸浮關沉白虎

湯證脉浮滑者此裏有熱未有寒也此雖不如大結胸之熱實而亦有裏熱較之大結胸證同而病輕小陷胸湯黃連泄熱