





第七五四册

大清
四庫全書

● 上海古籍出版社

本冊目次

全書

普濟方(八)

明朱權撰

泄痢門

總論

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百七

難經云有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後
重蓋胃者為齒腸水穀海也故渴則色黃食不化脾者
為胃行其津液者也故渴則腹脹滿嘔吐大腸謂白腸
故渴則大便色白腸鳴切痛小腸謂赤腸故泄則便膿

欽定四庫全書

普濟方
卷一百七

詳校官大醫院院使臣張紫蓋

編修臣倉聖脈覆勘

血小腹痛瘕者血聚也渴陰之氣結聚於內留滯而不
行則裹結後重數至固不能便故謂大瘕渴也胃為水
穀之海其精英則流布以養臟腑其糟粕則傳送以歸
大腸腸胃虛弱或挾風或挾寒或傷暑傷熱停冷蓄熱

冷熱不調泄渴諸症皆能治之挾風者自汗惡風痛引
腰背挾寒者筋節拘急身體怯寒傷暑者面垢燥渴之
引水漿傷濕者肌肉虛浮肢體重著冷則腸鳴肚冷而
手足清熱則煩躁壯熱而手足溫冷熱不調者乍澀乍

滯由熱積於內不能去其積徒以冷藥水飲之熱氣無所發泄故冷與熱搏而下注其或冷積於中不能去其滯徒以熱藥壓之冷積不得宣行故熱與冷甘而成泄或滯或湧裏急厚重是其候也外此則傷食一証失飢傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭治法當究其感受之源然後為之固實不塞其源吾恐決潰四出莫知其終矣然脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所謂泄人皆以泄為脾恙而不知腎病有泄焉腎漏何如曰腹痛

欽定四庫全書

醫學方
卷二十七

欽定四庫全書

醫學方
卷二十七

無定似痢非痢骨弱面黑脚下時冷者是也諸有泄漏用不換金散也除濕湯之類以去風寒以安腸胃此土品藥也次則溫脾養胃之制投之是為正法然用之而不作劫抑且腹痛走上走下或臍間隱痛腰脊疼痛骨節軟弱面色黧黑及脉虛弱病安在哉曰此解泄也當以防微紙生薑官桂乾薑木香當歸草主之仍用安腎丸為佐其氣腫水下涸心火上炎燥渴渴多飲無度此陰陽離絕也誠者至若泄痢之後腹滿身疼是則為表裏俱病先當溫裏急與四逆湯然後解表急以桂枝湯與之肝木脾土木能勝土古人慮之固也經肝腎氣虛為病泄漏亦孰知腎者所以守司於下而肝者又門戶要束之具

束則不漏也不然泄漏而面色青慘者古書謂肝經所受致寒時用當歸厚朴湯以主之果何意哉太素曰五泄有滯泄驚泄飧泄濡泄滑泄也此乃是五泄者青是感肝木之象其色青赤者受心火之氣其色赤白者得金肺之氣色白黃者脾土之氣土氣之下與水隨之其色蒼也泄漏之症經中所謂飧泄瀉洞泄濡泄溢泄水穀注下是也大腸為五穀傳送之官脾胃虛弱飲食過度或為風寒暑濕之氣所中皆能令人泄漏如傷於風其脉必浮下必帶血當以胃風湯驅散之如寒氣所傷脉必沉細腹肚切痛下必青黑當以附子理中湯治中湯等溫暖之若傷於暑則脉必沉微煩渴引飲其下如水當以飲服五苓散來腹丹以分利之或夷食則又當以胃苓湯下蘇然九若濕氣所中其脉沉緩腰脚冷痺小便自利不渴其下黃黑色當以滲溫湯藿香正氣湯調之因停食而泄者下必臭類抱環鵝子或噫氣作酸先服感應丸推其食積而後理脾氣虛

弱及年高之人脾氣虛敗而自利者又當投以四柱散
竈附丸若脾胃氣虛清晨泄下一二次二神四神丸主之又有腎氣虛而泄者又須金鎖正元丹以固之凡治渴之法先理其中焦分利水穀然後斷下醫之大法如此若脚氣泄渴各以類求泄一症最忌五虛五虛者脉細虛寒少氣前後泄痢飲食不入者是也若得糜粥入謂泄渴止作可治也五泄之病胃小腸大瘕三証皆以清涼飲子主之其泄自止厥陰症加甘草以緩之

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七

四

少陰證裏急後重故加大黃又有太陰陽明二証當進退大承氣湯主之証不能食也當先補而后泄之乃進藥法也先煎厚朴半兩製水煎二三服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎二三服泄又未已如稍進食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄止住藥如泄未止為腸胃有久瘻垢滑粘加芒硝半合宿垢去盡則愈也承氣湯伍錢水煎服如利過泄則少減之後稍熱退減

大黃一半再煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃與枳實厚朴湯又煎三兩服如腹滿退泄亦自愈後服厚朴湯數服則已如大使虛滑久不愈太陰傳少陰為痢為誠邪宜以厚朴枳實湯主之儒門事親書云東門一男子病渴而不止服鳴如雷不敢含坐則下注如傾諸醫例斷為寒瘻葛謐官桂丁香荳蔻之屬枯營龍骨皆服之矣何鍼不繩何艾不灸追延將二十載矣一日問於戴人戴人曰手子寸脈皆滑余以為寒然不知寒者水也以茶調散涌寒水五七升無憂散泄精水數十行乃通因通用之法也次以五苓散淡劑滲利之又以甘露散止渴不數日冷食寒飲皆如故此法王啓玄繪言之余無人用之何哉又云凡大人小兒暴注水病

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七

五

不止內經曰此名曰暴注連渴久而不愈者為洞漏注下此乃火運太過之病也火星暴注故也急宜用新汲水調下甘露散子五味散天水散或用井華水煎此藥於今服之病即瘳矣不可用御參散乾薑互爲散子之類縱然泄止腸胃氣滯不通壅服脈此法宜分陰陽利水道乃為治法之妙也凡泄渴水穀不化日夜無度腹中雷鳴下痢完穀可用導水丸禹功桂枝藤黃湯汗之則愈內經曰夫風之中為腸風飧泄啓玄子云風入胃中上黨於胃故食不化而化泄又云

暮食不化為飧漏又經云春傷入風夏為飧泄故風宜出汗腸中鳴者風以動之動而有聲慎不可用堅粟荳蔻乾薑大燥之藥病漸者燥之去其濕則愈病甚者攻之不動反能為害經曰其減則漸其加則甚可用五苓散去猪苓加人參散 凡下痢腹痛不止者何也

諸痔瘻皆屬於心火也可用通解丸加減漏之量其虛寒用之次用消濕散加生薑大棗芍藥服之漏訖又用

新水調五苓散服之又一法煎燈心湯調下益元散伍

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七

柴錢此病大忌油膩葷腥熱物 夫漏痢兩証因腸胃

先虛虛則六淫得以外入七情得以內傷致於飲食不

節過食生冷多飲寒涼洞擾腸胃則成注下注下不已

餘積不消則成滯下治漏之法先當分利水穀車前子

煎湯調五苓散是也次則上焦中焦正中湯及治中湯是

也理中不効方可斷下乳豆丸固腸丸是也或尚腹痛

未宜斷下斷下太早必成痢疾惟當調中化積痛輕者

宜服治中湯蘇合香丸腹痛更甚者必然成痢也醫經

所謂腹痛甚者必下痢也宜進靈砂丹以逐其積此丹

用之屢驗漏者止疼者愈有疾者內化且不動臟腑大

凡痢疾不先去其積雖復暫安後必為害或陰陽相搏

冷熱不調而成漏痢者當追查遠近更有脾腎虛腹

脹脹飲食不化而泄漏者宜助脾腎裏肉丸是也今

之人久漏不止多投來復丹誤矣蓋來復內用硝石硫

黃皆有利性青皮陳皮又有遷性豈宜服之如夏月暴

漏乃可服也 脳腑泄痢其証有多種大抵從風濕熱

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七

也是知寒少熱多故曰暴泄非陰久漏非陽腹而便膿

血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍

藥是為輕劑治法宜補宜泄宜止宜和則芍藥湯止

則訶子湯有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁

氣難喘急脉微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也後重

則宜下腹痛則宜和身重者除溫脉引者去風膿血稠

粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗

之驚瘻為癥當內之在表者發之在裏者下之在上者

勇之在下者竭之身表熱者內躁之小便澀者分利之

盛者和之去者送之過者止之除濕則白朮茯苓安脾則芍藥桂枝黃連當歸宣通其氣則枳榔木香如泄痢

而嘔上焦則生薑橘皮中焦則芍藥當歸桂枝芩下焦則治以輕熱藥下甚以重熱藥若四肢倦小便少或不利

大便走沉困飲食減宜調胃去濕白朮茯苓芍藥三味水煎服如發汗惡寒腹不痛加黃芩為主如未見暎而

惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝佐之如腹有休息痢者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘

之氣動於臟腑下血雜白如病蟲之狀名為腸蟲也不愈侵傷於臟腑下血雜白如病蟲之狀名為腸蟲也

有休息痢者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣調其飲則靜而痢亦休腸胃虛弱易為冷熱其邪氣或動

之如煩躁或先便血膿後白或發熱或惡寒非黃連不止上部血也如惡寒脈沉或白腰痛或血膿下痛非黃芩不止此中部血也如惡寒脈沉先血後便非地榆不能

止此下部血也唯脉浮大者不可下至冬赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不差也凡痢久不瘥脾胃虛弱則變嘔

穢胃熱氣逆故嘔也氣逆外有冷折之不通故嘔亦變為蠭蟲食人五臟也三尸九蟲常食居人賜胃腸胃虛則動上食於五臟則心懊惱而悶齶斷唇口並生瘡下食於腸則肛門傷爛而殺道開也輕者可治重者致死大腸蟲刺者冷熱之氣入在腸間先下赤後下白連年不愈侵傷於臟腑下血雜白如病蟲之狀名為腸蟲也有休息痢者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故為痢也冷熱氣調其飲則靜而痢亦休腸胃虛弱易為冷熱其邪氣或動其飲則靜而痢亦休腸胃虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其痢乍發乍止謂之休息痢也夫水穀之精化為血氣津液以養臟腑受風邪入腸胃故痢則津液空竭臟腑虛燥故痢而兼渴也渴而引飲即痢不止翻益水氣脾胃已虛不能克消水水氣流溢侵漬肌肉則變成瘻也病有數種有水痢有穀痢有血痢有腺痢有膿血相和痢有傷溼痢其水痢者本由脾氣熱消穀作水穀氣不停便生此病穀痢者由脾氣冷殺氣不消而生此痢血痢者由毒熱在腹血流入腸故有此痢腺痢

者由積冷所致。膿血相和，痢者由冷熱相擊便致此病。腸澼痢者，由積冷在腸間，垢滯不能自固，便有此痢。色數雖多，其源則一，皆緣飲食不節，將養失宜也。腸垢者，腸間津液也，由熱痢蘊積，腸間虛滑，所以因下痢而便腸垢也。當診其脉，如下痢微小者，生浮洪者死沉弦者，下重脉大者未止，緊者邪氣未解，脉弱而微，渴必自愈。腸澼下腹血者，脉宜微滑也。若弦急者必死，手足厥冷無脉，灸之不溫，脉不還反，微喘者死。身寒者生發熱者死。

臨病之際，由此驗治之，萬不失一。下痢脉滑而數有宿食，當下之下利，脉遲而滑者寢也。利雖未止，宜急下之。下痢脉反滑，當有所去下，乃愈。下痢不欲食者，有宿食，當下之下利，而腹痛滿為寒寢，當下之下利，腹中堅者，當下之下利，而謙語者，腹內有燥屎，宜下之下利，二部皆平，一作浮，按其心下堅者，急下之下利已瘥，至其年日月時復發者，此為下不盡，更下之愈。風寒下者，不可下，下之後，心下堅痛，脉遲一作浮，此為寒，但當溫之。

脉沉緊下之亦然。脉大浮弦下之當已下，痢脉浮大，此為虛以強下之故也。設脉浮革者，因爾腸鳴當溫之下，痢脉遲急為痛，未欲止，當溫之得冷者，滿而便腸垢下，痢身軀疼痛，急救裏諸溫之屬可與理中四逆附子湯，熱藥下，痢大孔痛者當溫暖之下，痢腹脹滿，身軀疼痛者，先溫其裏，乃攻其表，下痢清殺不可攻其表，汗出必脹滿，下痢氣者當利其小便，下痢脉反浮數尺中，自濇其人必清，膿血下，痢脉數而渴者，今自愈，設不瘥，必清膿血有熱故也。下痢脉沉弦者，下重其脉大者為未止，脉微弱數者為欲自止，雖發熱不死，下痢脉沉而遲，其人面少赤，下痢清穀必欲冒汗出而解，病人必微厥，所以然者，面戴陽下虛故也。下痢有微熱而渴脉熱者，今自愈，下痢脉數有微熱汗出，今自愈，設脉緊為未解，下痢脉反強發熱，身汗者自愈，下痢脉大浮弦下當已下，痢舌黃燥而不渴，胸中寢下不止者死。下痢後脉絕，手足厥冷，時脉還手足溫者生，不溫者死。下痢手足厥冷。

無脉者炙之不溫若脉不還反微喘者死少陰負趺陽

者為順凡六腑氣絕於外者手足寒上氣腳縮五臟氣絕於內者下不自禁下甚者手足不仁也 痢與渴名

目不同而感受之源一也治療之劑大要以散風邪行滯氣開胃脾為先不可遽用肉荳蔻子白朮草以補住寒邪不可遽投瞿麥殼龍骨牡礦草以閉塞腸胃邪氣得補而愈盛補之愈盛而愈作不為緩擾撮痛則為裏急後重所以日久延淹而未已也 痢之赤白其赤者

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七

十二

欽定四庫全書

普濟方
卷二百七

十三

走勞役以耗精血非此病生於內者乎必明別內外而

推度之則受病淺深用藥輕重知有定向矣下痢壯熱須用敗毒散加陳米泔與五苓散黃連阿膠丸下痢雖

曰有積有暑如用藥不效即是腰腹有氣邪熱者赤毒者與敗毒散冷者白者不換金正氣散加木香若下痢

熱極煩併寒痛或久不愈諸藥不能者須下之以開除濕熱痞閑積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣痢積熱也 凡治痢不可拘於無積不成痢之說也專以去

熱乘於血血滲大腸則赤也若風邪挾熱則所下黃而赤其白者冷搏腸間津液凝滯則白也若寒邪併之則所下白而黑冷熱相交故赤白相半重者狀若膿涎而血雜之輕者漿涎中間微有赤綠是也內挾風邪故青血流注或溫毒乘虛入腸胃之間則下如葷汁或有瘀血是也論者以手足寒為冷手足溫為熱於理甚當亦當以赤白而並觀之雖然風寒暑濕感之於外者也其大嚼而傷飽而宿酒漿醞醢以成積滯房闇縱情加奔

積為先豈有一歲之內獨於夏秋之間人皆有積亦須明其脈體之由辨其風寒暑濕所中蓋風邪入胃水來勝土不為暴下則為痢疾其疾所發証候不一有赤痢白痢赤白痢冷痢熱痢蟲痢氣痢噤口痢積痢血痢久痢休息痢膿血痢五色毒痢凡下痢赤黃但欲飲冷水便不順利得熱則更極心煩燥喜渴脈虛大而數或沉寢有力由乘虛熱入於胃壅於下焦津液不分併於大腸謂之協熱痢先以小承氣湯一二服蕩之次以五苓

散加車前子以利小便次以黃連阿膠丸治之 治痢

陟釐丸烏梅丸松皮散等暴痢服之何有不差其溫脾

湯止脾久久不得之焉能得愈大凡痢有四種謂冷熱

瘡瘍冷則白熱則赤疳則赤白相雜無復節度多睡眼

澁盜則純痢瘴血熱則多益黃連去其乾薑冷則加以

熱藥瘴則以藥吹灌下部盜毒則以盜法治之藥既主

對相當痢者復自勉勵服餌焉有不愈者也

諸瀉病

欽定四庫全書

卷二百七

七

方

灸肝散 治脾胃虛弱五癆七傷肌體羸瘦全不思食
久患泄瀉腸滑不止心胸滿悶腹痛或便腹血
困倦無力四肢沉重及心勞口瘡並皆治之

木香 白术 生犀角 山茵陳去梗 紅荳蔻 緩

砂仁 桂去皮頭 人參去蘿 黑附子炮裂去皮脐

解炒 狗脊去皮 川芎 良薑 柴胡去苗 詞子

草荳蔻炮裂去皮脐 各一兩半 陳皮去白 白芍藥

乾薑炮 桔梗 防風 紫苑去 紫參去

白蕪薑炒去皮

吳茱萸洗培乾各半兩

右為末每二錢羊肝二兩去筋膜薄批捲藥入葱白

生薑絲鹽各少許拌勻紙裹水溫文武火煨熟用生

薑粥下食前日二

欽定四庫全書

卷二百七

七

言用此藥與人莫不神應備錄病愈人名姓茲不備

述予用此方十餘年無不取効脾瀉者即愈而瀉痢
只一服見効惟熱痢熱瀉不治蓋藥主熱也隨証用

之

木香 破故紙各一兩 良薑七錢 砂仁七錢

厚朴七錢 赤芍藥半兩 陳皮半兩 官桂半兩 白

术半兩 胡椒二錢 吳茱萸半兩 热水洗 肉荳蔻四

枳榔一箇 茄皮半箇 白芍藥四箇

右為末用漿水養豬肝和藥搜勻仍用些麵糊為丸如梧桐子大每服

如梧桐子大每服五七十九空心發稀米粥飲送下

訶梨勒丸 治五泄痢

訶梨勒半生半熟
並去核 肉荳蔻去殼 木香各三 乾

薑炮半兩
炙剉各

右為末煮醋糊丸梧桐子大每服二十九至三十九
米飲下

鍾乳建脾丸 治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃

冷弱飲食不消腹脹雷鳴泄濁不止又治腸虛積冷
下痢清穢或下純白腹中疼痛及久痢赤白腸滑不
禁少氣羸瘦不思飲食並宜治之

肉桂去皮 人參去皮 黃連去皮 乾薑炮 龍骨

各一 蜀椒炒出汗三兩半 附子炮去皮 細辛去苗

大麥蘖炒一兩 附子炮去皮 細辛去苗

旋芩去皮 神曲炒一兩 赤石脂各一 鍾乳粉

去根各一兩 大麥蘖炒一兩 附子炮去皮 細辛去苗

土旋芩去皮 神曲炒一兩 赤石脂各一 鍾乳粉

半兩

欽定四庫全書

卷二百七

十六

欽定四庫全書

卷二百七

十七

754-9

右為末入鍾乳粉和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服

三十九食前服溫米飯下日三服未効用三建湯吞

金粟黃芽丹數粒方見痼冷類一方通治男女集驗

無細辛龍骨

丁香荳蔻散 治脾胃虛弱宿寒停積或飲食生冷物

內傷脾胃泄濁注下水穀不化胸滿短氣咽逆惡心

臍腹疼痛腸肋脹滿腹內虛鳴飲食減少及積寒久

痢純白或白多赤少日夜無度或脾胃虛寒泄濁日

久愈而復發者並宜服之

京三稜炮 木香火
不見 厚朴去皮
蜜汁製 荷葉

肉荳蔻炮 人參去皮 乾薑炮 茶苓白者去皮
各五兩

甘草炙 吳茱萸禹泡
次焙 丁香各二 蒼朮去皮

七兩

十六

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗一枚同煎至

八分空心食前溫服不及煎入鹽少許湯熱服亦得

白术聖子散 治一切漏痢久不瘥并婦人產後刺亦治

御米穀三兩
蜜炒 當歸 乾薑炮 石榴皮 甘草

訶子 肉荳蔻 陳皮去白 白朮 縮砂仁

芍藥各等分

右為末每服二錢水一大盞入乳香少許同煎和滓服

固腸丸 治漏及泄瀉

肉荳蔻面裹燒 龍骨水飛研 阿膠阿粉炒 木香濕紙

附子炮裂乾薑炮 赤石脂煅七次醋碎研 人參

欽定四庫全書

各一兩

沉香普濟方半兩銘
不見火

白朮二兩炒

訶子去核

右為末粳米糊丸梧桐子大每服七八十九空心米飲下服藥後覺熱去附子加茱萸一兩黃連一兩

大溫脾丸 治脾胃虛弱冷氣攻衝飲食不化心腹脹

痛嘔吐吞酸痞噎及腸鳴泄痢水穀不分面黃肌瘦食減嗜卧並皆治之常服溫脾益胃消穀進食如火虛咽冷食少多傷尤宜常服

吳茱萸湯泡七次焙

大麥蘖炒

肉桂去皮五兩

草薢 桔梗 人參 乾薑炮各三兩

細辛去苗各二兩 枳實細炒分半

神曲碎炒三兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服二十九溫酒下米飲亦得日三服空心食前一方用枳殼

訶梨勒散 治泄瀉無度

訶梨勒 母丁香各五枚 甘草炙剉一錢 肉荳蔻蜜炒

人參

欽定四庫全書

右為散米飲調下半錢食前服

繩金丹

治大人小兒一切漏病無間冷熱赤白連綿

不瘥愈而復發腹中疼痛者宜服之和剉 一名不二丸

九

硇砂一方

乳香各二錢半

杏仁去皮一錢半

巴豆去皮心膜八錢半

出油各一錢

黃丹二兩半

黃蠟朱砂各一錢半

木鹽白膠香一錢半

桂清燒通赤候冷取出

一錢

砒霜醋煮研三錢半或研磁罐子以赤石脂固練鹽泥固

食減嗜卧並皆治之常服溫脾益胃消穀進食如火虛咽冷食少多傷尤宜常服

右為細末鎔蠟搜和丸如麻子仁大每服一丸小兒

半丸水泄新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下

赤白痢甘草乾薑湯下并於臨卧時服孕婦莫服忌

熱物一二時辰一方鎔蠟為劑入油二十點令軟油

單聚旋丸

肉荳蔻丸出御醫院方 治腸虛脾弱停積風冷大便泄濁

水穀不化腹脇脹痛下痢膿血遍數頻併裏急後重嘔

逆惡心肢體困倦飲食減少

欽定四庫全書

普濟方卷二百七

肉荳蔻

炮炭
研

黑附子

皮臍
炮去

桂

皮
去皮

硫黃

皮
研

白术

炒
當歸

川薑

炮
去薑頭

紅荳蔻

皮
各半
兩

荳子皮

一
兩

右為細末醋麵糊丸梧桐子大每服三十九空心米
飲下

水煮木香丸仁存方 治腸胃虛弱風濕進襲洩泄水穀

滯下膿血疼痛裏急後重日夜無度及純下白

痢淡紅黑痢

當歸洗 茜藥白 甘草炙 謝子去核各青

皮陳皮各一

兩

縮砂仁

木香各一分

光

厚朴去

皮功薑

一兩

瞿粟殼

切醋淹

炒五兩

右為末蜜丸一兩作五丸每服一丸水一盞煎七分
食前溫服 凡血得熱則淖溢故行得寒則凝滯故

瘀當審其風熱風冷二証與蟲刺大別外有血痔血

枯肉鰣酒利肺疽腸胃大蓄遠近瘀血等各有門類

不可混雜積冷積熱及水穀壅而下痢者以大黃湯

欽定四庫全書

普濟方卷二百七

下之養生方亦云疎滌之更不知有寒熱風濕虛寒

之不同後尋即妄用被害多矣吁可傷哉一方有乾

薑無縮砂仁厚朴

白术調中丸瑞竹堂

治脾胃不和心下堅痞兩脇脹滿

脅腹疼痛噫宿腐氣霍亂吐瀉米穀不消久痢赤白

膿血相雜多日羸瘦不思飲食

神龜丸四兩

白术半

人參去

白茯苓去

猪皮

芩去黑

澤瀉各三

木香二

官桂去寒皮

一錢半

甘草 去皮炙一兩

乾薑 炮一兩

右為末麵糊丸梧桐子大每服五七十九空心淡薑湯下

加味六君子湯 出德生堂

治一切脾胃虛熱泄瀉之証及傷寒病後米穀不化腹中虛滑發渴微痛不久瘥者及治小兒脾甘泄瀉得利

人參 白朮 白茯苓 甘草 黃耆 山藥

砂仁 各一兩 加厚朴 七錢 肉荳蔻 七錢半

欽定四庫全書

普濟方

卷二百七

右為末每服二錢飲水調服不拘時如熱煎麥門冬

水調服

震靈丹 出直指方

治脾鴻腹痛無定處似刺非刺骨痛而薰腰脚冷

禹餘糧 火煅醋淬不計遍次手搗碎為度

丁頭代赭石 如上條製

赤石脂 紫石英杵碎已上各四兩入于錫內以

十斤煅通紅火盡為度入地坑內出火毒二宿研末用磚灰一

五靈脂 并去砂石研各二兩

硃砂 一兩

右並為細末糯米粉糊丸小雞頭子大風乾每服三丸用炒故紙入棗湯調鍾乳粉少許空心下小兒腎

泄白臘褐汁面點齒脫畏人怯寒震靈丹末入夢鍾乳粉以棗煎炒故紙取熱汗調下

胃風湯 出直指方

治大人小兒風冷乘虛入客脾胃風散氣故血行大腑多便鮮血水穀不化泄瀉注下腸胃濕毒下如腹脇虛滿腸鳴豆汁或下瘀血日夜無度

脊腹疼痛腸風下血婦人下血過多面黃力倦服此尤能資補但味甜恐傷殺氣耳

人參 白朮 白茯苓 當歸 药茱 桂心 芍

翦各 二兩 防風

欽定四庫全書

普濟方

卷二百七

右㕮咀每服三錢水一大盞陳粟米百餘粒煎取七分去滓服小兒量力與服今人多用此治痢止瀉者皆非所宜但血痢脾胃虛壯宜服瘧痢皆生於脾虛而有痰外冒風暑致陰陽分爭寒熱更作休作有時病名曰瘧若脾胃虛而受積內挾風暑致臟腑不

調赤白雜下登廁頻數病名曰痢瘻痢二病中外証

雖不同要知此能傷耗氣血治瘻之法當先分陰陽

然後與之驅絕治痢之法當先除積滯然後與之調

止由是而知瘻者瘻之根積者痢之源治之者必先

其要可也一方有甘草無防風易簡加減胃風湯

又云若加熱地黃黃者甘草等分足為十味名十

補湯若虛勞嗽加五味子若有痰加半夏若發熱加

柴胡若有汗加牡蠣若虛寒加附子若寒甚加乾薑

欽定四庫全書

卷二百七

欽定四庫全書

卷二百七

欽定四庫全書

卷二百七

皆依本方等分若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加

柴胡二兩服之者氣短加人參若小便不利加茯苓

若脉弦濶加川芎若惡寒加官桂若脉濶加當歸大

腹痛加芍藥若胃熱濕加白朮礞古云黃防風為上

使黃連為中使地榆為下使若血瘀色結者陳血也

加熱地黃若血鮮紅者新血也加生地黃若寒熱

者加柴胡飢熱者加地骨皮若脉洪寢痛甚者加酒

浸大黃一方無防風

當歸散出危氏方 住瀉痢

地榆 陳皮 聖稟散去蒂 當歸尾 赤芍藥

甘草 肉荳蔻根 黃連

右各等分為末每服二錢冷水調服

沒石子丸出危氏方

治臟氣虛弱大腸滑泄次數頻併曰漸羸瘠不進飲食或久患赤白痢脾漏等病並背治

之

白朮 白茯苓各二

錢

白朮

切作片

赤石脂

研

欽定四庫全書

卷二百七

欽定四庫全書

卷二百七

丁香 不見

火

阿子

蜜餞裹燒取

肉荳蔻

蜜裹

米

研

沒石

南茴者通

火

阿子

蜜餞裹燒取

肉荳蔻

蜜裹

米

右和勻用湯泡蒸餅為丸梧桐子大每服三四十丸

米飲吞下食前一日三四服裏肉丸亦得

感應丸出仁存方 治臍腑停積臍腹疼痛米穀不化下痢

赤白泄濁注下

丁香 木香各一

肉荳蔻

二十

百草霜

研二

巴豆七粒

乾薑

一

杏仁

一百四十粒去皮尖研成膏