

壽時世保元三



新刊医林狀元壽世保元丙集三卷

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

司邑後學周亮登元就校

痰飲

脉雙弦者寒飲也○其脉偏弦者飲也○肺飲不弦但喘短氣○又云肺浮而細滑傷飲○脉弦數有疾飲春夏難治○脉沉而弦者懸飲內痛○其人短氣四肢痙節走痛脉沉者有留飲○左右手關前脈浮弦大而實膈上有稠痰也宜吐之○病人百藥不効閉上脈伏而大者痰也眼胞父眼下如炭烟薰熏者亦痰也○久得滯脈痰飲膠固脈道阻滯也卒難得開必費調理痰者病名也生於脾胃然脾胃氣盛飲食易尅何痰之有或食後因之氣惱勞碌驚慾風邪致飲食之精華不能傳化而成痰飲矣有流于經絡皮膚者有鬱于臟腑支節者游溢遍身無所不至痰氣既盛客必勝主或奪於脾之經絡也氣則倏然什地此痰厥也升於肺者則喘急咳嗽迷於心者則怔忡恍

怒走於肝則眩暈不仁脇肋脹滿閼於腎則冷而多痰澀流於中脘則嘔瀉而作寒熱注於胸則咽膈不和肩痠臂痛人於腸漉漉有聲散於胸背則掀觸一點疼痛或寒如手足或背伸一伸片則有聲聚則不利一身上下變化百病治當各從所因是以虛宜補之火宜降之氣宜順之鬱宜開之食宜導之風寒溫熱宜發散清燥以除之故曰治病必求其本

○一論有 溫痰 熱痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰
宜後方加減

三陳湯

陳皮

去白
一錢

半夏

湯退
二錢

白茯苓

去皮
一錢

甘草

五分

石剉一劑生姜三片水煎溫服

一溫痰盛者身軟而重加蒼朮白朮

一熱痰加黃連黃芩痰因火盛逆上降火爲先加白朮黃芩軟石膏黃連

一眩暈嘈雜者火動其痰也亦加山梔黃連黃芩之類

一風痰加天麻枳殼南星白附子僵蚕牙皂之類氣虛者加竹鹽氣實者加荆

瀝俱用薑汁

一老痰用海石半夏瓜萎香附連翹之類五倍子佐此藥大治頑痰宜丸藥喫中有物咯不出嚥不下此痰結也用藥化之加陳藥軟堅之類宜瓜蒌去甘海石桔梗連翹香附少佐林消薑汁練蜜和丸噙服之脉濇者卒難得開必費調理氣實於熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣滯者難治

一寒痰痞塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛亦加半夏一食積痰加神曲麥芽山楂炒黃連枳實以消之甚者必用攻之宜丸藥兼血虛者用補血藥送下中兼有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不使虛若攻之盡則虛矣○噫氣吞酸此係食積而鬱有熱火氣動上加黃芩南星

一而虛有痰加天門冬知母瓜萎仁香附水竹瀝薑汁帶血者更加黃芩白芍桑白皮血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生薑汁韭汁飲三五盞必胸中煩燥不寧後愈

一氣虛有痰加人參白朮脾虛者宜補中氣以運痰降下加白朮白芍神曲麥芽兼用升麻提起內傷火炎加人參黃芪白朮之類薑汁傳送或加竹瀝尤



痰在膈上必用吐法瀉之不去膠固糊濁者必用吐脈浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就有發散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐如防風川芎桔梗麥芽生姜薑汁之類或瓜蒂散凡吐用布緊勒肚於不通風處行之痰在腸胃間可下而愈枳實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰用利藥過多脾氣易虛則痰易生而多

痰在膀胱非白芥子不能達

痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生姜非汗膈間有痰或癲狂或健忘或風痰俱在竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

凡人身上下有塊是痰也問其平日好食何物吐下後方用藥

凡人頭面頸頸身中若結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消凡痰之爲物無處不到爲隨氣升降故也

一論竹瀝大治块疪反能養血清熱有痰厥不肖人事幾死者得竹瀝灌之

遂避諱起死回生藥也

用水竹竿筆竹或長二尺許

小者每段劈作二片大者劈作四片入井水

浸一時許以薄磚二塊排定

將竹片架於磚上兩頭露一二寸下

迫之兩頭以盆盛瀝每六分

中加姜汁一分服之痰熱甚者止可

耳用以竹瀝加入湯藥內服

之尤妙取荆瀨亦治熱痰亦照此法取

○一論痰屬溫乃津液所化因氣之尤妙取荆瀨亦治熱痰亦照此法取

寒溫熱之感或七情飲食所傷以致氣逆

火爲先火因氣逆順氣爲要

加減二陳湯

橘紅去白

牛夏製二
不半

白茯苓去皮一
不半

貝母半

枳實一
不

炒

連翹五分

葛根一
不

酒炒

防風五分

去芦

天花粉七分

炒

香附便炒
一不

甘草三分

右剉生姜三片水煎溫服

○一論熱痰在胸膈間不化吐喀不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結

開結化痰湯

陳皮

半夏

製

茯苓

桔梗

枳殼

貝母

瓜萎仁

黃連

薑芩

梔子

蘇子

桑皮

朴硝

杏仁

甘草

右剉水煎入姜汁磨末香服

○一論遍身四肢骨節走注疼痛
難轉側或四肢麻痺不仁或背心一
點如冰冷脉來沉滑乃是溫疫流注經
絡閉節不利故也

清溫化痰湯

南星

泡

半夏

製

陳皮

白

茯苓

去皮

蕤米

甘草

羌活

酒芩

酒芩

酒芩

酒芩

右剉水煎入竹瀝姜汁磨末

溫服○骨體痛甚及有腫塊作痛者名曰突
塊加乳香沒藥海石朴硝○手臂膀胱加薄桂引

南星主風處

○一論內傷七情痰迷心竅神

守舍神出舍空空則痰生以致增寒壯頭



中醫藥圖書館

版權所有

医药大学图书馆版权所有

痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫證類傷寒兼治中風痰厥氣厥不省人癲
清熱導痰湯

人参

白术去芦

茯苓去皮陳皮去白

半夏姜製

南星姜製

枳實遊火

桔梗

黃連

黃芩

瓜蒌仁

甘草

右剉生姜煎八竹瀝姜汁同服

家傳清氣化痰丸

製造其得法化痰清火開膈順氣消痞除脹醒酒消食

大南星

四兩

大牛夏

四兩

二味先用米泔水各浸三五日以透爲度

洗净切片以碗一箇盛貯晒乾

先姜汁次皂汗又次礬汁又取硝水晒乾

一用生姜汁浸一旦久晒乾

一用皂角煎水去渣浸一日久晒乾

一用白礬一兩煮水浸一日久晒乾

一用朴硝一兩水煮浸一日久多洗晒乾

青皮去穰陳皮去白枳殼去撻枳實炒白

香附水

瓜萎仁

乾葛

桔梗去苦杏仁去皮

白芥子炒萝卜子炒香附水

瓜萎仁

乾葛

桔梗去苦杏仁去皮

白芥子去苦蘇子炒

桔梗去苦杏仁去皮

白芥子去苦蘇子炒



黃芩

酒炒
神曲炒

麥芽炒

山楂

蒸去子

白豆蔻去壳前胡去芦

甘草略

右爲細末用前浸四味藥水加竹鹽一碗泡蒸餅爲丸如梧子大每服五七

十九或茶或姜湯任下

○一論健脾胃清火化痰、頭目眩晕之痰清頭目止眩晕

千金化痰丸

胆星四兩

半夏姜礬牙皂同煮

海石生用酒炒

陳皮去白三兩

白茯苓去皮二兩

枳實麸炒一兩

當歸酒炒二兩

天花粉二兩

片芩酒炒二兩

黃柏酒炒一兩

知母酒炒二兩

大黃酒炒一兩

麻子火燶三兩

防風去芦二兩

白附子煨二兩

甘草生三兩

大黃酒炒五兩

木香水泔浸二兩

氣虛加人參八不

右爲細末神曲二兩打糊爲

如桔子大每服七八十九茶水任下

一秤金一名金珠化痰丸治痰

用半夏十斤米泔水浸十二

水一桶八鉢鍋內化開將

換水三次取出切作兩半晒乾用白礬五斤

夏入礬水內浸二十日取出切作四瓣晒乾

用半夏十斤米泔水浸十二

水一桶八鉢鍋內化開將

換水三次取出切作兩半晒乾用白礬五斤

夏入礬水內浸二十日取出切作四瓣晒乾

用生薑一斤另研取汁再入半斤
浸二十日取出晒乾爲細末聽用
十斤去皮爲粗入鍋內添水者數
沸取出以布瀝去渣將淨水仍入鍋內
熬成膏子和成劑每病重者用藥
與病人噙化忌房事此藥神効不
可輕忽

○一治痰壅方

梨汁一鍾

生薑汁牛鍾

蜜

半鍾

南薄荷末三兩

右和勻重湯煮十餘沸任意食降痰

驗如奔馬

○一論痰飲爲病或狂或眩暈等症無

不奏効

白丸子 中州傳明岐傳

用南星

四兩

半夏

十兩

白

附子五兩

小川烏三兩

石俱切片春七夏三秋八冬十日水浸一日一換日晒夜露其星半夏放磁
器內少加薑汁同浸去麻性次將前藥磨又將絹巾瀝去渣澄白粉晒乾白
米糊爲丸如梧子大每服五六十九 薑湯滾水任下其藥放舌上不麻爲度

方妙

針痰仙方 魯府秘方

硼砂一不

白礬

牛生半
柏一錢

磁青上

石打下
研細一錢

爪蒂礞石礞石

蠟紅淬酒
汗內一錢

石共研細末每用二釐薄荷濃湯調

入鼻內卽愈

○一人氣短有痰小便赤澁足眼作痛

尺脉浮大按之則濶此腎氣丸補飲也

用四物送六味丸不月而張仲景先生云氣虛有飲用腎氣丸補而遂之誠

開後學之家贖濟無窮之天枉腎氣丸卽六味丸也

○一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳母枳殼不時發熱余以爲肺脾虛寒

用八味丸以補土母補中益氣以接中氣而愈

○一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳芩連枳殼之類不應更加祛風之劑半身不遂筋漸痙縮四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形狀倦怠余以爲鬱怒傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸調治卽其

謹疾年餘悉愈形體康健

補中益氣湯

見內傷

六味丸

八味丸俱見補益

咳嗽

脉咳嗽所因浮風緊寒數熱細溫房勞滯難右閔濡者飲食傷脾左閔弦疲極肝衰浮短肺傷法當咳嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實抵其滑多痰弦濇少血形盛脈細不足以息沉小伏匿皆是死脉惟有浮大而嗽堵夫咳謂有声肺氣傷而不清嗽謂有痰脾溫動而生痰咳嗽者因傷肺氣而動脾溫也病本須分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而声出也戴云因風寒者鼻塞声重惡寒者是也因火者有痰少面赤者是也因勞者盜汗出兼痰者多作惡熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰声痰出嗽止五者人槩耳亦當明其是否也治法須分新久虛實新病風寒則散之火热則清之痰涎則化之溫熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之嗽之降之則治虛之法也

○一論四時感冒發熱頭疼咳嗽声重涕唾稠粘中脘痞滿嘔吐痰水寬中快膈不致傷脾此藥大解肌块潮熱將欲成劳嗽嗽喘熱並効用

參蘇飲

紫蘇

前胡

桔梗

枳殼

去搗
葛根

陳皮

半夏
陽泡

白茯苓

去皮各一
不

甘草三分人參五分木香三分

初病
熱散去之

中醫藥大學圖書館版權

石剝一劑姜末煎服○若天寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗鼻塞
舌重加麻黃三錢杏仁一錢金沸草一錢以汗散之○若初感冒加桂枝

加杏仁桑皮黃芩烏梅○胸滿痰多加瓜萎仁○氣促喘嗽加知母貝母肺

寒咳嗽加五味乾姜○心下痞悶煩熱嘈雜惡心或停酒不散加姜炒黃連

枳實乾葛陳皮倍用之○鼻衄加烏梅麥門冬白芍根○心煩發熱加柴胡

黃芩○頭痛加川芎細辛○咳嗽吐血加升麻牡丹皮生地黃○人熱咳嗽
久不愈加知母貝母末門冬○見血加呵膠生地黃烏梅赤芍牡丹皮○吐

血咳嗽加四物湯名蘇苓補心湯○喉瘡傷寒去牛蒡加香附子

○一論二氣喘逆咽喉不利痰滯咳嗽

口舌乾渴

二母清順湯

天門冬

去心麥門冬去心知母各一
不

湯漫貝母廿草湯

人參五分

洗不

當歸身一錢 桔芩一錢

山梔子炒一錢

生甘草三分

玄參一錢 桔梗一錢

天花粉一錢

薄荷七分

甘草三分

右剉水煎服

清熱寧嗽化痰定喘丸

橘紅五錢 青黛三錢

貝母七錢

胆星一兩

天花粉七錢

桑白皮七錢

杏仁桂皮尖七錢

桔梗七錢

黃芩五錢

前胡七錢

甘草三錢

石爲細末煉蜜爲丸如龍眼大每服一丸淡薑湯化下

○一論痰嗽服前方不効者多屬氣血虛弱四肢沈困宜八物湯加黃柏知母

貝母麥門冬五味子葛根蘇陳皮等分薑藥煎服

一論咳嗽早間吐痰多夜間喘急不寐然早間多痰乃脾虛飲食所化夜

間喘急乃肺虛陰火上衝以後方服之

補中益氣湯

方見內傷

依本方加麥門冬五味子

六味地黃丸

方見補益依

本方加麥門冬五味子

○一論傷風寒濕流清涕寒禁噴嚏此肺氣虛不能貫腠理以補中益氣湯主之

○一論咳嗽面白鼻流清涕此肺虛而兼外邪
補中益氣湯加茯苓生夏五味而愈

○一論咳嗽吐痰失音聲啞此元氣虛弱而致也

補中益氣湯加黃柏知母天門冬麥門冬五味杏仁黃芩瓜萎仁

○一論咳嗽吐痰手足時冷此脾虛寒以補中益氣湯加炮乾薑半夏

○一論聲音不出用新槐花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷中補中時時將一二粒口中咀嚼嚥之使喉中當有味久聲自出

○一治語言不出用

黃芩子

二升

葛根子

三箇

杏仁

三子

百藥煎

二兩

右爲末每服二錢熱酒調服

○一治久嗽聲音不出

詞子

去核

杏仁

泡去皮

大半

兩

通草

二錢



右剉每服四錢燶薑五片水煎食後溫服

○一論云老人日久咳嗽不能卧者多年不愈用

猪板油

四兩

蜂蜜

四兩

米糖

四兩

右三味熬化成膏時時刻刻挑一匙口中噙化三五日其嗽即止

○一論久年咳嗽吐痰

杏膏

陳細茶

四兩夏焙烏紗末半斤

白果肉

四兩一半去紅膜搗爛核桃肉搗

右藥入內煉成膏不拘時服

○一治久嗽不瘥并虛勞喘嗽

紫苑頭

去苦

款冬花

兩

各三百部

五錢

右爲末每服三錢生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後臨睡各一服
一論久嗽并連嗽四五十聲者用連皮生薑自然汁一勺加白蜜二茶匙同
放茶碗內煎一滾溫服三四次即止

○一切咳嗽上氣者一道土專賣此藥不拘新久皆效

乾薑

桂心

皂莢

泡去皮子肥
入無孔者

右三味並另搗下篩了各秤分兩和合後更搗師一遍煉白蜜搜和又搗二千杵每服三丸如梧桐子大不限食之先後嗽發即服日進三五服忌怒

蒜油臘麪物

○一論年久近日咳嗽哮喘急等症

神吸散 國子博士顏心吾傳

鵝管石

火煅好醋淬七次一不

餘糧石

火煅九次一鐵

石菖

根五分

官桂三分

粉草

三分

款冬花

五分

石菖

根五分

右爲細末每服三分一釐半秤至夜食後靜坐半時將藥放紙上以竹筒五寸長直插喉內用力吸藥速亦不怕吸藥令盡爲度以細末一口嗽而嚥之忌雞魚羊鵝一切受風發物并生冷諸物惟食白煮豬肉雞子戒三七日日宜用公猪肺一副加肉半斤梔子一歲一箇炒成炭桑白皮不拘多少用水同炒至熟爛去藥至五更病人不要開口言語令人將湯肺喂之病人嚼吃

