

本草匯卷十三目次

穀部

胡麻

卽巨勝
百八八

麻仁

百九
十

麥粉

百九
二

薏苡仁

百九
四

赤小豆

百九
六

白藟豆

百九
八

神麴

二百

麻油

百八
九

浮麥

百九一
附麴皮

糯米

百九三
米泔附

黑豆

百九
五

菜豆

百九七附
護心散

淡豆豉

百九
九

穀芽

二百
一

麥芽

二百

苦酒

即米醋
二百四

菜部

韭

二百

葱莖白

二百

白芥子

二百

萊菔子

二百

生薑

二百

茴香

二百

飴糖

二百

酒

二百五
燒酒附

韭子

二百

大蒜

二百

萊菔根

二百

乾薑

二百

胡荽

二百

薯蕷

即山藥
二百

百合

二百

十八

月次

本草匯卷十三

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男 樹晦芬墀

參閱

姪 維均梅在

紫藤陳陸坤白筆校訂

穀部

胡麻

卽巨勝
百八八

味甘氣平入足太陰厥陰少陰經養血

潤腸燥結焦煩誠易退補中益氣風淫癰瘕豈難除
堅筋骨明耳目輕身不老長肌肉填髓腦辟穀延年

按胡麻卽今之脂麻也。產于胡地故名。得稼穡之
甘不寒不熱。益脾胃補肝腎之佳穀也。弘景云。八穀
之中惟此爲良。仙經載其功能。神農收爲上品。李廷
飛云。風病人久服。步履端正。語言不蹇。補陰是其本
職。其去風者。所謂治風先治血。血行風自滅也。仙家
以白蜜合服。名靜神丸。治一切癇疾。患人虛虛而吸
吸者。加而用之。但多服。令人滑腸。得白朮並行爲勝。
孫真人用胡麻三升。蒸三十遍。炒香。同蜜爲末。每服
五十丸。明目洞視最妙。初生小兒。嚼生脂麻。綿包與

匝之胎毒自下矣。有黑白赤三種。取黑者九蒸九晒。水淘去浮者。以酒拌蒸。晒乾炒用。栗色者名鼈蝨。胡麻比黑者更佳。

麻油

百八十九

味甘微寒。熟者利大腸。下胞衣。生者摩瘡。

腫生禿髮。藏器主腸內熱結。孟詵下三焦熱毒。日華煎膏。生長肌肉。消癰止痛。補皮裂。皆取其甘寒滑利。除溼潤燥。涼血解毒之功也。按胡麻油以白者爲勝。服食以黑者爲良。取其黑色入通于腎。而能潤燥也。生者過食能發冷痢。脾虛作瀉者勿服。治飲食物。

須逐日熬用。經宿則火性反復。卽助熱動氣矣。

香油乃炒

熟脂麻所出。食之。不致疾。若煎煉過。與火無異矣。然油生于麻。麻溫而油寒。同質而異性也。

南史

云。宋明帝宮人腰痛。率心發。則氣絕。徐文伯診曰。髮痕也。以油灌之。吐物如髮。引之。已長三尺。頭已成蛇。能動搖。懸之。滴盡。惟一髮耳。若中河豚砒毒。倉卒無藥。急以油灌。取吐。若胎漏難產。因血乾澀也。用清油半兩。好蜜一兩。同煎數十沸。溫服卽下。他藥無益。以此助血爲効。生者性寒而治疾。炒者性熱而發病。蒸者性溫而補人。

麻仁

百九
十

甘平。微寒。入手陽明。足太陰經。潤五藏通

大腸。風熱結燥及熱淋。催生倒產吞仁卽止。按麻

仁

而治風。同氣相求也。尤藥釀酒俱善。但性滑

利。陳良士云。多食損血脈。滑精氣。痿陽事。婦人多食。發帶疾。陽明病汗出多。胃熱便難。三者皆燥也。川之以通利。月事不通。或半年一年者。麻子仁二升。桃仁二兩。研勻。熟酒浸一夜。日服一升。截腸怪病。大腸頭出寸許。痛苦乾則自落。又出若腸盡。卽不治。但覺初截時。用器盛脂麻油。坐浸之。飲大麻子汁。卽愈也。經

云燥者潤之。謂閉塞不通。當開發。賸理致津液而濡潤宣通也。今麻仁丸能潤腸胃之燥結。利溲便之滯難。不犯峻寒。宜攻老弱。故爲潤燥之平劑也。然究竟走而不守之物。脾虛泄瀉者勿服。極難去殼。用絹包置沸湯中。至冷取出。懸井中一夜。勿着水。晒乾。新瓦上按去殼。簸揚取仁。畏牡蠣白茯苓。

浮麥

附麩皮
百九一

味甘鹹寒。養心除熱。止汗骨蒸。按浮

麥卽水淘淨。浮起無肉之麥殼也。善止虛汗盜汗。及虛熱勞熱。須加酸棗爲妙。或煎湯代茶。或以豬腎唇

煮熟蘸食。無不宜也。麩皮與浮麥同性。而止汗之功。則次于浮麥。以醋拌蒸熟。袋盛。包熨風寒濕痺痛。至汗出極妙。若身體疼痛。及瘡瘍腫爛。不能着席者。用以夾褥臥之。性涼而軟。誠妙法也。

麥粉

百九

味甘。氣涼。消癰腫。療火傷。

按麥粉卽麩

麩洗勦。澄出漿粉也。今人漿衣多用之。古方鮮用。按萬表積善堂方。有烏龍膏。治一切癰腫發背。初發焮熱。用陳年小粉。以鍋炒之。初炒如餛。久炒則乾。成黃黑色。冷定研末。陳米醋調成糊。熬如黑漆。瓷罐收之。

用時攤紙上剪孔貼之。卽如冰冷疼痛卽止。久則腫消。藥力亦盡而脫。甚妙。

糯米

百九

甘溫。煖脾胃。止虛寒。治洩痢。縮小便。收自

汗。益中氣。行榮衛。中血積。解羌青斑蝥毒。按糯米。

性溫。脾之穀也。釀酒則熱。熬飴尤甚。故脾肺虛寒者。宜之。若素有痰熱。及風病脾病久病。不能轉輸者。忌食。米泔之性。甘涼。食鴨肉不消者。頓飲一盞。卽消。

薏苡仁

百九

甘淡微寒。陽中微陰。可升可降。入手足

太陰。陽明。足厥陰經。外而身表。有去濕之妙。內而腸

胃有進食之能筋急拘攣屈伸不便者最効

濕痺症

欬

嗽涕吐膿血併出者極佳

肺壅症

治痿癰于肺藏消水

氣而益精蓋其勢力緩弱倍于他藥方能按薏仁

屬土而入陽明故能健脾益胃清心養肺本經主筋

急拘攣然拘攣有兩等素問註中大筋受熱則縮而

短此因熱而拘攣也可以用此若因寒拘急不可用

也再攷丹溪之言寒則筋急熱則筋縮急因于堅強

縮因于短促若受濕則弛弛則寬長然寒與濕未嘗

不挾熱而三者又未始不因于濕薏仁去濕要藥也

以衍義觀之。則筋病因熱可用。以丹溪觀之。則筋病
因寒因濕因熱皆可用也。然寒而久留。亦能變熱。况
外寒與熱。皆由內濕啓之。方能成病。古方小續命湯。
註云中風筋急拘攣。語遲脉弦者。加薏仁。亦扶脾抑
肝之義也。而張師正倦遊錄有患痢疾重墜。大如盃
者。薏仁同東壁土炒過。煑膏數服。卽瘳。總之此藥性
燥能除濕。味甘入脾。補胃兼淡。能滲泄。故筋攣骨邪。
皆能治之。濕邪去。則脾胃安。脾胃安。則中焦治。中焦
治。則能榮養乎四肢。而通利乎血脉矣。性主下行。虛

而下陷者非其宜也。妊娠禁服。淘晒炒。

黑豆

百九十五

味甘平。入足少陰經。明目鎮心。活血解毒。

能消水腫。可稀痘瘡。去煩熱。塗癰腫。治風痺難緩。療筋攣膝疼。按黑豆稟土氣。以生屬水。為腎家穀也。生溫熟寒。炒食極熱。作豉極冷。造醬則平。牛食之溫。馬食之冷。一體之中。用之數變。入鹽煮。常時食之。能補腎益陽。下氣消脹。初服時似身重。一年後便覺身輕矣。嬰兒十歲以下者。炒豆與猪肉同食。壅氣致死。十有八九。凡服葷麻子。忌之。服厚朴者。亦忌之。最能

動氣故也。古方稱此解百藥毒。大不然。又加甘草其
驗乃奇也。緊小者佳。附豆淋酒法。用大豆三升。熬
熟。至微烟出。入甌中。以酒五升沃之。經一日以上服。
赤小豆。百九甘酸。性平。陰中陽也。入手少陰太陽經。
利水去蠱。一味磨吞。決効。散血排膿。研來醋傅。神良。
止渴行津液。清氣滌煩蒸。通乳汁。下胞衣。產科要矣。
除痢疾。止嘔吐。脾胃宜之。本經主下水腫。別錄止洩
瀉。利小便者。皆濕氣傷脾所致。小豆健脾燥濕。故能
治之。吐逆者氣逆上升也。卒澀者大腸濕熱也。甘酸

欽氣逆辛平燥濕熱故皆治之。按赤小豆稟秋燥

之氣其性下行通乎小腸入陰分凡有形之病皆能

治之。

水氣脚氣最爲急用。袋盛朝夕踐踏久久脚氣可愈。和桑根白皮煮食去濕氣痺腫。和通草煮

食則下氣無限。名脫氣丸。和鯉魚鱗魚黃雌雞煮食能利水消腫。然久服則降令太

過津血滲洩所以令人肌瘦身重。世俗惟知治水不

知扶土所以制水。小豆健脾胃而消水濕直窮其本

也。消癥散腫雖潰爛幾絕者爲末傳之無不立効。但

性粘滯乾卽難揭入苧根末卽不粘。脾虛脹腫當雜

補脾胃藥中用之。中病卽止可也。此卽五穀中常

食之品以緊小而赤黯色者佳其稍大而鮮紅淡紅者並不可用不可同魚鮮食成消渴作醬食成口瘡驢食足輕人食身重

菉豆

百九十七

甘寒入手足厥陰陽明經去浮風止消渴

解諸毒治熱中痘瘡濕爛不結痂疔

音彼酸瘡又頭瘡

者乾

撲之愈藥石草畜中死心溫者水服之良退目翳皮之功也利三焦芽有力焉按菉豆之性肉平涼而

皮則寒物之屬木者也解毒之功過于赤小豆但功在綠皮去殼卽壅氣矣外科有內托護心散一日至