

新刊醫西學集成

六



醫學集成卷之六

後學 義烏 傅滋 續註

○ 勝察三十七

脉法

平人脉大為勞極虛為勞浮大為裡虛脉虛弱沉弦
無寒熱短氣裡急小便不利面色白時目瞋喜衄諸
乾動微緊男子失精女子夢交脉小遲名脫氣如痰
行則喘手足寒腹滿甚則溇泄食不消脉弦而大
則為乾弦則為減女子漏下男子失精脉微弱而濡
為無子脉舉之而滑按之而微者在何部以知其病

脉輕手則滑重按則平者在何經而辨其府寸弱而
微者上虛尺弱滑而濡下虛尺滑而濡疾為血虛脉
數骨肉相失聲散嘔血陽事不禁晝涼夜熱者死
丹溪云陰虛之極痰與血病有有虫者其傳尸一證不
可云無其病俗名傳尸雖多種不同其病與前人相
似大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而
聾或腹中有塊或腦後兩邊有小核數箇或聚或散
沉々默々咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或後
下利羸瘦困乏不自勝持證雖不同其根多有虫蟻
心肺一也

王節齋云人若色慾過勞傷精血必生陰虛火動之病肺中盜汗午後發熱哈哈咳嗽喘急無力飲食少進甚則交延帶血咯血或咳或吐血初血身熱燥渴甚則交延帶血消痰此各勞聚最難調治輕者用藥數十貼重者期以歲年然必須病人受命堅心定志能旁室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無効也此病治之於早則易整若到肌肉燒燥沉困著床則難為矣

大法

四物湯加人尿竹瀝姜汁或加參朮

一方

青蒿一斗五升童便三斗文武大熬約童便減二斗

去蒿再熬至一升入猪膽汁七箇

又長砂
煨即末

熬數沸

以甘草末收之用湯調服

氣血虛甚發熱成勞者補天丸加骨蒸藥佐之

身瘦屬火因火燒燂故也。白蠟燭治瘰癧

不治證

不受補者肉脫甚者

附方

癆瘵方

雜著

當歸

芍藥 各一錢

川芎

熟地黃 各一錢

黃柏 酒炒 七分 知母 酒炒 一錢

生地

酒洗 五分 甘草 炙 五

天門冬 去心 一錢

白朮 三分

陳皮

七分 乾姜 炒 三

生薑 三片

水煎服咳嗽加桑白

皮塊今瓜蒌仁各七分五味七粒痰加姜製半夏貝

母瓜蒌仁各一錢蜜汗加牡蠣酸棗仁各七分浮菰



一撮剉熟加桑白皮沙參地骨皮各七分麋遺精
加牡蠣龍骨另末綿入山茱萸各七分赤白濁加白茯苓一錢炒連三分衄血咳血出於肺也加桑白皮一錢黃芩山梔炒各五分嗽血痰血出於脾也加桑白皮貝母黃連瓜蒌仁各七分嘔吐血出於胃也加山施黃連乾葛蒲黃炒各一錢韭汁半酒蜜姜汁少許咯嘔血出於腎也加桔梗玄參側柏葉炒各一錢若先見血證或吐衄甚者宜先治血輕者涼血止血盛者先消瘀血次止血涼血蓋血未多必有瘀停於胸臍者不先消化之即止之涼之不應也葛可久方可

次第檢用唯獨參湯止可用於大吐血後昏眩脉微
細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬若陰虛火
動潮熱盜汁咳嗽脉數者不可用也且此病大忌服
人參若服過多者亦難治此病屬火大喘多燥然須
節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀澹則前項
寒涼之藥難用矣急宜調理脾胃用二陳加白朮麥
芽等藥俟胃氣復然後用本病藥收功保後宜常服
補陰丸

一方 治傳尸癘瘵寒熱交攻久嗽咯血先以三拗湯
次以蓮心散

不可久方

黃栢其草 為細末入冰片少許吹之

如嘔止咯嗽血者先以十灰散過住甚者以乾藥石
散止之止後其人必倦用獨參湯補之後服他藥保
和湯止嗽清肺保真湯補虛除熱太平丸潤肺除痰
消化丸下痰消氣加減法具各方之下服藥之法每
日仍濃煎消苛湯灌漱喉中用太平丸先嚼一丸徐
徐嚥下次嚼一丸緩上溶化至上床時亦如此用之
夜則肺竅開藥必流入竅中如痰壅却先用飴糖拌
消化丸一百粒吞之次又依前嚼太平丸令其仰

卧服前七藥後若有嗽可煮潤肺丸食之服前藥有
暇煮此七藥服之亦續煮白鳳膏食之固其根本痊
後服十珍丸以收功也

十灰散

治癆證嘔血咯血嗽血先以此遏之

大蓟

小蓟

側柏葉

荷葉

茅根

牡丹皮

大黃

梔子

棕灰

等分

百草霜

右各燒灰存性研細出火毒以藕汁或蘿蔔汁磨京
墨半碗調下五錢立止病重出血升斗者亦效

花柳石散

花柳石

煨存性研細

右用童便一盞煎醋調末三錢甚者五錢食後男子

和酒一半婦人和醋一半調下立止其瘀血化為

水後以

獨參湯

人參一兩水二盞棗五枚煎細服之

保和湯

治勞嗽潤肺

知母

貝母

天門冬

麥門冬

款花

三錢

天花粉

薏苡仁

杏仁

錢五味

粉草

炙

地令

紫苑

百合

桔梗

一錢

阿膠

川歸

生地

紫蘇

薄荷

五分

姜水煎加錫一匙服

保真湯

治勞證骨蒸

當歸

生地黃

熟地黃

白朮

黃芪

赤茯苓

白茯苓 各半兩

天門冬 麥門冬 赤芍

白芍

知母

炒栢

五味

訖胡

地骨

二錢

甘草

陳皮

二錢

蓮心

五分

右姜棗水

煎服

如驚悸加茯神遠志栢子仁酸棗仁淋濁加萆薢烏

藥猪苓澤瀉便澁加木通石韋扁蓄遺精加龍骨牡

蠣蓮須蓮子躁熱加石膏滑石青蒿煎甲盜汗加浮

麥杜蘅麻黃根黃芪

太平丸

治勞證咳嗽肺痿肺癰

天門冬

麥門冬

知母

貝母

欵花

杏仁

二錢



當歸

生地

黃連

阿膠

蒲黃

京墨

荊芥

薄荷

蜜

射香

方

有乾也黃右為末煉蜜九彈子大以薄荷湯漱喉嚨一丸
津下上床時再服一丸如痰盛先服錫糖拌消化丸

一百丸送下後嚥化仰臥使流入肺竅

消化丸

白茯苓

青礞石

假法見藥門

橘紅

半夏

姜汁炒各兩半

枳殼

枳實

各一兩

薄荷

南星

姜炒各八錢

神曲糊丸桐子大飴糖拌吞下

百丸次服太平丸二藥

潤肺丸

治久嗽肺燥肺痿

羯羊肺具杏仁

研



柿霜

真酥

白蜜

右先將羊肺淨洗次

將五藥水解薄攪稠粘灌入肺中水煮熟食與前七

藥同服

白鳳膏

治一切虛怯咳嗽吐痰咯血發喘此火乘金

也

鴨

黑紫白者一隻

大京棗

二斤

參苓

平胃散

并陳酒

一大

瓶將鴨縛定腳掛起次量患人隨量傾酒器中盪盪

却刺鴨血入酒中攪勻飲之具血直入肺中補肺止

嗽其鴨与乾搗去毛脇下開一孔取出腸雜用紙拭

乾次將棗去核入參苓平胃散以皮札定填鴨肚砂

毫一箇放鴨在內四圍用炭火慢煨煮酒一瓶作三

次添入以酒乾為度取出食之餘乾隨意食用又以
十珍丸收功

十珍丸

治一切勞證久勞虛憊體乾精涸血枯氣

竭服前藥愈後以此收功

猪脊腎一条羊脊腎一条

團魚一个烏骨雞一个右四味去骨取肉煮酒一大瓶

於鬚內煮熟搗細再加大山藥五味蓮肉半斤京寧

一百个霜柿十个右四味以水一大瓶於沙鬚內煮

熟搗細令均前藥并肉再用慢火熬却下明膠四兩

黃蠟三兩右二味旋下煎入味和勻一處研成膏和

平胃散末四君子湯末并知母黃柏末各一两共十

兩搜和成劑如硬再入白蜜同熬取起放青石上用
槌打如法先如桐子大每一百丸棗湯下服半月
精神完氣血和一月飲食加倍起居輕快二月消除
諸虛百損一切虛憊不可盡述

已上皆見
可久方也

三拗湯

治傳尸癆寒熱久嗽客血羸瘦先服此後連

心散萬不失一方見嗽門

蓮心散

當歸

黃芪

甘草

炙
鱉甲

訖胡

前胡

羌活

獨活

防己

防風

茯苓

半夏

黃芩

陳皮

阿膠

官桂

赤芍

麻黃

杏仁

南星 川芎 各一兩 芫花 酒洗 枳殼

右除芫花每服二錢姜三片棗一枚入芫花一抄水
二小盞半煎至八分服頃吐有異物漸減芫花蓋甘
草所以殺虫炒之所以斷熱去寒 必在此處

調胃方 治傳尸癆神効 混沌皮 一具醋浸一宿焙干

鱉甲 炙 桔梗 胡黃連 芍藥 大黃 炒

草龍膽 貝母 黃藥子 知母 敗鼓皮心

醋炙各二錢半 犀角 銹末 蓬朮 一个 芒硝 半一 朱砂 二錢水煎

右為末煉蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服二十九
空心溫酒下



取勞虫各

三因

桑枝

柳枝

桃枝

梅枝

各七寸

青蒿

一握

石榴皮

右用童便一升半芎白七並去頭葉煎及一斗去渣

別入安息香阿魏

各一分

再煎一炷盡去渣調辰砂牙

半錢續即末一分麝香一字分作二服調下五更初

一服三點時一服至巳時必取下虫色紅者可救青

者不治

神授散

三因

治傳尸癘氣殺虫去毒

川椒

二斤擇去子并合

為細末米湯下一錢必麻痺

暈悶少傾如不能禁以酒糊丸梧桐子大空心服五

