

壽世保元九



新刊醫林狀元壽世保元玉集卷之九

太醫院吏

目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

外科諸證

癰疽

夫癰疽瘡癧者皆由氣血不和喜怒不時飲食氣鬱於內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發毒結深而發爲癰疽也夫此疾多生於膏梁炙搏安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰者壅也大而高起屬乎陽六腑之氣所生也其脉浮五臟之氣所成也其脉沉數瘡者其總名也瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯夾心火之熱而主癰疽之類也



然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚皮腫光軟侵表廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於肌肉其發猛惡初生一頭如瘡癟白色焦枯觸之而痛應心者疽也熱發於皮膚之間是以浮腫根小不過二三寸者癰也夫癰生疽生於五臟沉澁難療若陶室之燧內潰骨疽則難療而易痊復夫諸瘡之中惟皆疽疔癰喉癰之類亦其急者也至若瘰疬懸瘡漏又各有疥癬瞓瘡風疳之類雖云俱屬瘡類而疽之疾須要察其是實是虛是冷是熱或重或輕對症用藥無失先後次序凡人年四十已上頭項齷頤背脅腰脇或筋脈便不可輕易待之若視之怠慢以爲常疾宜速急治之庶幾得救譬之救火初起則易救至於燎鹿之勢不可撲滅矣其理亦由是也凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱虧飲食不進一毫冷藥亦不可用此是先後次第之要訣也夫瘡有五善七

惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清朗四善也體氣和平五善也如煩燥時腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也膿血也喘急短氣恍惚嗜臥三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便汙者四惡也項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而唇鼻青黑面目四肢浮腫七惡也更有氣噫痞塞咳逆身冷自汗無時目晦耳聾恍惚驚悸語言顛倒皆是惡症五善見至則吉而安七惡全見必危而死矣

審症虛實訣

一凡大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處卽復者有膿不復者可消若按之都牽强者未有膿也按之半軟者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚者有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血瘀之極之不可針破也用諸拔毒之藥敷散四圍堅中軟者此爲有膿審也一邊軟亦可有膿都堅者此爲惡核或有氣也都軟者此爲有血血瘤也

當審堅軟虛實爲要若堅疽積久後若更變  
破也軟疽者溫煖裹衣置之耳若針灸刺破  
不可療也

雜忌須知

一凡病時忌怒忌疑慮忌身體不潔人來看忌  
醃藏等物瘡口飲百日後不作渴症者方可

一凡一切癰疽瘡腫毒痛將好未好之時如往  
瘡腫卽復發切忌切忌

用藥治法

魚羊鵝肉燒酒麪食生瓜果  
入房

有喪之家弔孝弔拜望等項

一凡癰疽等項大瘡毒初起一二三日內卽服  
將潰之際但可服服後汙出將惡毒盡皆發  
潰爛勿服如無神驗膏初起卽服槐花酒或  
炙艾灸之瘡初出至七日內皆可灸七日外  
蜜膏或金蟾膏貼之卽消至四五日腫痛未  
六七日作膿將潰未潰之時不得頑破用簪

飛騰神駿膏此藥治瘡初起至  
散腫痛立消其効如神若瘡已  
千金消毒散二三劑患處卽用  
不可灸瘡木及灸初起卽以葱  
消用芙蓉膏敷之立効敷之至  
針丸頻點瘡頭自然皮破出膿



瘡毒初起至此膿將出未出之際卽服真人活命飲二劑瀉下膿血其瘡潰爛用猪蹄湯洗淨以三神膏擦之內服千金內托散以托瘡毒出外間服蠟礬丸以護膈膜二藥相兼服之勿間不計其數再看潰爛流膿不止此氣血衰憊脾胃虧損肌肉不生瘡不飲口用猪蹄湯洗淨將生肌散擦之外貼神異膏內服十全大補湯兼進八仙糕久服自愈好後再服加減入味尤可以絕根庶幾再生若平日無瘡時皆預服之尤爲防患於未然也以上治法俱要依次第而行未有不奏効者皆予百發百中之良法也

○一論飛龍奪命丹乃外科惡毒第一方也

方見後諸瘡

○一論癰疽發腫瘰疬鼠瘻氣瘻等症此專門之方其効捷如奔馬

飛騰神駿膏

麻黃

二斤去節取

杏仁

四兩熟水澄去濁渣用清汁

泡去皮

尖用砂鉢擂爛又入水同擂

防風

去蘆淨四兩

地骨皮

去骨淨四兩

甘草

四兩

木盤子

去殼十四

頭髮

一大把溫水洗淨

燈草

一大把

黑鉛

右熬膏法不用柴燒用白炭五十斤用六鐵鍋一口將前藥入鍋內注清水

二三桶煮至五六分看藥水濃時藥渣瀘起藥水另放缸注又將前渣入鍋內再入水一二桶又然至五六分藥汁又注前汁內如前法三次去渣將前二次汁并作一鍋熬至乾去黑鉛頭髮燈草三味不出其味香甜磁罐收貯五年不壞遇病每服三錢好熟酒調膏臨臥服厚被蓋出大汗爲度徐徐去被不可被風吹次早用猪蹄煨以汗後恐致虛人以此補之以復元氣并酒調服隨人酒量以醉爲度汗出立愈此治癰毒初起至潰破時前後皆可服神功

○一論凡人初覺患癰疽發背已結未結赤熱腫痛卽用炙法先以濕紙覆其上立視後其紙半乾處卽是結疽頭處取大蒜去皮橫切三文錢厚安在頭上用大艾炷於蒜上炙之三壯換一蒜片復炙痛者炙至不痛不痛炙至痛方佳最要早覺早炙爲上方發一二日者十炙十愈三四日者六七愈五六日者三四愈過七日則不可炙矣若有十數頭一處生者用大蒜搗成膏作餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦可若背上初發赤腫內有一粒黃如粟米者卽用獨蒜切片如前法灸之次日去痂膿自潰矣

○一論凡癰疽發背一切無名腫毒補起

葱密膏

生葱生密猪膽一箇傾石鉢內共搗成餅貼患處日換三四次卽消金蟾膏 治症同前

生白礬末五錢加麝香一分取活蝦墓一箇去腸肚同搗爛如泥四圍留項出氣不過一夜卽愈

○一論發背及一切疔腫毒不問已成未成但焮痛者

槐花酒

○一論癰疽發背無名腫毒疼痛醫所不識初起壯盛人宜  
槐花四五兩炒黃乘熟入酒一鍾煎十餘沸去渣熱服其毒卽消神効

黑白牽牛各一兩搗碎好酒一碗煎八分露一宿次日溫服大便下臘血卽愈

○一論初起一切惡瘡毒腫疼痛丹瘤瘰疬疔腫魚口五發癰疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚亂半卧不寧皮

膚壯熱大便閉結小便赤澁痔症並治妊娠勿服

千金消毒散

連翹二錢黃芩一錢赤芍一錢當歸尾一錢

金銀花一錢

皂角刺一錢

芒硝一錢

天花粉一錢牡蠣一錢麻黃一錢防風一錢

大黃一錢

赤芍一錢

右剉一劑酒水各半煎服

○一論腸癰便毒疔腫癰疽初起卽消已腫卽潰血從大便中出瘡潰後勿服  
加減真火活命飲 又名千金內消散

當歸尾

酒洗五分

赤芍一錢

白芷二錢

木鼈子

去殼一錢

川山甲

三錢大炒蛤粉炒

天花粉一錢

金銀花三錢

白僵蚕

皂角刺一錢

白僵蚕一錢

瓜萎仁

去殼一錢

甘草節

五分

乳香一錢

沒藥五分

大黃二錢

右剉一劑水酒煎服

○一論癰疽發背腫痛如錐剗不可忍者登時痛止

芙蓉膏

黃荆子各等分爲末

芙蓉膏

右二味入石臼內搗極爛用雞子清調敷患處留頂如烟起此方用在未潰之先或將潰之際

○一治癰疽發背已潰爛者

### 三神膏

草麻子仁一合  
陳醋一大碗  
鹽一撮

右三味置鍋中用槐條攬成膏先將猪蹄湯洗淨或米泔水洗淨用雞翎續續掃上其皮卽皺其肉卽生

○一論諸瘡惡毒發皆癰疽痛不可忍者此藥能衛護內膜驅解諸毒自然漸加味蜡簪丸

苗蜡一兩  
枯白礬兩兩  
乳香一两  
沒藥一小  
雄黃二小

右爲細末用蜡鎔化爲丸硃砂爲衣如梧子大每服五十九視瘡上下蜜水送下

○一論癰疽瘡癰皆由氣血凝滯風毒壅結此藥發散外邪流行氣血排膿止痛生肌長肉之劑當用於五六日間已潰未潰而作痛者宜服之

加味千金內托散

黃芪

鹽水炒

人參

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

白芷

防風

川厚朴

姜炒

桔梗

官桂

瓜蔞仁

去殼

金銀花

甘草節

右剉每服一兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進二三服之後瘡口有黑血  
出者及有汗出此藥之功也不問症候猛惡未成者自散已成者卽潰矣○  
痛其加乳香沒藥倍當歸芍藥

○一論癰疽潰後須當大補氣血和脾胃托毒外出實爲切要凡膿血出多陰  
陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者當觸類而長之  
可也或見腫平扁寬遂以爲安漫不知省無補接調養之功愈後虛症復見  
因而轉爲他病而危劇者多矣

收功萬全湯

黃芪

蜜水炒

人參

一两

白朮

去蘆炒

白芍

酒炒

白茯苓

去皮一两

當歸身

五分

川芎

七分

陳皮

五分

懷熟地黃

一两

官桂

三分

白芷

三分

甘草

三分

防風

五分

右剉一劑生薑一片水煎溫服○如作渴加麥門冬五味子○如煩燥加生地黃麥門冬○如有痰加薑製半夏○如泄瀉加厚朴薑炒○如小便不利加澤瀉○如怔忡不寐加遠志酸棗仁炒○如胸膈不寬加厚朴薑炒山楂右方治癰疽發背諸瘡毒潰膿後毒氣已盡氣血虛弱不長肌肉不含口膿清欲作餘症宜之

○一論患癰疽發背出膿後脾胃虧損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無効

八仙糕

人參

去蘆四兩

白茯苓

去皮四兩乾

山藥四兩

芡實去殼四兩

蓮肉去心四兩

不油白朮

去蘆米泡浸過宿切片微炒四兩

白

糖霜半斤

白粳米二升

水淘淨磨細

右將藥末米粉糖霜和一處搓揉極勻篩放籠內竹刀割成小斤蒸熟入鍋再焙乾任意食之

斂瘡止痛生肌散

官粉

火煅黃色

黃柏一錢

黃連一錢

乳香一錢

沒藥一錢

孩兒茶各五分

右爲末擦瘡上并治下疳黃水熱泡等瘡

○一論癰疽發背潰爛便要此湯溫洗

猪蹄湯

當歸

赤芍

白芷

羌活

露蜂房

生甘草各五分

右細剗看瘡大小用藥如瘡大加料用之先將獐豬前蹄兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分爲兩次撥去上面油花并下面渣肉每次用藥二兩投入汁中再用文武火煎十數沸去渣以故紙蘸藥湯溫溫徐徐薄揩瘡上死肉照面隨洗而下淨洗訖以布帛拭乾貼膏藥仍避風忌人口氣吹之有却見人并月經見行婦人及猫犬並不許入病人房內洗瘡切勿以手觸着○二論一切惡瘡癰疽發背等症此藥能追毒去死肉有膿無頭用此點頭上自然皮破出膿

簪針丸

人言爲末人鍋內上蓋明礬燒不響爲度一个

硇砂五分

巴豆半粒

乳香三分

沒藥三分

白雄丁香七分

右爲細末麪糊爲丸如豆大用時以溫水磨化頻擦瘡頭上神効  
替針散

用木鼈子川烏二味磨水以雞翎蘸掃瘡上留口大一處出膿如藥水乾  
再刷上不一時卽穿

○一論治癰疽發背發項發腦等大毒不拘已潰未潰俱用此敷貼如腫毒未  
潰通敷自消如已潰將此敷周圍腫掀之處其破口處以神異膏貼之每日  
換兩三次不許見風神効

二合消毒散

文蛤搗碎炒熏色爲末三兩六錢

輕粉研三錢

黃柏

去皮蜜炙爲末三兩

寒水石

煅爲末一兩

右末合爲一處用新涼水一半蜂蜜一半調令不稀不稠如瘡毒尚未開將  
腫處遍敷之用綿紙覆干上但乾卽以水掃之朝夕更換二次如夏月或午  
時再換一次亦可若已破將此藥敷干周圍掀腫處正有膿破口處用神異  
膏滿貼之不必留口亦一日三換

○一論癰疽發背潰爛又不生肌肉用此立効但此方用之不可太早  
合口收功散

血竭二錢

乳香

沒藥

輕粉

龍骨粉一錢五

赤石脂二錢

硃砂

海螵蛸各五分

右共爲細末散在瘡口上卽生肌肉

一論癰疽發背諸瘡毒不拘已成已潰兩三次中毒換一次其藥力方能勝毒

諸瘡潰膿後不長肌肉不合口者

神效

神異膏

當歸尾五錢

川芎五錢

赤芍二錢

生地黃四錢

防風五錢

羌活五錢

白芷五錢

立參

五錢黃芪五錢

官桂三錢

桃仁四十九箇

杏仁四十九箇

木鼈子十四箇

何首烏三錢

牛旁子五錢

穿山甲四錢

露蜂房三錢蛇退二錢

大黃二錢

黃柏二錢

亂髮男者一團子大者一團

槐柳枝四十五箇每長一寸

右用芝麻油二斤四兩將藥入鍋內浸

春五夏三秋七冬十日以桑柴文武

火煎油黑色以穿山甲浮起黑爲度絹用十四兩柳條攬不住手成膏軟硬得所再下乳香沒藥各三錢血竭三錢降真香末三錢次冷定下射香末二錢水浸二三日去火性攤用

○論癰疽瘡瘍痊後及將痊口乾渴甚不能上潤以致心火上炎水火不能既陽痿飲食不多肌膚漸削或腿腫脚先及治口舌生瘡不絕

加減八味丸

懷生地黃八兩好酒拌砂鍋內蒸半日搗膏

山藥一兩

桂心去皮五錢石棗淨肉四兩酒蒸搗膏澤瀉切片蒸焙乾

白茯苓去皮各五錢

遼五味子二兩五不

牡丹皮五錢

右爲末入石膏加煉蜜少許丸如梧子大每服六七十丸空心鹽湯送下○凡人久服加減八味丸必肥健而多子老年服此不生癰疽諸毒不患消渴等症

瀝去渣再熬油滴水成珠陸續下黃濟故心煩燥作渴小便頻數或白濁瘦服此以生腎水降心火諸症頓止

○一患癰疽之人雖云有熱皆因虛而得之愈後發渴及先渴而後癰疽非人味丸不能治

○一人病癰疽多有愈後發渴而不救者治之惟八味丸最効疽安而渴止此則渴止疽安而未渴者預服此丸則永不生渴氣血壯盛或未疽而先發渴者服此不惟渴止疽亦不作

○一人平日口乾作渴因飲酒食炙燂補劑房勞凡若此類過多致令腎水枯渴不能上制心火故有此症後必有疽發也宜先服八味丸以絕其源及癰疽後服此尤有益也

○一論癰疽發背諸瘡出膿潰爛日久不愈飲食少思身體倦怠口舌乾燥或寒熱往來驚怪少睡以補中益氣湯去柴胡加蒼朮麥門神曲五味黃柏少睡加炒酸棗仁瘡肉生遲加白微一錢肉桂五分如膿多或清倍加參芪橘○一加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實爲切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令觸類而長之可也或見腫平痛寬遂以爲安漫不知省無補接調養之功愈後虛症復見因而轉