

傷寒
台鑑



光緒甲辰年新鑄

傷寒舌鑑

埽葉山房藏版



自序

嘗讀仲景書止言舌白胎滑並無黃黑
刺裂至金鏡錄始集之十二圖遠後觀
舌心法廣至子三十有七何後世誕棄
之多若此宜知傷寒自表傳裏舌
必由是白滑而變他色不似伏邪
瘟疫等熱毒自內達外之病硬
見黃黑諸症也觀仲景論中
見舌白胎滑即言難治安有失



治而致變者乎所以仲景止言白
後已見，斑不煩瑣，膏後人無生
耶，主治采之病之勢，不得反覆，
論以啟蒙昧，蓋邪氣入裏，其虛實
宜熱之機，必現于舌，非若脉法之
明而不顯也。况明盛極，陽與邪熱，
鬱伏多，有假證假脈，唯驗舌上
紅色之滑燥厚薄，昭若冰鑑，無可
遁形，由是取覲台心法，正其錯誤。

削其繁蕪汰其生預于傷定者
 而素入家出人珍摭可絕及已所
 歷共簿可貳拾卷命曰傷定書
 授之剞劂以公同志臨證之助云
 康熙戊申秋月延先結登書于集
 永堂



傷寒舌鑑目錄

白胎舌 二十九圖

黃胎舌 一十七圖

黑胎舌 一十四圖

友色舌 一十一圖

紅色舌 一十六圖

紫色舌 一十二圖

黴醬色胎舌 三圖

藍色胎紋舌 二圖

妊娠傷寒舌 六圖

傷寒舌鑑

長洲張登誕先彙纂

同邑邵之鵬三山校

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛初則舌有白沫次則白涎白滑再次
白屑白疱有舌中舌尖舌根之不同是寒邪入經之
微甚也舌乃心之苗心屬南方火當赤色今反見白
色者是火不能制金也初則寒鬱皮膚毛竅不得疏
通熱氣不得外泄故惡寒發熱在太陽經則頭痛身



熱頂背強腰瘠疼等症傳至陽明經則有白屑滿舌
雖症有煩燥如脈浮緊者猶當汗之在少陽經者則
曰胎白滑用小柴胡湯和之胃虛者理中湯温之如
曰色少變黃者大柴胡大小承氣分輕重下之白舌
亦有死症不可忽視也

白脈舌燥

同色將之無口出

具脈動登臨決氣



舌胎滑白微

微白


紅淡

寒邪初入。太陽。頭
身熱惡寒。舌色微白
有津。香蘇散。羌活湯
之類發散之。



北京中医药大学图书馆版权

薄白滑胎舌



此太陽裏證舌也
 三日未會汗故邪
 入丹田漸深急宜汗之
 或太陽與少陽合病
 有此舌者柴胡桂枝
 湯主之



厚白滑胎舌

厚白

病三四日。其邪見在
太陽。故胎純白而厚
却不乾燥。其證頭疼
發熱。脈浮而緊。解表

自愈。漸利。少育。熱出。

熱四正。未。發。行。



傷寒

三

乾厚白胎舌

乾厚白

病四五日未經發汗
邪熱漸深。少有微得。
過飲生冷。停積胸中。
營熱胃冷。故令發熱。
煩躁。四肢逆冷。而胎
白乾厚。滿口白屑。宜
四逆散加藪薑。



白胎黃心舌

白 黃 白


此太陽經初傳陽明
府病舌也。若微黃而
潤。宜再汗。待胎燥裏
證其則下之。苦煩躁
嘔吐。大柴胡湯加減。
亦有下淡黃水沫無
稀糞者。大承氣下之。



直方集行並

白

白胎黃邊舌



舌中見白胎。外有微黃者必作泄宜用解毒湯。惡寒者五苓散。




舌心黑胎白乾



此陽明府兼太陽
 其胎邊白中心乾黑
 者因汗不徹傳至陽
 明所致必微汗出不
 惡寒脈沉者可下之
 如二三日未曾汗有
 此舌必死




白滑胎尖痰刺舌



此陽明府兼少陽舌也。三四日自利脉長者生。弦數者死。如有宿食。用大承氣下之。十可全五。



白胎中生滿乾黑刺



白胎中生滿乾黑刺乃少陽之裏證也其證不惡寒反惡執者大柴胡加芒硝急下之。然亦危證也。

