

東齊自寶鑑
十七

東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞完扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日半死小腸三日死腸兩頭見者可速續之先以鍼

縷如法

連續之斷腸便取鷄冠血塗其際勿令氣泄即推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以

漬納

之且作粥清稍稍稍飲之二十餘日乃喫糜粥

百日後

乃可進飯羹。金瘡失血其人當苦渴然

須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不

得多飲粥則血溢出殺人也又忌嗔怒及大言笑

動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹葷皆使瘡痛衝發

甚者即死

飲冷水血見寒則凝入心即死不可

不治證

難過。左脇下傷透內者。腸傷斷一半可

醫全斷不可治。○小腹下傷內者。○證候繁多者。
○脉不實重者。○老人左股壓碎者。○傷破陰子
者。○用藥蠅。○血出盡者。○肩內耳後傷透於內者皆不必
金瘡脉候。○金瘡出血太多其脉虛細者生數實者死。
○金瘡出血處又破腦出髓而不能語。○戴眼直視喉中沸
聲口急唾出兩手。○皆死處。○凡金瘡傷天窓眉角腦後臂裏跳脉
皆死。○脾內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六府俞
妄舉。○急唾出兩手。○皆不治。○輕
金瘡出。○脉沉小者生浮大者死。○研刺出血。
不止。○脉來大者七日死。○滑細者生蠅。○金瘡出血。
虛細則宜實大則傾蠅。○傷雖淺命脉虛促可慮。
傷至重命脉和緩永無慮也。○血出。
甚者脉不要洪大只要平正重實。○蠅
腸肚傷治法。○肚破腸出在外若腸全斷難醫不斷者
子則以清油燃落放入肚內乃縫肚皮不可縫之外。○白皮尖草爲線以花叢石散付線上從裏縫之腸
重皮留皮開用藥繆待生肉蠅。○傷破肚皮腸與
脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散。○歸鴻與服

用手法去膏不妨此是閑肉放心去之然後推腸
入內用線縫之仍服通利藥勿令二便結滯得

金瘡先宜調血

多導滯散

養氣血

為主

傳復

海味中

碱白

鰥成片

止鰥止

鰥

止血生肌合瘡藥

傷至重者

在傷處以帛扎定

血立止

鰥散

鰥散

鰥散

血收口方

白膠香老松皮

白芷血竭爲末

付之單

夏月以薄

單

鰥散

鰥散

鰥散

荷葉貼之

一日一次

以藥水

洗鰥

鰥散

鰥散

鰥散

鰥散

鰥散

下子蚕蛾燒灰

付之

鰥散

鰥散

鰥散

鰥散

鰥散

鰥散

鰥散

合用此方不

數日而愈

箭鎛及金刃中骨脉不出

白斂半夏等分

爲末

每取

一錢淡薑湯調服

日三至

二十日自出

門○箭鎛及鍼入肉

不出象牙屑和

水塗其上又蠻蛇取汁

頻塗又鼠腦塗之又好磁石

石着其上
自出輕

救急方

金瘡及諸傷重痛悶欲死取牛一隻剖腹納其人于牛腹浸熱血中可甦如傷腹用血竭

體末醋

湯調飲出血而愈或戰陣砲矢所傷血流滿貫肩膈悶絕者亦甦

熱尿多灌即甦

童尿尤好

活血散

治刀鎗傷腹裂腸出者黃芪當歸川芎白芷續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各

等分右為末每三錢溫酒調服日三立驗

花藥石散

治一切金刃斫傷及打撲損傷牛馬咬踢或至死者急於傷處繆藥其血化為黃水

再服藥便活更不疼痛如藏府有瘀血內積煩悶

欲死服此藥則化為黃水或吐出或下泄出花藥石四兩硫黃一兩為末入瓦罐內益泥固濟晒乾安四方搏上以炭火從巳午時煅至經宿候冷取

出入研細每取一大匙童

奪命散

治金刃所傷及從高墮落木石壓損瘀血

瘀血以石灰拌炒焦五

錢大黃黑牽牛頭末各二兩右為末

以下惡血為度

研熟

雞鳴散

治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕

大黃

酒調下過數時無效再用一服

以下惡血為度

研細

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅欝欲死

大黃

下瘀血即愈治折傷亦妙

因三日

研細

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能

轉側水蛭炒烟盡另研三錢柴胡連翹

當歸梢各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一

錢麝香外餘藥剉作一貼酒

水相半煎去滓入蛭麝

水相空心兩貼立

愈

調服

復元活血湯

治同上

大黃

二錢半當歸一

錢七分柴

甲炒研末姜根甘草各

各

一錢桃仁十箇為泥紅花五分
右剉作一貼酒水相半煎服

金傷散

治一切金瘡重午日早朝使人各出四方採草木莖葉各半把至日午時入石灰一斤

皮蕊之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填同搗極爛鑿大桑木三兩株作孔納藥實築以桑固至元月九日午時取出陰乾百日搗羅為末如遇傷繆之神效

單方

凡二十種

新汲水

人被金瘡及損傷腸出以新汲泉水噴之令身禁腸自入也

石灰

療金瘡甚良人為金刃所傷以石灰末裹之定痛止血神效○又石灰和雞子白火煅為末付

葛根

療金瘡止痛為末付之

瘡立

桑白皮

可以縫金瘡取生皮作線縫腹破腸出者唐安金藏剖腹用此法便愈○神仙刀箭藥妙

不可言。桑葉為末乾糲之。
金瘡止痛桑柴灰付之佳。

蠻姑

箭鏃在咽喉脣不出。搗取汁滴上三五度自出。

痒
自

出
鉢

鉢

蟻娘

箭鏃入骨不可拔。微熬巴豆與蟻娘同研勻塗傷處待極痒便撼動拔之立出後以生肌膏貼

之。
同為

出
箭
鏃

方蟻娘全者麝香少許

末撥動箭頭

藥瘡內

自出
鉢

旋菖根

即旋花根也。合金瘡續斷筋取根搗汁滴瘡中滓封瘡上妙。

象牙

主箭鏃及鐵入肉不出為末和水付瘡上即出舊牙梳尤佳。

蝙蝠

主金瘡出血內漏取二枚燒為末每一錢和水服令一日服盡當下如水乃血消也。

黑虱

及人牙齒同研塗之即出。

葱

治金瘡因驚出血不止取葱灸熱按取汁付之立愈。

幹

小麥

主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去勿令極冷使人含嚥瘡上又嚥其背腸漸自入勿

見幹衆人

石榴花

治金瘡血流不止石榴花和石灰搗爲末繆之血便斷幹

璧錢

主金瘡血不止點瘡上良幹取

鼠腦肝

治箭鏃及鍼刀在咽喉脣膈諸隱處
不出取生鼠腦及肝搗付之即出幹

紫檀香

治金瘡急刮紫檀末付止血止痛妙幹

血竭

療金瘡止血止痛生肌最妙刮屑付之但性急不可多用門入

琥珀

止血生肌合金瘡作末付之中弩箭悶絕琥珀末一錢童尿調服妙幹

蛇含草

主金瘡搗付之佳蛇含膏連已斷之指幹○又云

青蒿

生接付金瘡止血
止痛生肌最妙

熟艾

搗金瘡止血
或煎湯或薰烟亦可行合

小薊

主金瘡血不止
接葉封之鞞取

藍葉汁

金瘡血悶取
藍汁飲之鞞

車脂

鐵入肉不出取車軒脂攤紙上
罨之二日一換三五次自出鞞

擗撲墮落壓倒傷

凡墮壓死者急安好處以袖掩其口鼻上一食頃候眼開先與熱小便飲

之若

初覺氣絕急擘開口以熟小便灌之利去瘀血得○卒墮擗壓倒打死心頭溫者皆可救將本

人如

僧打坐令人將其頭髮控放低以半夏末或皂角末吹入鼻內如活却以薑汁香油打勻灌

之

○人為刀斧所傷或墮落險地或撲身體損傷之呻○若取藥不及急按開口以熱小便多灌之

筋骨皮肉皆出血不止或瘀血停積若去之不早

則有入腹攻心之患癰○跌撲傷損須用蘇木活

血黃連降火白术和中以童便煎服妙傷在上宜
飲韭汁。○凡癲打壓傷或從高墮落皆驚動四肢五藏必有惡血在內專怕惡心先用通二便藥和童便服之立效大小腸俱通利則自無煩悶攻心之患矣。○得效必歸於肝流於腸鬱於腹而作脹痛實者下之宜通導散桃仁承氣湯寒方視奪命散防虛者復元活血湯。○當歸鬚散調之。○凡出血已多而又嘔血不止者難治宜用蘇木煎湯調蚌霜散服之。○諸傷疼痛宜乳香定痛散乳香散雙烏散尋痛元陣王丹補損當歸散合香元治打撲墮落挾驚悸氣血錯亂昏迷不省急取三五丸溫酒童便調灌即甦。○頭上如有傷或打破或金刃傷用藥糊角縛不使傷風

得慎之

通導散

治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此下瘀血大黃芒硝各二錢當歸蘇木紅花桃仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘草各五分右

剉作一貼水煎空心服

一名大成湯

右

當歸鬚散

治打撲損傷致血結脣腹脇痛當歸尾一錢半赤芍藥烏藥香附子蘇木各一錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草

蚌霜散

治傷損大吐血蚌粉百草霜各等分右為末每二錢糯米飲調服

乳香定痛散

治諸傷損疼痛白芷當歸生

芍丹皮

分右為末

每二錢溫酒童便各半調

勻服之

○一名活血止痛散

鱠

乳香散

治打撲傷痛不可忍白朮炒當歸炒自芷桂皮乳香沒藥甘草各等分右為末每二錢

溫酒調

下

雙烏散

治諸傷百損久後時常疼痛者及新被傷作痛亦宜川烏草烏略炮各三錢當歸白芍藥

蘇木大黃生乾地黃紅麴炒各五錢麝香少許右

為末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無害但草

鳥生用恐太猛

所以畧

尋痛元

治諸傷止痛清心行氣活血如神草烏生用乳香火熨沒藥火熨五靈脂各三錢生麝香

少許

右為衣每一丸薄荷湯薑汁磨化服

謁

陣王丹

治諸折傷止血定痛大黃一兩石灰六兩右

同炒紫色為度去火毒鳥篩為末敷傷處妙

門八

補損當歸散

治墮撲折傷疼痛叫號服此藥不復大痛三日筋骨相連川芎一兩半桂心川

椒當歸

甘草各七錢半附子炮澤蘭各二錢半右為末每二錢溫酒調服效如神火燭

打撲傷消腫減癰

丸鬪毆被打成破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯敷熱服取

汗外用杏仁搗爛入白麪少許新汲水調

敷熱服取上腫即消名之○治傷損腫痛瘀血流注紫黑或傷眼

將軍膏

黑不散大黃為末生薑汁調付患處即消名

一枕同煎數沸服

無痕有被傷者仇家陰令術士以此治之

止腫消

服了卧火燒熱地上一夜痛

次日驗審了無一毫傷痕春打撲傷汎膚青腫
茄子種通黃極大者切作片瓦上焙乾為末臨

酒調二錢服一
夜消盡無痕

脉候及不治證

凡打撲損傷內有瘀血其脉堅強者生

當虛

細若得急疾大數者死

醫

○凡折傷外損筋

筋

骨者可治

內損藏府裏膜及破陰子耳後者並

○如傷藏府

○如傷筋

筋

治撲

吐叶

○如傷藏府

○如傷筋

筋

單方

凡十
七種

蒲黃

治撲損瘀血

在內

煩悶

蒲

蒲

白楊樹皮

治撲損瘀血

痛不可忍

之

生龜

治撲損瘀血

取對皮酒漬

服之

之

蜻螬

肉生研末

厚塗傷處立效

之

又研付

傷處

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

鼠屎

治落傷筋骨痛不可忍取屎燒爲末猪脂調急裏之不過半日愈

荷葉

治打落傷惡血攻心悶亂乾葉燒爲末熟童尿調下二錢日三服

利物

下惡

胡桃

壓搘傷損胡桃肉搗爛

麻根

主打搘落傷跪折有瘀血痛不可忍取根及葉搗取汁飲或煮服之

稻稈灰

治墮落搘損痛楚稻稈燒灰和糟酒

芥子

研微末塗貼患處即效

薑

葱白

治打搘傷損痛不可忍取葱白入塘火煨乘熱

痛定
付之

研之
立止且無瘢痕

燭

人尿

主頓服一升即甦童子尿尤佳

韓

烏雞

被壓窄墮舟船車轢馬踢牛觸嘴腹破陷四肢
摧折氣悶欲死烏雞一隻合毛杵一千下和苦

酒

一升得所以新布揭病處取藥塗布上罨之
則易覺寒振欲吐不可去藥須臾復上一雞神

薺

烏鵲羽

治墮落損傷瘀血脹心面青氣短取右
翅羽七枝燒灰和酒服當吐血便差
韓

大膽

治撲損刀箭傷內有瘀血取膽熱酒調服
盡下韓○犬屎燒存性為末熱酒調下二
三錢

亦有奇效

酒糟

主打撲墮落損傷瘀血腫痛
酒糟和醋滓蒸溫熨之妙極

水蛭

主墮撲落傷折傷內有瘀血水蛭炒焦為末
八瓣香少許每一錢熟酒調服當下瘀血
韓

骨折筋斷傷

凡腳手各有六出白四折骨每手有三處
互鎖骨下歸窠若出外則是挫出鎖骨之外
須搦入內若出內則是搦骨於

鎖骨

或出自則是挫出鎖骨之內須是搦骨於
鎖骨之內若出內則是搦骨於

入外方瘡疾也。歸。骨節損折肘臂腰膝出臼蹠跌須用法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用手法歸。捐骨歸窠用竹一片紗。抹板夾定一邊。則愈後曲直一得歸。凡骨碎者須用麻藥鴆。韓。肉或有粉碎者與去細骨免膿血之禍且以藥水。與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不衝破。一日一洗莫令臭穢歸。凡骨碎者用接骨藥火上化開糊骨上然後夾定外用夾骨法活血散接骨丹二生膏。橘米膏內服麥斗散。後用蔓荆散。接骨丹自然銅散。換骨紫金丹。淋洗用蔓荆散。儘。歸。即麻藥也。凡骨節出臼用此麻之然後用夏烏藥當歸。整頓。皂角木鱉子紫金皮白芷半夏烏藥當川芎烏各一兩二錢半草烏茴香坐牽草各二錢。白窠者每服二錢好紅酒調下。草烏倒不識痛處然後或用刀割開或剪去骨鋒以下麻倒不識痛處然後或用夾定然後醫治如箭鎛入骨不出亦用此藥與藥水。歸。麻後或鉗出或鑿開取出然後取蓋湯或益水與藥水。歸。麻後或鉗出或鑿開取出然後取蓋湯或益水與藥水。歸。