

長沙方歌括下



長沙方歌括卷四

閩長樂陳念祖修圓著

長男 蔚古愚擬註

次男元犀靈石然訂

孫男心典全校字

太陽方

柴胡桂枝湯

治傷寒六七日發熱微惡寒支節煩惱微嘔心下支節外證未去者此湯主之○又發汗多亡陽譫語不可下與柴胡桂枝湯和其營衛以通津液後自愈

柴胡

四兩

黃芩

一兩

人參

一兩

半夏

二合

甘草

一兩

桂枝

一兩

芍藥

一兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

歌曰小柴原方取半煎桂枝湯入複方全
○七方大小陽中太少相因病偏重柴胡作仔肩
輕重奇偶復

蔚按小柴胡湯解見本方此言傷寒六七日一經已周又當太陽
主氣之期其氣不能從胸而出入結於經脈以及支絡故取桂枝
湯以除發熱惡寒藉小柴胡湯以達太陽之氣從樞以轉出

柴胡桂枝乾薑湯

治傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不

嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也此湯主之

柴胡半錢桂枝三兩

乾薑二兩

黃芩三兩

牡蠣二兩

甘草一兩

括裏根四兩

右七味以水一斗二升煮取六升去渣再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

歌曰入柴二草蠶乾薑芩桂宜三括四嘗不嘔渴煩頭汗出少陽樞

病要精詳

張令韶曰傷寒五六日厥陰主氣之期也厥陰之上中見少陽已發汗而復下之則逆其少陽之樞不得外出故胸脇滿微結不得下行故小便不利少陽之土火氣治之故渴無樞轉外出之機故

不嘔但頭汗出者太陽之津液不能旁達惟上蒸於頭也少陽欲
樞轉而不能故有往來寒熱之象也厥陰內屬心包而主脈絡故
心煩此病在太陽而涉厥陰之氣不得少陽之樞以外出故曰此
爲未解也用柴胡桂枝黃芩轉少陽之樞而達太陽之氣牡蠣啟
厥陰之氣以解胸脇之結裏根引水液之上升而止煩渴汗下後
中氣虛矣故用乾薑甘草以理中氣

半夏瀉心湯

治傷寒五六日嘔而發熱者柴胡證俱在而以他藥下之柴胡證
仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗
出而解若心下滿而鞭痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而

不痛者此爲痞 柴胡不中與之宜此湯

半夏

半升洗升

黃芩

三兩

乾薑

三兩

甘草

三兩

人參

三兩

黃連

一兩

大棗

十枚

右七味以水一斗煮取六升去渣再煎取三升溫服一升日三服
三兩薑參炙草芩一連痞證嘔多尋整升半夏棗十二粒津重
經古箇

醫師於此證開口卽云傷寒五六日嘔而發熱柴胡證俱在者
五六日乃厥陰主氣之期厥陰之上中見少陽太陽之氣欲從少
陽之樞以外出醫者以他藥下之心下滿而鞭痛者爲結胸但滿
而不痛者爲痞 痞者否也天氣不降地氣不升之義也芩連大苦

以降天氣薑棗人參辛甘以升地氣所以轉痞而爲泰也君以半夏者因此證起於嘔取半夏之降逆止嘔如神亦卽小柴胡湯去柴胡加黃連以生薑易乾薑是也古人治病不離其宗如此

附結胸臟結痞證辨

結胸爲陽邪臟結與痞爲陰邪但臟結結於下痞結結於上也結於下者感下焦陰寒之氣化結於上者感上焦君火之氣化也

十乘湯

治太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞脹滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和此方主之

芫花藜

甘遂

大戟

右上三味等分各別搗爲散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去渣內諸藥強人服一錢七羸者服半錢七溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢七得快下利後糜粥自養

歌曰大戟芫花甘遂平妙將十棗煮湯行中風表證全除盡裏氣未

和此法程

蔚按太陽爲天天連於水太陽中風風動水氣水氣淫於上則嘔逆水氣淫於下則下利水氣聚於心下則爲痞且鞭滿引脇而痛也其人繫繫汗出頭痛乾嘔短氣汗出等證宜辨若惡寒爲表未解不可攻之若不惡寒爲表解而裏未和宜用此湯第三味皆辛

苦寒毒之品直決水邪大傷元氣柯韻伯謂參朮所不能君甘草
又與之相反故選丁棗以君之一以顧其脾胃一以緩其峻毒得
快利後麻粥自養一以使穀氣內充一以使邪不復作此仲景用
毒攻病之法盡美而又盡善也

大黃黃連瀉心湯

治傷寒大下後復發汗心下痞按之濡其脈關上浮緊者此方主
之若有惡寒者表未解也宜先解表然後攻痞

大黃二兩 黃連 一兩

右二味以麻沸湯二升瀆之須臾絞去滓分溫再服

日瘡證分岐辨向趨關浮心痞按之濡大黃二兩黃連一麻沸湯

調病緩驅

蔚按心下痞按之濡而不鞶是內陷之邪與無形之氣搏聚而不散也脈浮在關以上其勢甚高是君火亢於上而不能下交於陰也此感上焦君火之化而爲熱痞也方用大黃黃連大苦大寒以降之火降而水自升亦所以轉否爲泰法也最妙在不用煮而用瀆僅得其無形之氣不重其有形之味使氣味俱薄能降而卽能升所謂聖而不可知之謂神也

附子瀉心湯

治心下痞而復惡寒汗出者此湯主之

大黃二兩 黃芩一兩 黃連一兩 附子一枚炮去皮
破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫

再服愚按麻沸湯漬者微取氣不取其味也

歌曰一枚附子瀉心湯一兩連芩二天黃汗出惡寒心下痞專煎輕

清要參詳

蔚按心下痞是感少陰君火之本熱也復惡寒者復呈太陽寒水之本寒也汗出者太陽本寒甚而標陽太虛而欲外撒也治傷寒以陽氣爲主此際豈敢輕用苦寒然其痞不解不得不取大黃黃連黃芩之大苦大寒以解少陰之本熱又恐亡陽在即急取附子之大溫以溫太陽之標陽並行不悖分建奇功如此最妙在附子專煮扶陽欲其熟而性重三黃湯清熱開痞欲其生而性輕也

生薑湯心湯

治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣
腹中雷鳴下利者此湯主之

生薑

四兩

甘草

三兩

人參

三兩

乾薑

一兩

黃芩

二兩

半夏

半升

大棗

十二枚
黃連一兩

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

歌曰

汗餘痞證四生薑

太陽寒水之邪傷於肌膚之表者從汗而解入於軀殼之裏者不從汗而解

芩草

人參三兩行一兩乾薑棗十二連半夏半升薑

次男元犀

按太陽爲寒水之經寒水之氣傷於外者可從汗而解之寒水之氣入於裏者不能從汗解之汗出解後而所現之證俱

屬水氣用事爲本條之的證惟心下痞鞭爲諸瀉心法統共之證
陳平伯云君生薑之辛溫善散者宣洩水氣復以乾薑參草之甘
溫守中者培養中州然後以芩連之苦寒者滌熱洩痞名曰生薑
瀉心賴以瀉心下之痞而兼權補中散水之長也倘無水氣必不
用半夏生薑之辛散不涉中虛亦無取乾薑參草之補中要知仲
景瀉心湯有五然除大黃黃連瀉心湯正治之外皆隨證加減之
方也

甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心
下痞鞭而滿乾噫心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其

痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故也此方主之

甘草

四兩

黃芩

三兩

乾薑

三兩

半夏

半升

黃連

一兩

大棗

十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取二升溫服一升日三服
歌曰下餘痞作腹雷鳴草四薑芩三兩平一兩黃連半升夏聚一枚十

二擘同烹

陳平伯曰心下痞本非可下之實熱但以妄下胃虛客熱內陷上逆心下耳是以胃氣愈虛痞結愈甚夫虛者宜補故用甘溫以補虛客者宜除必藉苦寒以泄熱方中信用甘草者下利不止完穀不化此非稟九土之精者不能和胃而緩中方名甘草瀉心見泄熱之品得補中之力而其用始神也○此伊尹湯液所製治狐惑

長沙子歌 卷四
蝕於上部則聲喎者方中有人參三兩

赤石脂禹餘糧湯

治傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦此方主之復利不止者當利其小便

赤石脂一觔太乙禹餘糧一觔

以上二味以水六升煮取二升去滓分三服

歌曰赤石脂禹餘糧各一觔下焦下利此湯欣理中不應宜斯法爐底填

來得所聞

張令韶曰石性墜下故以治下焦之利非僅固濤也下焦濟泌別

汁而滲入膀胱故利不止者又當利其小便以分別其水穀焉夫心下痞屬上中二焦此復言不特上中二焦不和而成即下焦不和而亦能成痞也

柯韻伯曰甘薑參尤可以補中宮元氣之虛而不足以固下焦脂膏之脫此利在下焦故不得以理中之劑收功矣然大腸之不固仍責在胃關門之不閉仍責在脾二家皆土之精氣所結實胃而濇腸急以治下焦之標首實以培中宮之本也要知此證土虛而火不虛故不宜於薑附若濕甚而虛不甚後利不止者故又當利小便也○又曰凡草木之藥皆稟甲乙之氣總不若稟戊己之化者得同氣相求之義又有爐底補寒之功

旋覆代赭湯

治嘔吐下解後心下痞鞕噫氣不除者此方主之

旋覆花

三兩

代赭石

二兩

人參

二兩

甘草

三兩

半夏

半升

生薑

五兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日二服

按內臺方代赭石五

雨半夏止用二兩

歌曰五兩生薑夏半升草旋三兩噫堪憑人參二兩赭石一棗十二枚力始勝

俞麟州曰此卽生薑瀉心湯之變法也夫二條皆有心下痞鞕句而生薑瀉心湯重在水氣下趨而作利旋覆代赭湯重在胃虛挾