

外臺祕要

S25-4

1474

1部1

卯 11

1

共 40 册



訂唐王燾先生外臺秘要方第二卷目錄

傷寒下二門

傷寒中風方九首

傷寒結胃方七首

傷寒嘔噦方一十四首

傷寒喉咽痛方八首

傷寒吐唾血及下血方三首

傷寒衄血方四首

傷寒煩渴方九首

傷寒癰實及宿食不消方二首

傷寒春冬欬嗽方三首



南京中醫藥大學圖書館藏

傷寒攻目生瘡兼赤白翳方六首

傷寒口瘡方二首

傷寒手足欲脫疼痛方八首

傷寒虛羸方四首

傷寒不得眠方四首

傷寒小便不利方九首

傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

傷寒蠱瘡方一十首

傷寒陰陽易方八首

傷寒勞復食復方二十五首

高德按
八疑當
作七

尚德按
十有方
一十一
首

高德按
今有方
八首

傷寒百合病方七首

傷寒狐惑病方四首



唐王燾先生外臺秘要方第二卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

奉政大夫同知徽州府事兩陽許侔一彥父校

新安後學程衍道敬通父訂梓

傷寒中風方九首

臣億等按傷寒論傷寒中風自是兩疾今云傷寒中風非

病源中風傷寒之狀太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發
陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔
此其候也

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常
度兩陽相熏灼其身即發黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰

陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口

乾咽爛或不大便久則譫語

荒語也
本作譫

甚者至噦手足躁擾

循衣摸牀小便利者其人可療

陽明中風口苦而咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮緊若不
之則腹滿小便難

陽明病若能食爲中風不能食爲中寒

少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下吐

下之則悸而驚

太陰中風四肢煩疼其脉陽微陰澀而長者爲欲愈

少陰中風其脉陽微陰浮者爲欲愈

厥陰中風其脉微浮者為欲愈不浮為未愈
仲景傷寒論同並出第七

仲景傷寒論桂枝湯療太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾

嘔方

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩炙

大棗

十二枚擘

右五味切薑擘棗次切餘藥以水七升煮棗令爛去滓乃內諸藥水少者益之煮令微微沸得三升去滓服一升日三小兒以意減之初一眼便得汗出者後服小小

關其間如不得汗者小小促之令其藥勢相及汗出自
護如服六物青散法若病重者晝夜服特須避風若服
一劑晬時不解病證不變者當更服之至有不宣汗出
服二三劑乃愈服此藥食頃亦當飲熱粥以助藥力若
初得病甚便以火發汗火氣太過汗出不解煩躁不得
寐因此湯加龍骨牡蠣各三兩減桂心生薑各一兩不
用芍藥若虛勞裏急腹中痛者取前桂枝湯二升加膠
飴一升適寒溫分再服若得大汗出者只用桂枝二兩
發汗後重發汗亡陽譫語其脉反和者不死發汗已解
半日許重發煩其脉浮數可復發汗宜桂枝湯方忌海

藻生葱菰菜等

在上出第二卷中千金胡洽集驗文仲備急范汪同

又療傷寒頭疼腰痛身體骨節疼發熱惡風汗不出而喘

麻黃湯方

麻黃

三兩去節

桂心

二兩

甘草

炙一兩

杏仁

七十枚去皮尖兩人碎

右四味切以水九升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮

取三升半去滓服八合覆取微汗不須歎粥餘如桂枝

法將息忌海藻菰菜生葱

臣億等按張仲景傷寒論麻黃湯惟主傷寒不主中風若

中風但可服前桂枝湯

又療太陽病項背強几几反汗不出惡風者屬葛根湯方

葛根

四兩

麻黃

四兩去節

甘草

二兩炙

芍藥

桂心

各二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚擘

右七味切以水一斗煮麻黃葛根減二升去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗出不須啜熱

粥助藥發汗餘將息依桂枝法忌海藻菰菜生葱

卷中張仲景傷寒論治中風汗出用桂枝此證云汗不出亦傷寒之病非中風也

小品萎蕤湯療冬溫及春月中風傷寒則發熱頭眩痛喉

咽乾舌強胃內疼心胃痞結滿腰背強方

萎蕤

二兩

石膏

三分末綿裹

白薇

二兩

麻黃

二兩去節

獨活

二兩

杏仁

二兩去皮尖兩人

芩薊

二兩

甘草

二兩炙

青木香

二兩無可用麝香一分代之

右九味切以水八升煮取三升分三服取汗若一寒

熱者加朴消一分及大黃三兩下之忌海藻菘菜

卷中古今錄驗同
一方有葛根二兩

千金療傷寒中風五六日已上但胃中煩乾嘔枯樓實湯

方

枯樓實

一兩

柴胡

半斤

黃芩

三兩

甘草

三兩炙

生薑

四兩切

大棗

十枚擘破

右六味切之勿令大碎吹去末以水一斗二升煮得六

升絞去滓更煎取三升適寒溫服一升日三服忌海藻

菘菜

出第十卷中



千金翼療中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水飲水而吐此爲水逆五苓散主之方

豬苓

分三

澤瀉

分五

茯苓

分三

桂心

分二

白朮

分二

右五味搗篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出愈忌桃

李醋物生葱雀肉等

又傷寒中風醫反下之其人下利日數十行水穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔心煩不能得安醫見心下痞以爲病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心湯主之方

甘草

炙四兩

黃芩

三兩

大棗

十二枚擘

黃連

一兩



尚德按
千金翼

乾薑三
兩傷寒
論同

尚德按
千金無

桂枝湯
黃芩即

乾薑 二兩

半夏 半升洗
去滑

右六味切以水一斗煮取六升分六服忌海藻菘菜猪

羊肉湯 並出第九卷中一方有人參三兩

古今錄驗療中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡風項頸強

鼻鳴乾嘔陽旦湯主之方

大棗 十二枚擘

桂枝 三兩

芍藥 三兩

生薑 三兩

甘草 三兩炙

黃芩 二兩

右六味咬咀以泉水六升煮取四升分四服日三自汗

者去桂心加附子一枚炮渴者去桂加栝樓三兩利者

去芍藥桂加乾薑三兩附子一枚炮心下悸者去芍藥



加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦主之煎得二升內膠飴半升分爲再服若脉浮緊發熱者不可與也忌海藻菘菜生葱等物 千金同

又大青龍湯療太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛汗不出而煩躁方

麻黃 六兩 去節

桂枝 二兩

甘草 二兩 炙

石膏 如雞子大 碎綿裹

生薑 三兩

杏仁 四十枚去兩 人及尖皮

大棗 十枚 擘

右七味切以水九升先煮麻黃減二升去沫乃內諸藥

煮取三升去滓分服一升厚覆取微汗汗出多者溫粉粉之一服汗者不可再服若復服汗多亡陽遂虛惡風



高德按

傷寒論

無此語

尚德按

今有十

四法

通按

不胎本

疑胎滑

煩燥不得眠也忌海藻菰菜生葱等物

並出第二卷
張仲景傷寒

云中風見傷寒
脈者可服之

傷寒結胃方七首
二十
二法

病源結胃者謂熱毒氣結聚於心胃也此由病發於陽而
 早下之熱氣乘虛而痞結不散也按之痛其脈寸口浮關
 上反自沈是也脈大不可下下之則死脈浮而大下之為
 逆若陽脈浮關上細小沈緊而飲食如故時小便利者名
 為藏結藏結病舌上白胎滑者為難療不往來寒熱其人
 反靜舌上不胎者不可攻之

出第七卷中

張仲景傷寒論問曰病有結胃有藏結其狀如何答曰按



之痛寸脉浮關脉沈名結胃也問曰何謂藏結答曰如結
 胃狀飲食如故時時下利寸口脉浮關上小細而沈名
 藏結舌上白胎滑者為難治藏結無陽證不往來寒熱其
 人反靜舌上胎滑者不可攻也病發於陽而反下之熱入
 因作結胃病發於陰而反下之一作汗之因作痞也所以成結
 胃者以下之太早故也

結胃證悉具煩躁者亦死

結胃證其脉浮大者不可下也下之則死

夫結胃病項亦強如柔瘕狀下之則和宜大陷胃丸方

高德按此條已下與傷寒論大第不同大項

蜀大黃半斤 葶藶子半升 杏仁半升去皮尖熬令赤黑色

芒消 半升

右四味檇篩二味杏人合芒消研如泥和散合和丸如
彈子大每服一丸用甘遂末一錢匕白蜜一兩水
同煮取一升溫頓服之一宿乃自下如不下更服取
為效 千金翼同

又太陽病脉浮動數浮則為風數則為熱動則為痛數則
為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之

動數變遲膈內拒痛

一云頭痛即眩

胃中空虛客熱動膈短氣煩

躁心內懊憹陽氣內陷心下因堅則為結胃大陷胃湯主

之

尚德按
客熱傷
寒論作
安氣

合

作