

醫方選要卷之八目錄

痼冷門

附論

三建湯

沉附湯

參附湯

沉香薑澄茄散

附子茴香散

茸附湯

接真湯

附子理中圓

來復丹

保元丹

黑錫丹

諸血門

附論

茯苓補心湯

犀角地黄湯

是齋曰木散

人參救肺散

升陽去熱和血湯

犀角地黄湯

必勝散

大薊散

涼血地黄湯



石膏散

門冬飲子

生地黃飲子

天門冬湯

麥門冬飲子

當歸地黃湯

當歸湯

雞蘇圓

三鞭補血圓

腸辟痔漏脫肛門

附論

三鞭補血圓

秦艽防風湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

地榆散

當歸郁李仁湯

乾葛湯

橘皮湯

逐瘀湯

槐角散

秦艽白朮圓

乳香圓

蛻皮散

槐角圓

釣腸圓

寬腸圓

神效散

蛻皮圓

香殼圓



熊膽膏

猪臟圓

木賊散

眼目門

附論

明目流氣飲

撥雲散

柴胡散

拈痛散

聖効散

桑白皮散

散熱飲子

四物龍膽湯

洗肝散

决明子散

地黄湯

菊花散

湯泡散

爐甘石散

蟬花無比散

明目地黄圓

菊睛圓

還睛補肝圓

羊肝圓

春雪膏

助陽活血湯

加減駐景圓

甘菊湯

磁石圓

蜜蒙花散

驅風一字散

秘傳羊肝圓

熟乾地黄圓

杞苓圓

白龍散

點眼珍珠散

點眼膏子

撥翳紫金膏

青金圓

琥珀散

耳聾門

附論

犀角飲子

芷芎散

益氣聰明湯

茯神散

羚羊角散

芍藥散

地黄湯

菖蒲圓

通氣散

茯苓圓

塞耳丹

通神散

紅綿散

清神散

蓖麻圓

羊腎附子圓

三黃散

白龍散

人參湯

辛夷散

增損通聖散

細辛散

溫衛湯

防風湯

離澤通氣湯

辛薑湯

通關散

犀角散

防風散

蒼耳散

千金細辛膏

大楓油

硫黃散

砂黃散

鼻赤方

醫方選要卷之八目錄畢

醫方選要卷之八

痼冷門

良醫副臣周文系編集

痼冷者謂痼久而冷者也痼者固久也冷者寒之甚也人之臟腑稟受不同亦或將理失宜遂致偏勝故方中有痼冷積熱之說痼冷者中寒也其病多由真陽虛弱胃氣不冒復啖生冷冰雪水酪諸寒之物或坐臥陰寒久濕之處日漸侵奪陽氣以致臟腑久痼而冷其為病也或手足厥逆或腹中久痛澹泄無度或腰腿重痛如坐水中或陰痿不舉寒精自出或久嘔吐不進飲食或自汗戰慄或大腑洞泄或小便頻



數此皆猶冷之爲病也治之當宜溫補腎元健養脾胃祛寒邪固真氣使陽氣得復陰陽和平則無偏勝之患而疾斯愈矣

三建湯 治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背痠困自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風痰潮不省人事傷寒陰證厥逆脉微皆可服之

大烏頭

附子

二天雄

已上俱炮去
皮各三錢

右作一服用水二鍾生薑十二片煎至一鍾不拘時服
沉附湯 治上盛下虛氣不升降陰陽不和胃膈痞滿
飲食不進肢節倦痛

沉香

剉二錢半

附子

炮去皮臍半兩

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食前服

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短眩暈

但是陽虛氣弱之證並宜服之

人參

去蘆五錢

附子

炮去皮臍三錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至八分不拘時服

沉香萆澄茄散

治內挾積冷臍腹弦急痛引腰背面色痿黃臟腑自利小便滑數小腸氣痛並皆治之

色痿黃臟腑自利小便滑數小腸氣痛並皆治之

沉香

萆澄茄

附子

炮去皮臍

葫蘆巴

炒

肉桂

去粗皮

補骨脂

炒

川練子

去核

巴戟

去心



茴香炒

木香

已上各一錢

桃仁

去皮尖雙仁者

川烏

炮去灰皮各半錢

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

附子茴香散 治氣虛積冷心腹絞痛

附子

炮去皮三錢

茴香

炒

肉豆蔻

煨

乾薑

炮

人參

去蘆

白朮

白茯苓

去皮

木香

已上各一錢

丁香

甘草

炙各半錢

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分空心服

茸附湯 治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸

肢體倦乏但是一切虛弱之證並皆治之

鹿茸

去毛酒炙

附子

炮去皮臍各四錢



右作一服水二鍾生薑十片煎至八分食前服

接真湯 治陰病手足厥冷臍腹疼痛真氣不足虛憊

欲絕

沉香

丁香

各二錢

麝香

錢

附子

炮去皮四錢

右咬咀用水二鍾生薑七片棗二枚煎至七分空心服或為末每服二錢亦可

附子理中圓

治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐泄利霍亂

轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進一切沉寒痼冷並皆治之

附子

炮去皮臍

人參

去蘆

乾薑

炮

白朮



甘草 炙已上 各三兩

右爲細末煉蜜爲圓每兩作十圓每服一圓用水一鍾化開煎至七分空心服

來復丹 一此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之

氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交滋養心腎氣不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶虛救陰助陽爲効殊勝

舶上硫黃

用透明不夾沙石者

硝石

各一兩同硫黃並爲末入定礬內以微火溫炒

用柳篋子不住手攪令陰陽氣相入不可用太過恐傷藥力再碾令極細

青皮 去穢



陳皮 去白

五靈脂

須擇五臺山者研細用水澄去沙石曬乾已上各二兩

太陰玄精石

一兩另張飛

右將五靈脂青皮陳皮爲細末入玄精石末及硝石硫黃末拌勻以好酒醋煮麪糊和圓如豌豆大每服三十粒空心粥飲吞下甚者五十粒新生嬰兒一粒小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒碾碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血迷上搶悶絕并惡寒不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止腹脇冷疼立効諸疾不辨陰陽證者並宜

服之

保元丹 治老弱諸沉寒痼冷小便滑數大便時泄腰

腿臍腹疼痛困倦瘦虛食減

附子

炮去皮臍

白朮

山藥

肉豆蔻

赤石脂

乾薑

各一兩

肉桂

半兩

右爲細末麴糊爲圓如梧桐子大每服一二十圓空心用溫酒送下

黑錫丹 治元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷

耳內虛鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷夜多小便婦人月事愆期血海久冷赤白帶下及陰

毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒
即便回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽補虛損益
元陽返陰

茴香炒

附子製

葫蘆巴

破故紙炒

川練子

巴戟已上各一兩

肉豆蔻製

木香不見火

沉香不見火

桂心已上各半兩

錫硫砂四兩

右為末同研勻酒煮麴糊和圓如梧桐子大陰乾以
布袋擦令光瑩每服四十圓空心薑鹽湯送下

諸血門

夫血氣形之所待以生者血陰而氣陽也蓋人身之血猶水行地中隨氣而行通貫經絡無處不到血爲榮氣爲衛榮行脉中衛行脉外相隨上下榮養五臟六腑四肢百骸者也苟或榮衛失調而衛七情四氣所干然後變病生焉蓋血者主於心藏於肝而統於脾者也夫血之妄行固由積熱所致然其證多端難以一槩而論有因飲食過飽負重傷胃而吐者有因思慮傷心及積熱而吐血者有勞傷心肺而吐血咳嗽者有思慮過多傷脾而吐血者有因肺生癰疽而

吐血者有從高墜下傷損內臟而吐血者有傷寒不
解邪熱在經隨氣上湧而爲吐血衄血者治療之法當
究所因傷胃者調胃安血勞心者益其心志積熱則
清之氣鬱則順之傷脾則安之肺癰則消之墜傷則
下之傷寒邪不解當分其經而解之若因吐血後而
咳嗽及嗽中帶紅絲者久則必成癆瘵之證爲難治
也又有便血尿血者蓋便血乃臟腑積滯濕熱之毒
而成也或因氣鬱酒色過度及多食炙煇熱毒之物
或風邪入胃或七情六淫所傷使血氣逆亂榮衛失
度皆能令人下血其尿血乃膀胱蘊熱所致也治法

