

陰證 而不 辨之 欲飲 陰陽

⑤濕傷脾胃兩陽既吐且利寒熱身痛或不寒熱但腹中痛名曰霍亂寒多不欲飲水者理中湯主之熱多欲飲水者五苓散主之吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷四逆湯主之吐利止而身痛不休者宜桂枝湯小和之

按霍亂一證長夏最多本於陽虛寒濕凝聚關係非輕傷人於頃刻之間奈時醫不讀金匱不識病源不問輕重一概主以藿香正氣散輕者原有可愈之理重者死不旋踵更可笑者正氣

足太陰脾經陽
明胃

散中加黃連麥冬大用西瓜治渴欲飲水之靈

亂病者豈堪命乎唐見之屢矣故特採金匱原

文備錄於此胃陽不傷不吐脾陽不傷不瀉邪

正不爭不痛營衛不乖不寒熱以不飲水之故

知其為寒多主以理中湯原文係理中丸方後自注云然丸不及湯

蓋丸緩而湯速也且恐丸藥不精故直改從湯溫中散寒人參甘草胃

之守藥白朮甘草脾之守藥乾薑能通能守上

下兩泄者故脾胃兩守之且守中有通通中有

守以守藥作通用以通藥作守用若熱欲飲水

手太陽小腸足
太陽膀胱

之證。飲不解渴而吐泄不止。則主以五苓邪熱
須從小便去。膀胱爲小腸之下游。小腸火腑也。
五苓通前陰。所以守後陰也。太陽不開。則陽明
不闔。開太陽。正所以守陽明也。此二湯皆有一
舉兩得之妙。吐利則脾胃之陽虛。汗出則太陽
之陽亦虛。發熱者浮陽在外也。惡寒者實寒在
中也。四肢拘急。脾陽不榮四末。手足厥冷。中土
虛而厥陰肝木來乘。病者四逆湯善救逆。故名
四逆湯。人參甘草守中陽。乾薑附子通中陽。人

參附子護外陽。乾薑甘草護中陽。中外之陽復回。則羣陰退避。而厥回矣。吐利止而身痛不休者。中陽復而表陽不和也。故以桂枝湯溫經和之。

理中湯方

甘熱微苦法。此方分量以及後加減法悉照金匱原文用者臨時斟酌

人參

甘草

白朮

乾薑

各三兩

水八杯。煮取三杯。溫服一杯。日三服。

加減法。若臍上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。吐

桂枝
猪苓
白朮
澤瀉

多者。去朮加生薑三兩。下多者。還用朮。悸者。加茯苓二兩。渴欲飲水者。加朮足前成四兩半。腹中痛者。加人參足前成四兩半。寒者。加乾薑足前成四兩半。腹滿者。去朮加附子一枚。服湯後。如食頃。飲熱粥一升許。微自汗。勿發。揭衣被。

五苓散方
見前第三十八頁

加減法。腹滿者。加厚朴。廣皮各一兩。渴甚。面赤。脉大。緊而急。搦扇。不知涼。飲冰。不知冷。腹痛甚。時時躁煩者。格陽也。加乾薑二兩五錢。
此條非仲景原文。余治驗也。

百沸湯和。每服五錢。日三服。

汪按濕溫濕癘寒濕中寒等證皆有陰盛格陽。若春溫風溫暑熱溫疫溫毒非犯逆則絕無此證。雖或病前病中兼犯房勞遺洩亦斷無陰證。而陽盛格陰者則往往有之。俗醫傳派不清。臨事狐疑。失之毫釐。人命立絕。此條與溫熱門中。中下焦陽厥數條。參看庶乎臨證了然。厥功鉅

矣。

四逆湯方

辛甘熱法。分量臨時斟酌。



中國醫藥大學圖書館藏

炙甘草二兩

乾薑一兩

生附子一枚
去皮

加人參一兩

水五茶碗煮取二碗分二次服

按原方無人參。此獨加入人參者。前條寒多不飲

水。較厥逆尚輕。仲景已用人參。此條諸陽欲脫。

中虛更急。不用人參。何以固內。柯韻伯傷寒註

云。仲景凡治虛證。以裏爲重。協熱下利。脉微弱

者。便用人參。汗後身痛。脉沉遲者。便加入參。此

脉遲而利清穀。且不煩不欬。中氣大虛。元氣已



脫。但溫不補。何以救逆乎。觀茯苓四逆之煩躁。且以人參。況通脉四逆。豈得無參。是必有脫落耳。備錄於此存參。

⑤霍亂兼轉筋者。五苓散加防已。桂枝薏仁主之。寒甚脉緊者。再加附子。

肝藏血。主筋。筋爲寒濕搏急而轉。故於五苓和霍亂之中。加桂枝溫筋。防已急驅下焦血分之寒濕。薏仁主濕痺脚氣。扶土抑木。治筋急拘攣。甚寒脉緊。則非純陽之附子不可。



五苓散加防已桂枝薏仁方

五苓散方見第三十八頁

即於前五苓散內加防已一兩桂枝一兩半足前成二兩薏仁二兩寒甚者加附子大者一枚枳實細末每服五錢百沸湯和日三劇者日三夜一得卧則勿令服

⑤ 卒中寒濕內挾穢濁眩冒欲絕腹中絞痛脉沉

緊而遲甚則伏欲吐不得吐欲利不得利甚則轉

筋四肢欲厥俗名發沙又名乾霍亂轉筋者俗名

轉筋火古方書不載

不載者不載上三條之俗名耳若是證當於金匱腹滿腹



心痛寒疝諸
條參看自得。

蜀椒救中湯主之。九痛丸亦可服。

語亂者先服至寶丹再與湯藥。

按此證夏日濕蒸之時最多。故因霍亂而煩
於此中陽本虛內停寒濕。又爲蒸騰穢濁之氣
所干。由口鼻而直行中道。以致腹中陽氣受逼。
所以相爭而爲絞痛。胃陽不轉。雖欲吐而不得。
脾陽困閉。雖欲利而不能。其或經絡亦受寒濕。
則筋如轉索。而後者向前矣。中陽虛而肝木來
乘。則厥。俗名發沙者何。蓋以此證病來迅速。或

嘗見一人患此病飲米湯

立斃

溫病條辨

卷二 中焦篇

七

不及延醫。或醫亦不識。相傳以錢。或用磁碗。以
蘸薑湯。或麻油。刮其關節。刮則其血皆分。往則
復合。數數分合。動則生陽。關節通而氣得轉。往
往有隨手而愈者。刮處必現血點。紅紫如沙。故
名沙也。但刮後須十二時不飲水。方不再發。不
然則留邪在絡。稍受寒發。怒則舉發矣。以其欲
吐不吐。欲利不利。而腹痛。故又名乾霍亂。其轉
筋。名轉筋火者。以常發於夏月。夏月火令。又病
迅速如火也。其實乃伏陰與濕相搏之故。以大

藥

建中之蜀椒。急驅陰濁下行。乾薑溫中。去人參
膠飴者。畏其滿而守也。加厚朴以瀉濕中。濁氣
枳櫛以散結氣。直達下焦。廣皮通行十二經之
氣。改名救中湯。急驅濁陰。所以救中焦之真陽
也。九痛丸一面扶正。一面驅邪。其驅邪之功最
速。故亦可服。再按前吐瀉之霍亂。有陰陽二證。
乾霍亂則純有陰而無陽。所謂天地不通。閉塞
而成冬。有若否卦之義。若語言亂者。邪于心包。
故先以至寶丹驅包絡之邪也。



救中湯方

苦辛通法

蜀椒

三錢炒出汗

淡乾薑

四錢

厚朴

三錢

檳榔

二錢

廣皮

二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。兼轉筋者。加桂枝三

錢。防已五錢。薏仁三錢。厥者加附子二錢。

九痛丸方

治九種心痛。苦辛甘熱法。

附子

三兩

生狼牙

一兩

人參

一兩

乾薑

一兩

吳茱萸

一兩

巴豆

一兩。去皮心。熬。礬如膏。

溫病條辨

卷二中焦篇

五



南京中医药大学图书馆藏

蜜丸。梧子大。酒下。強人。初服三丸。日三服。弱者二丸。○兼治卒中惡。腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。並冷衝上氣。落馬墜車血病等證。皆主之。忌口如常法。

方論內經有五臟胃腑心痛。並痰蟲食積。卽爲丸痛也。心痛之因。非風卽寒。故以乾薑附子驅寒壯陽。吳茱萸能降肝臟濁陰下行。生狼牙善驅浮風。以巴豆驅逐痰蟲陳滯之積。人參養正驅邪。因其藥品氣血皆入。補瀉攻伐皆備。故治

不
翻
天
氣
新
刊

中惡腹脹痛等證。則寒水將厥。針灸除至。風前
附錄外。臺走馬湯。治中惡心痛腹脹大便不通。
苦辛熱法。沈目南注云。中惡之證。俗謂絞腸烏
痧。卽穢臭惡毒之氣。直從口鼻入於心胸腸胃
臟腑。壅塞正氣不行。故心痛腹脹大便不通。是
爲實證。非似六淫侵入而有表裏清濁之分。故
用巴豆極熱大毒峻猛之劑。急攻其邪。佐杏仁
以利肺與大腸之氣。使邪從後陰一掃盡除。則
病得愈。若緩須臾。正氣不通。營衛陰陽機息。則



死是取通則不痛之義也。

巴豆 二枚去心皮熬 杏仁 二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合捻取白
之當下老小強弱量之通治飛尸鬼擊病。

按醫方集解中治霍亂用陰陽水一法有協和

陰陽使不相爭之義又治乾霍亂用鹽湯探吐

一法蓋閉塞至極之證除針灸之外莫如吐法

通陽最速夫嘔厥陰氣也寒痛太陽寒水氣也

否冬象也冬令太陽寒水得厥陰氣至風能上

足厥陰肝
膀胱太陽寒
水之臟



升則一陽開泄萬象皆有生機矣至針法治病最速取禍亦不緩當於甲乙經中求之非善針者不可令針也

汪按玉龍經乾霍亂取委中今世俗多用熱水急拍腿灣紅筋高起卽刺之出血愈又按此證亦有不由觸穢受寒但因鬱怒而發者其宜急攻下氣與觸穢受寒同

徵按沙證向無方論人多忽之然其病起於倉卒或不識其證或不得其治戕人甚速總因其

